




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/1





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1400/A/1



1400
Axi

Simon Gybbens

Axvii a

Fortasp fortuna adiuna

Medice cura teipsum

Principiis obsta: sero medicina
paratur. Cum mala per longam
temporis tractum

26 Aug 1592
D. 1592

2^a 4^a 2^a

CO

20

55172

AVRELII

COR. CELSI

DE RE MEDI-

CA LIBRI

OCTO.

*

ITEM

Q. SERENI Liber de Medicina.

Q. RHEMNII Fannii Palæmonis
de Ponderibus & Mensuris Liber.

*Omnia ex diuersorum codicum diligen-
tissima collatione castigata.*



LVGDVNI,

Apud Ioan. Tornæsum, & Gu-
lielmu Gazeium.


1549.

COR. C. 171
1713

THE
HISTORICAL
AND
GEOGRAPHICAL
DESCRIPTION
OF
THE
CITY
OF
LONDON
AND
THE
COUNTY
OF
MIDDLESEX
IN
THE
SEVENTEENTH
CENTURY



LECTORI.



NVIDIT profecto Fortuna populo Romano integrā, absolutamq; felicitatē. Nam cum bellicis artibus, & reipublice administrandae peritia, ea ciuitas omnibus omnino praestiterit nationibus, quae vel antecesserūt, vel sequuta sunt Romanum imperium: deerat illi certē nihil ad cumulum virtutum omnium, nisi ut doctrinis, atq; literis excoleret: quarū iamdiu tamen gloriam ingeniosissima, ac disertissima Graecia cum scribendo, tum dicendo occupasse videbatur. Verū et si sero Eloquentiam, Philosophiamq; attigerit: tantos tamē in vtraq; progressus fecit, ut multos Roma habuerit nobilissimos homines postremis temporibus, non solum Philosophiae deditos, sed in ea iam excellentes atq; perfectos. Eloquentia verò tantū in ea vrbe sibi paucissimis annis vendicauit, ut eloquentissimas Athenas vel equarit, uel paruo illis proxima interuallo fuerit: id quod probare esset aut facile, aut necessarium, si praeclarissima extarent illorū monumenta, qui plurimum dicendo potuerunt, Antoniorū scilicet, & Catonum, & Crassi, & Caesarum, & Bruti, & aliorū propē innumerabilium: aut nisi vnus esset Cicero, quē omnibus aut praeferre, aut comparare saltem, opponereq; valeamus. Itaq; in Astrologia, in Geometria, in Dialecticis, omnibusq; ijs artibus, quae in veri inuestigatione versantur,

a 2 legim

legimus dignū conatibus suis præstitisse Romanā ingenia: sola autem Medicinæ ars, maximè salutaris, neglecta ab illis, inculta iacuit, ac derelicta: eam enim unam Græcarū artium non exercuisse Romanam grauitatem, testis est Plinius: quinimmo idem ipse scribit, Pop. Romanū medicinæ auidum expertum demum damnassee: itaq; caruisse medicis ad annum sexcentefimum: quod voluisse eos credendum est non artis odio, sed arificum: idq; Marcus Cato ad Marcum filium scribens manifestissimè docet. Quod si aut Hippocratē habuisset Roma, cui ciuium suorum salutem commendaret, aut Galeni interpretis monumenta cognouisset: quemadmodum & in re militari, & in rebus cæteris aut superauit omnes alias nationes, aut illis proxima fuit, & interdum æqualis: verisimile est, in Medicina quoque excellentē futuram fuisse industriam suam. Hanc tamen partē ut ostenderet Cornelius Celsus non esse supra vires Romanis, eam eloquentissimè et peritissimè tractauit octo libris: in quibus non solum eius partis, quæ victu, & eius quæ medicamentis, sed illius etiam, quæ manu medetur, præcepta copiosissimè dedit. A plerisq; autē dubitari video, an artē Cornelius exercuerit, alijs existimantibus caruisse illum usu: vel quia quadam prodidit artem coarguentia, qualia sunt, quæ de venarū pulsu, et vrine indicijs, ac de imparibus diebus, Asclepiadem sequutus, tradidit: uel quia in ponendis constituendisq; præceptis longissimè abijt

abijt à consuetudine eorū, qui de re medica ante illum scripserunt: alij s verò credentibus, non potuisse eum tam multa, tamq; insigniter & articulatè nouisse, tamq; postremò appositè ad usum, vt interdum multus sit in describenda via, & ratione exercendi artificis actus: nisi eam aliter quàm cogitando & audiendo, & legendo didicisset. Quamuis autem eorū, qui Cornelium fuisse medicum negant, & ratio, et autoritas me parū moueat: constat enim & Asclepiadem, & Themisonē eius discipulum, & Thessalum tam sepe, tamq; vehemēter à Galeno damnatū, aberrasse à placitis & à doctrina maiorū, cum tamē omnes medicinam usu ipso professi fuerint: quamobrem mirū non est, si in tam erratica disciplina, vix q; tandem autore Galeno consistente, idq; non tam certitudine rei, quàm imbecillitate eorū, qui post Galenū fuerunt, libuit Cornelio modo ingenioq; suo potius, quàm ex aliorū consuetudine scribēti, eorum mutare præcepta, quibus superiorum delere placita, & medendo & scribendo licuerat. Quamuis, inquam, me parū illi moueant: adducor tamen, nisi fallor, certissimis ad suspicandum argumentis, idem molitū fuisse Cornelium, quod Empedoclem, & Democritum fecisse legimus: scilicet, vt eam artem non ueluti purus medicus, atq; ad quæstū omnibus expositus, sed tanquam sapiens, ceu partē Philosophiæ explicaret, eam cum studio sapientiæ coniungens. Nam cum Plinius naturalis historiæ libros digesserit, indicans qua-

bus autoribus, testibusq; niteretur: libro primo, quem indicis loco esse voluit, separatim autorum meminit & medicorum: neq; unquam retulit Cornelium in medicos, sed in autores: Ex autoribus, inquit, C. Valgio, Cornelio Celso, M. Varro, &c. deinde subijcit externos: postremo numerat medicos, in quibus nusquam Cornelij nomē legitur. Quod si aut ille se medicum fuisset professus, aut alij in numerū medicorum Cornelium recepisset, Plinius illum certē non separasset in singulorum librorū indice à medicis. Constat præterea, vixisse Cornelium aut Augusti, aut Tiberij temporibus, aut C. Caesaris: cum Columella, qui Claudio potente rerum scripsit de re Rustica libros, mentionē fecerit eius, tanquam superioris: qua etate, si Plinio credimus, paucissimi Quiritiū artē medicam profitebantur, delegata ea cura ac meditatione vel Græcis hominibus, vel libertis, aut seruis: quales fuerunt Sallustius, Dionysius, & Curio, & ij, quos supra nominaui: quamobrem occidenti medicum, quod plerunq; serui essent, pœna erat ex constitutionibus non valde magna pecunia: liberi enim hominis nulla est aestimatio. Cornelium verò fuisse ingenuum Romanū satis indicant tria nomina: cum libertos constet duobus, seruos autē vno tantū nomine fuisse demonstratos. Ceterum qualis qualis ille fuerit, dignus est profectò vel doctrina vel elegātia non solum qui legatur, sed qui semper habeatur in manibus. Quamuis autem ubiq; illum reprehendat Fabius

Quint

Quintilianus, itaq; interdum leuiter, vt studio id eum efficere cognoscas & emulatione (scripsit enim vterq; Rhetoricos libros) tamē veritate ita cogente, eruditū virum eum appellat, lib. 1. x. & lib. sequenti: Scripsit, inquit, non parum multa Cornelius Celsus, Scepticos sequutus, nō sine cultu, ac nitore. Columella verò lib. 1. 1. De re rustica, eum fuisse tradit non solum agricolationis, sed vniuersae naturae prudentē. Cum autē Cornelius & ius ciuile, & philosophiam monumentis illustrauerit, suis & rei militaris, & rustica etiam & medicinae praecepta reliquerit: dignus (ut ait idem Fabius) vel ipso proposito, vt eum scisse omnia illa credamus: quis erit qui se satis putet eruditum, cui ea, quae supersunt, reliquiae uigiliarum tam elaboratarum ignotae fuerint? Quaedam tamen ab eo fateor esse prodita, quae vel insolentia, vel nouitate detertere lectore possunt: quale illud est, quod de aqua frigida libro primo traditur: qua insusa, putat ille sanari posse infirmitatē capitis, & praeterea uitari grauedines, ac destillationes: quibus intemperantia victus, et incontinentia voluptatis praecipue aetas haec nostra grauissimè torquetur. Caterum si balneis nunc uteremur, ubi calida sordes mundaretur capitis, & sudor vapores iam itinere patefacto emitteret, itaq; quotidie quasi caput purgaretur: non esset fortasse usus aquae frigidae tam periculosus, quam vulgò creditur. Neq; etiam ille simpliciter infundi frigidam iubet, sed calidariū proponit, in quo

a 4 sudet

sudetur: & calida aqua perfundi præcipit, tum
 tepida, deinde frigida. Plin. item lib. XXVIII.
 capite IIII. Perfundere, inquit, caput aqua ca-
 lida ante balnearum vaporacionem, et postea frigi-
 da, saluberrimum intelligitur. Quæ res profecto
 nisi esset valde salutaris, neque imperite eam &
 imprudenter tum precise laudasset Cornelius: neq;
 Plinius ita manifestè idem probaret: cum præ-
 sertim Senecam eo remedio semper usum fuisse
 legamus: cuius rei certè rationem reddere possem
 à re medica non abhorrentem, si aut id mihi ab
 initio proposuissem, cum epistolam hanc scribere
 institui: aut esset hoc muneris partiumq; mearum.
 Illud equidem animadverti, sequutū esse Corne-
 lium in plerisq; Hippocratem, quem lib. VI. pa-
 rentem omnis medicinæ appellat: quamobrem non
 potest hic noster Latinus Hippocrates reprehendi,
 quin alteri quoq; idem vitij tribuatur. nam si
 dixerimus, nimis generaliter, & nulla reddita
 causa hunc frequenter præcepta dedisse medici-
 næ: cum eadē sit ratio atq; via Hippocratis, inter-
 pretandus potius, & distinctionibus explican-
 dus erat Cornelius, quàm improbandus, atq; rei-
 ciendus: id quod videmus in Hippocrate factum
 fuisse à Galeno, non tam, quàm isti sunt, delicato
 & moroso, certè tamē doctiore atq; peritior: ita
 enim didicissent medici, à Cornelio de rebus ad
 artē suam pertinentibus proprijs, suisq; Latinis
 vocibus loqui: & hunc gravissimum in primis
 autorem loco suo, suisq; sedibus posuissent: &
 post

postremo planè fecissent hominibus, non abhor-
 rere penitus à uero, quod à Cicerone scriptum fuit,
 Omnia Latinos inuenisse melius, quàm Græcos:
 aut ab illis accepta fecisse meliora. Sed inuidit (ut
 dixi) Fortuna cunctam Romanis hominibus se-
 licitatē. Nos verò, qui aliquid nostra cura præ-
 stare posse fortasse credimur Cornelio, quòd eo
 iamdiu utamur magistro scribendi, atq; uiuendi
 (quamuis illi ignauia fortè nostra non æquè sty-
 lum ac salutē debeamus) nonnihil temporis con-
 sumpsimus in recognoscendo hoc eruditissimo au-
 tore: eumq; emendatissimū, quantum ipsi efficere
 potuimus, excudendū dedimus Sebastiano Gry-
 phio Typographo nobilissimo, ut tam culto, &
 tam nitido scriptore uti commodè possint omnes,
 quibus bonæ artes curæ sunt: & ut Medicis,
 quorum ætas nostra maximè ferax est, animum
 faciamus ad Cornelium legendum, interpretan-
 dum, illustrandum: ita enim futurum facile spe-
 ramus, ut omnes paulatim planè Latine de me-
 dicina loquentes audiamus: & aliquis apud no-
 stros eam laudē consequi curet, quam apud Græ-
 cos consequutus est Galenus: cuius nisi labor &
 industria tantum luminis addidisset Hippocrati,
 is fortè malo magno publico turpius extinctus
 fuisset, quàm iacet Cornelius: cuius laudi dignæ
 immortalitate si uitio ingenij Medici horū tem-
 porum, & posteriores inuidebunt, suus tamē ni-
 tor & elegantia, vel illis contrà nitentibus, cum
 à tenebris & ab interitu vindicabunt.

A V R E L I I
C O R N E L I I
C E L S I
D E
M E D I C I N A
L I B E R P R I -
M V S .
*



medice

*V*T ALIMENTA sanis cor-
poribus Agricultura, sic sani-
tatem agris Medicina promit-
tit. Hac nusquam quidem non
est. Siquidem etiam imperitis-
sinæ gentes herbas, aliq; prompta in auxilium
vulnerum, morborumq; nouerunt. Veruntamen
apud Græcos aliquanto magis, quàm in cæteris
nationibus excolta est: ac ne apud hos quidem
à prima origine, sed paucis ante nos seculis, vt-
pote cum vetustissimus autor Aesculapius cele-
bretur. Qui quoniam adhuc rudem & vulgarem
hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in deo-
rum numerum receptus est. Huius deinde duo
filij Podalyrius & Machaon bello Troiano du-
cem Agamemnonē secuti, non mediocrem opem
commilitonibus suis attulerunt. Quos tamen Ho-
merus non in pestilentia, neq; in varijs generibus
morborum aliquid attulisse auxilij, sed vulneri-
bus tantummodo ferro, & medicamentis mederi
solitos

solitos esse proposuit. Ex quo apparet, has partes medicinae solas ab his esse tentatas, easque esse vetustissimas. Eodemque autore disci potest, morbos, tum ad iram deorum immortalium relatos esse, & ab iisdem opem posci solita. Verique simile est, inter nonnulla auxilia aduersae valetudinis, plerumque tamen eam bonam contigisse ob bonos mores, quos neque desidia, neque luxuria * vitia * tentarant. Siquidem haec duo, corpora prius in Graecia, deinde apud nos affligerunt. Ideoque multiplex ista medicina, neque olim apud Graecos, neque apud alias gentes necessaria, vix aliquos ex bonis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos (de quibus retuli) nonnulli clari viri medicinam exercuerunt, donec maiore studio literarum disciplina agitari coepit: quae ut animo praecipue omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoque medendi scientia, sapientiae pars habebatur, ut & morborum curatio, & rerum naturae contemplatio sub iisdem autoribus nata sit. Scilicet his hanc maxime requirentibus, qui corporum suorum robora * inquieta * inquieta cogitatione, nocturnaque vigilia minuerant. Ideoque multos ex sapientiae professoribus, peritos eius fuisse accepimus. Clarissimos vero ex his Pythagoram, & Empedoclem, & Democritum. Huius autem (ut quidam crediderunt) discipulus Hippocrates Coss, primus quidem ex omnibus Hippocrates memoria dignis ab studio sapientiae disciplinam tcs. hanc separavit, vir & arte & facundia insignis.

Disciplina
corpori ini-
mica.

Hippocra-
tes.

gnis. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras, & Chrysippus, tum Herophilus & Erasistratus, sic artem hanc exercuerunt, ut etiā in diuersas curandi vias processerint. Iisdemq; temporibus, in tres parteis medicina diducta est, ut una esset quæ victu, altera quæ medicamentis, tertia quæ manu mederetur. Primam *διαίτητικὴν*, secundam *φάρμακνευτικὴν*, tertiā *χειρουργικὴν*, Græci nominauerunt. Eius autem, quæ victu morbos curat, longè clarissimī auctores etiam altius quædam agitare conati, rerum quoque naturæ sibi cognitionem vendicauerunt, tanquam sine ea trunca & debilis medicina esset. post quos Serapion primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam professus, in usu & experimentis eam posuit. Quem Apollonius & Glaucias, & aliquanto post Heraclides Tarentinus, & aliqui non mediocres viri secuti, ex ipsa professione, se Empiricos appellauerunt. Sic in duas parteis ea quoque quæ victu curat, medicina diuisa est, alijs rationalem artem, alijs usum tantum sibi vendicantibus, nullo verò quicquam post eos, qui suprā comprehensi sunt, agitante, nisi quod acceperat: donec Asclepiades medendi rationem ex magna parte mutauit. Ex cuius successoribus Themison nuper ipse quoque quædam in senectute deflexit. Et per os quidem maximè viros salutaris ista nobis professio increuit. Quoniam autem ex tribus medicine partibus, ut
diffic

difficilima, sic etiam clarissima est ea, quæ mor-
bis medetur, ante omnia de hac dicendum est. Et
quia prima in ea dissensio est, quòd alij sibi ex-
perimentorum tantummodo notitiam necessa-
riam esse contendunt, alij nisi corporum rerumq;
ratione comperta, non satis potentem vsum esse
proponunt: indicandum est, quæ maxime ex
utraq; parte dicantur, quòd facilius nostra quo-
que opinio interponi possit. Igitur hi, qui ratio-
nalem medicinam profitentur, hæc necessaria
esse proponunt, Abditarum, & morbos conti-
nentium caussarum notitiam, deinde Euiden-
tium, post hæc etiam Naturalium actionum, no-
uissimè partiũ Interiorum. Abditas causas vo-
cant, in quibus requiritur, ex quibus principijs
nostra corpora sint, quid secundam, quid aduer-
sam valetudinem faciat. Neque enim credunt
posse eum scire, quomodo morbos curare conue-
niat, qui vnde hi sint, ignoret. Neque esse dubiũ,
quin alia curatione opus sit, si ex quatuor prin-
cipijs, vel superans aliquid, vel deficiens aduer-
sam valetudinem creat, vt quidam ex sapien-
tiæ professoribus dixerunt, alia, si in humidis
omne vitium est, vt Herophilo visum est: alia,
si in spiritu, vt Hippocrati: alia, si sanguis in
eis venas, quæ spiritui accommodatæ sunt, trans-
funditur, & inflammationẽ, quàm Græci φλε-
γμονην, nominant, excitat, eaq; inflammatio,
talem motum efficit, qualis in febre est, vt Era-
sistrato placuit: alia, si manantia corpuscula, per
inuisib

inuisibilia foramina subsistendo, iter claudunt,
 ut Asclepiades contendit. Eum verò recte cu-
 raturū, quem prima origo causse non fefellerit.
 Neq; verò inficiantur, experimenta quoque esse
 necessaria. Sed ne ad hæc quidē aditum fieri po-
 tuissē, nisi ab aliqua ratione contendunt. Non
 enim quidlibet antiquiores viros ægris inculcas-
 se: sed cogitasse, quid maxime conueniret, & id
 vsu explorasse, quod antè coniectura aliqua du-
 * an ini- xissent: Neq; interesse, * an nunc iā pleraq; explo
 tia plera- rata sint, si à consilio tamē cœperunt. Et id qui-
 que dem in multis ita se habere. Sæpe verò etiā noua
 incidere genera morborum, in quibus nihil ad-
 huc vsus ostenderit. Et ideo necessarium sit ani-
 maduertere, vnde ea cœperint: sine quo nemo
 mortalium reperire possit, cur hoc, quàm illo po-
 tius utatur. Et ob hæc quidem in obscuro positas
 causas persequuntur. Euidentes verò has appel-
 lant, in quibus quærunt initium morbi calor attu-
 lerit, an frigus: fames, an satietas: & quæ simi-
 lia sunt. Occursum enim vitio dicunt eum, qui
 originem non ignorarit. Naturales verò corporis
 actiones appellant, per quas spiritum trahimus,
 & emittimus cibum, potionemq; et assumimus,
 & concoquimus. Itemq; per quas eadem hæc in
 omnes membrorū partes digeruntur. Tum requi-
 runt etiā, quare venæ nostræ modò submittāt se,
 modò attollant: quæ ratio somni, quæ vigiliæ sit.
 Sine quorū notitia neminem putant vel occurre-
 re, vel mederi morbis inter hæc nascētibus posse.

Ex

Ex quibus quammaxime pertinere ad rem concoctio videtur. Huic potissimum insistant, & duce alij Erasistrato, atteri cibum in ventre contedunt: alij Plistonico, Praxagoræ discipulo, putrescere: alij credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui. Acceduntq; Asclepiadis æmuli, qui omnia ista vana & superuacua esse proponunt. Nihil enim concoqui, sed crudam materiã (sicut assumpta est) in corpus omne diduci. Et hæc quidẽ inter eos parum constant. Illud verò conuenit, aliud dandum cibum laborantibus, si hoc: aliud, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum querendum esse, qui facillimè teri possit. Si putrescit, eum in quo hoc expeditissimum est. Si calor concoquit, eum qui maximè calorem moueat. At nihil ex his esse querendum, si nihil concoquitur. Ea verò sumenda quæ maxime manent, qualia assumpta sunt. Eademq; ratione cum spiritus grauis est, cum somnus, aut vigilia urgent, eum mederi posse arbitratur, qui prius illa ipsa qualiter eueniant perceperit. Præter hæc cum in interioribus partibus & dolores, & morborum varia genera nascantur, neminem putant his adhibere posse remedia, quæ ipse ignoret. Necessarium ergo esse incidere corpora mortuorum, eorumq; viscera atque intestina scrutari: longeq; optimè fecisse Herophilum, & Erasistratum, qui nocentes homines à regibus ex carcere acceptos, viuos inciderint, considerarintq; etiam spiritu remanente, ea quæ natura antè clausisset, eorumq; posita

Per laeuo-
rē, & con-
tactū, aspe-
ritatem in-
telligit, &
quod illi
est cōtra-
rium.

posituram, colorem, figuram, magnitudinē, ordi-
nem, duriciem, molliciem, lauorem, contactum:
processus deinde singulorum, & recessus: & si-
ue quid inseritur alteri, siue quid partē alterius
in se recipit. Neq; enim cum dolor intus incidit,
scire quid doleat, eum, qui qua parte quodque
viscus, intestinum ue sit, non cognouerit. Neque
curari id quod aegrum est posse, ab eo, qui quid
sit, ignoret. Et cum per vulnus alicuius viscera
patefacta sunt, eum qui sanæ cuiusquam colorem
partis ignoret, nescire quid integrum, quid cor-
ruptum sit. Ita ne succurrere quidem posse corru-
ptis, aptiusq; extrinsecus imponi remedia, com-
pertis interiorum & sedibus & figuris, cogni-
taq; eorum magnitudine: similesq; omnia, qua
posita sunt, rationes habere. Neq; esse crudele (si-
cut pleriq; proponunt) hominum nocentium, &
horum quoq; paucorum supplicij, remedia popu-
lis innocentibus seculorum omnium quari. Con-
trā, hi qui se Empiricos ab experientia nomi-
nant, euidentes quidem causas, ut necessarias
amplectuntur: obscurarum verò causarum, &
naturalium actionum questionem ideo superua-
cuam esse contendunt, quoniam incomprehensi-
bilis natura sit. Non posse verò comprehendere, pa-
tere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia:
cum de ista re, neque inter sapientie profes-
sores, neq; inter ipsos medicos conueniat. Cur enim
potius aliquis Hippocrati credat, quā Hero-
philo? Cur huic potius, quā Asclepiadi? Si ra-
tiones

tiones sequi velit, omnium posse videri non improbabiles: si curationes, ab omnibus his agros perductos esse ad sanitatem. Ita neque disputationi, neque auctoritati cuiusquam fidem derogari oportuisse. Etiam sapientiae studiosos maximos medicos esse, si ratiocinatio hoc faceret: nunc illis verba superesse, deesse medendi scientiam. Differre quoque pro natura locorum genera medicinae, & aliud opus esse Romae, aliud in Aegypto, aliud in Gallia. Quod si morbos eadem caussa facerent ubique, remedia quoque ubique eadem esse debuissent. Saepe etiam causas apparere, ut puta lippitudinis, vulneris, neque ex his patere medicinam. Quod si scientiam hanc non subiiciat evidens caussa, multominus eam posse subicere, quae in dubio est. Cum igitur illa incerta, incomprehensibilisque sit, à certis potius, & exploratis petendum esse praesidium, id est his, quae experientia in ipsis curationibus docuerit, sicut in ceteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem, aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. Ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere: eò quoque disci, quod qui diuersa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque à naturalibus actionibus, quae apud eos diuersae erant, sed ab experimentis, prout cuique responderant, medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis questionibus

b deducit

deductam esse medicinam, sed ab experimentis. Aegrorum enim, qui sine medicis erant, alios propter auiditatē primis diebus, protinus cibum assumpsisse, alios propter fastidiū abstinuisse, leuatumq; magis eorum morbum esse, qui abstinerant: itemq; alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionē eius, optime deinde his cessisse, qui post finem febris id fecerint. Eademq; ratione, alios inter principia protinus vsos esse cibo pleniore, alios exiguo, grauiorēq; eos factos, qui se implerent. Hac, similiaq; cum quotidie inciderent, diligentes homines notasse, quæ plerunque melius responderent: deinde ægrotantibus ea præcipere cœpisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciose discernentem à salutaribus. Repertis deinde iam medicinae remedijs, homines de rationibus earum differere cœpisse, nec post rationem medicinam esse inuentam, sed post inuentam medicinam, rationem esse quesitam. Requiritur etiam, si ratio idem doceat, quod experientia, an aliud. Si idem, superuacuum esse: Si aliud, esse contrarium. Primò tamen remedia exploranda summa cura fuisse, nunc verò iam explorata esse, neque vlla aut noua genera morborum reperiri, aut nouam desiderari medicinam. Quòd si iam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed eum protinus visurum, cui morbo id proximum sit, tentatur

taturumq; remedia similia illis, quæ vicino malo sæpe succurrerint, & per eius similitudinem openi reperturum. Neque enim se dicere consilio medicum non egere, & irrationale animal hanc artem posse præstare: sed has latentium rerum coniecturas ad rem non pertinere: quia non intersit, quid morbi faciat, sed quid tollat. Neq; ad rem pertineat, quomodo, sed quid optimè digeratur. Siue hac de causa concoctio *interci- *incidat, siue de illa: & siue concoctio sit illa, siue tantum digestio. Neque quærendum esse quomodo spiremus: sed quid grauem, tardumq; spiritum expediat. Neque quid venas moueat, sed quid quæq; motus genera significant. Hæc autem cognosci experimentis, & in omnibus eiusmodi cogitationibus in vtrunque partem differi posse. Itaque ingenium & facundiam vincere, morbos autem non eloquentia, sed remedijs curari. Quæ si quis elinguis, usu *discreta bene norit, *discre- hunc aliquanto maiorem medicum futurum, quàm tuus si sine usu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, supernacua esse tantummodo. Id verò quod restat, etiam crudele, viuorum hominum aluum atq; præcordia incidi, & salutis humane præsidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam inferre, cum præsertim ex his, quæ tanta violentia querantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, leuorem, molliem, duritiem, similiaq; omnia non esse
b 2 talia

talia inciso corpore, qualia integro fuerint: quia
 cum corporibus inuiolatis, hac tamen metu, do-
 lore, inedia, cruditate, lassitudine, mille alijs me-
 diocribus affectibus, saepe mutetur: multo magis
 verisimile est, interiora, quibus maior mollities,
 lux ipsa noua sit, sub grauissimis vulneribus, &
 ipsa trucidatione mutari. Neque quicquam esse
 stultius, quam quale quicquam viuo homine est,
 tale existimare esse moriente, imò iam mortuo.
 Nam vterum quidem, quò minus ad rem perti-
 neat, spirante homine posse diduci? Simul atque
 verò ferrum ad praecordia accessit, & discis-
 sum transversum septum est, quod membrana
 quadam superiores partes ab inferioribus didu-
 cit (διάσπαγμα Græci vocant) hominem proti-
 nus animā amittere. Ita demum mortui praeco-
 rdia, & viscus omne in conspectum latrocinan-
 tis medici dari: quod necesse sit tale esse, quale
 mortui sit, non quale viui fuit. Itaq; cōsequi me-
 dicum, ut hominē crudeliter ingulet: non ut sciat
 qualia viui viscera habeamus. Si quid tamē sit,
 quod adhuc spirante homine conspectui subijcia-
 tur, id saepe casum offerre curantibus. Interdum
 enim gladiatorem in harena, vel militem in acie,
 vel viatorem à latronibus exceptum, sic vul-
 nerari, ut eius interior aliqua pars aperiatur,
 & in alio alia sita, ita sedem, positum, ordinem, fi-
 guram, similiaq; cognoscere prudentem medi-
 cum, non cadem, sed sanitatem molientē, idq; per
 misericordiam discere, quod alij dira crudelitate
 cognou

cognouerint. Ob hæc ne mortuorum quidem lace-
 rationem necessariam esse. Quæ etsi non crudelis,
 tamen fœda sit, cum aliter pleraque in mortuis
 se habeant. Quantum verò in viuis cognosci po-
 test, ipsa curatio ostendat. Cum hæc per multa vo-
 lumina, perq; magnæ contentionis disputationes
 à medicis sæpe tractata sint, atq; tractentur: subij-
 ciendum est quæ proxima vero videri possint.
 Ea neq; addicta alterutri opinioni sunt, neq; ab
 vtraque nimium abhorrentia, media quodam-
 modo inter diuersas sententias. Quod in plurimis
 cōtentionibus deprehendere licet, sine ambitione
 verum scrutantibus, vt in hac ipsa re. Nam quæ
 demum causæ vel secundam valetudinem præ-
 stent, vel morbos excitent: quomodo spiritus, aut
 cibis, vel detrahatur, vel digeratur, ne sapientiæ
 quidem professores scientia comprehendunt, sed
 coniectura persequuntur. Cuius autem rei non est
 certa notitia, eius opinio certum reperire reme-
 dium non potest. Verumq; est, ad ipsam curan-
 di rationem nihil plus conferre, quàm experien-
 tiam. Quanquàm igitur multa sint ad ipsas ar-
 tes propriè non pertinentia, tamen eas adiuvat
 excitando artificis ingenium. Itaq; ista quoq; natu-
 ræ rerum contēplatio,* quamuis non faciat medi-
 cum aptiorem, tamen medicinæ reddit profectum.
 Veriq; simile est, & Hippocratem, & Erasistra-
 tum, & quicumque alij non contenti febres &
 vlcera agitare, rerum quoq; naturam ex aliqua
 parte scrutati sunt, nō ideo quidē medicos fuisse,
 * Aliàs :
 quāuis nō
 faciat me-
 dicū: aptio-
 rem tamē
 medicinæ
 reddit, atq;
 perfectū.

b 3 verum

Caro ex
naturalib⁹
prolapsa.

verū ideo quoq; maiores medicos extitisse. Ra-
tione verò opus est ipsi medicinæ, etsi non inter
obscuras causas, neq; inter naturales actiones,
tamen sæpe. * Est enim hæc ars cōiecturalis: neq;
respondet ei plerunq; non solum coniectura, sed
etiam experientia. Et interdum non febris, non
cibus, non somnus subsequitur sicut assuevit. Ra-
rius, sed aliquando tamen morbus quoque ipse
novus est, quem non incidere, manifeste falsum
est: cū etate nostra quedam ex naturalibus
partibus carne prolapsa, et arente, intra paucas
horas expiraverit: sic ut nobilissimi medici, neq;
genus mali, neq; remedium inuenerint. Quos ego
nihil ideo tentasse iudico, quia nemo in splendi-
da persona periclitari coniectura sua voluerit: ne
occidisse, nisi seruasset, videretur. Veri tamen si-
mile est, potuisse aliquid cogitare, detracta tali
verecundia, et fortasse responsurū fuisse id, quod
aliquis esset expertus. Ad quod medicina genus
neq; semper similitudo aliquid cōfert, etsi quan-
do confert, tamen id ipsum rationabile est inter
multa similia genera, & morborum, & reme-
diorum cogitare, quo potissimū medicamento sit
utendum. Cū igitur talis res incidit, medicus a-
liiquid oportet inueniat, quod non utiq; fortasse,
sed sæpius tamen etiam respondeat. Petet autem
novum quoq; cōsiliū, non a rebus latentibus (istæ
enim dubiæ, & incertiæ sunt) sed ab his, quæ ex-
plorari possunt, id est evidētibus causis. Interest
enim fatigatio morbi, an sitis, an frigus, an ca-
lor,

lor, an vigilia, an fames fecerit, an cibi, viniq;
abundantia, an intemperantia libidinis. Neq; igno-
rare huc oportet, quæ sit agri natura, humidum
magis, an magis siccu corpus eius sit: validi ner-
ui, an infirmi: frequens aduersa valetudo, an ra-
ra: eaq; cum est, vehemens esse soleat, an levis:
breuis, an longa. Quod is vitæ genus sit secutus,
laboriosum, an quietum: cu luxu, an cum frugali-
tate. Ex his enim, similibusq; saepe curandi noua
ratio ducenda est. Quamuis ne hæc quidẽ sic præ-
teriri debent, quasi nullam cõtrouersia recipiant.
Nam & Erasistratus non ex his fieri morbos
dixit, quum & alij, et ydem alias post ista non
febricitarent: et quidem medici seculi nostri sub
autore (vt ipsi videri volũt) Themisone conten-
dunt, nullius causse notitia quicquã ad curatio-
nes pertinere, satisq; esse quedam cõmunia mor-
borum intueri. Siquidem horum tria genera esse,
vnum adstrictu, alteru fluens, tertium mixtum.
Nam modo parũ excernere agros, modò nimiu:
modò alia parte parum, alia nimiu. Hæc autem
genera morborum, modò acuta esse, modò longa:
& modò increfcere, modò cõsistere, modò minui
consueverunt. Cognito igitur eo quod ex his est, si
corpus adstrictum est, digerendum esse: si proflu-
uio laborat, cõtinentum: si mixtum vitiiis habet,
occurrendum subinde vehementiori malo: & a-
liter acutis morbis medendum, aliter vetustis,
aliter increfcenribus, aliter subsistentibus, aliter
iam ad sanitatem inclinantibus. Horum obser-
uatio

uationem medicinam esse, quam ita finiunt, ut
 quasi viam quandam, quam μέθοδος Græci no-
 minant, eorumque quæ in morbis communia sunt,
 contemplatricem esse contendunt. ac neque ratio-
 nalibus se, neque experimenta tantum spectanti-
 bus annumerari volunt, cum ab illis eo nomine
 * nolunt dissentiant, quod in cōiectura rerū latent in* vo-
 lunt esse medicinam ab his, eò quod parum artis
 esse in obseruatione experimētorum credūt. Quod
 ad Erasistratum pertinet, primum ipsa eviden-
 tia eius opinioni repugnat, quia raro, nisi post
 horum aliquid morbus venit. Deinde nō sequi-
 tur, ut quod aliū nō afficit, aut eundem alias,
 id ne alteri quidē, aut eidem tēpore alio noceat.
 Possunt enim quadā subesse corpori, vel ex in-
 firmitate eius, vel ex aliquo affectu, quæ vel in
 alio nō sunt, vel in hoc aliās nō fuerunt, eaq; per
 se non tāta vi concitant morbū, tamē obnoxium
 magis alijs iniurijs corpus efficiūt. Quod si con-
 templationē rerū naturæ (quā temere medici sibi
 vendicant) satis cōprehendisset, etiā illud scisset,
 nihil omnino ob vnā causā fieri, sed id pro
 causā apprehēdi, quod cōtulisse plurimum vide-
 tur. Poteſt autē id dum solū est, nō mouere, quod
 iunctum alijs maxime mouet. Accedit ad hæc,
 quod ne ipse quidē Erasistratus, qui trāsſuſo in
 arterias sanguine febrē fieri dicit, idq; nimis re-
 plecto corpore icidere reperit, cur ex duobus æquē
 repletis, alter in morbū inciderit, alter omni pe-
 riculo vacarit (quod quotidie fieri apparet) non
 discre

discreuerit. Ex quo disci potest, ut vera sit illa transusio, tamen illa non per se (cum plenum corpus est) fieri: sed cum horum aliquid accesserit. Themisonis verò æmuli, si perpetua quæ promittunt habet, magis etiā quam ulli rationales sunt. Neq; enim si q̄s non oīa tenet, quæ rationalis alius probat, protinus alio nouo nomine artis indiget: si modò, quod primū est, non memoriæ soli, sed rationi quoq; insistit. Si verò, quod propius est, vix vlla perpetua præcepta medicinalis ars recipit: ydē sunt quod q̄, quos experimēta sola sustinent. Eo magis, quoniā si cōpresserit aliquē morbus, an fuderit, quilibet etiā imperitissimus videt. Quid autē compressum corpus resoluat, quid solutū teneat, si à ratione tractum est, rationalis est medicus. Si (ut ei, qui se rationalem negat, confiteri necesse est) ab experientia Empiricus est. Ita apud eū morbi cognitio extra artē, medicina intra vsum est. Neq; adiectū quicquā Empiricorum professioni, sed dēptum est: quoniā illi multa circumspiciunt, hi tantū facilima, & non plus quā vulgaria. Nā & qui pecoribus ac iumentis medetur, cum propria cuiusq; ex multis animalibus nosse non possint, cōmunibus tantummodo insistant. Et extere gentes, cum subtilē medicīnæ rationē non nouerint, communia tantum vident. Et qui amplē valetudinarios nutriūt (quia singulis summa cura consulere non sustinent) ad cōmunia ista cōfugiunt. Neq; Hercules istud, & antiqui medici nescie-

b s runt,

Hinc medicina, ars interpolis à Plinio dicta est.

runt, sed his cōtenti non fuerunt. Ergo etiā vetustissimus autor Hippocrates dixit, mederi oportere & communia, & propria intuentē. Ac ne isti quidem ipsi intra suā professionē consistere ullo modo possunt. Siquidē et compressorum & fluentiū morborū genera diuersa sunt, faciliusq; id in his quæ fluūt, inspicere potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibū vomere: aliud deiectionibus, aliud torminibus laborare: aliud sudore digeri, aliud tabe cōsumi. Atq; in partes quoq; humor erumpit, vt in oculos auresq;. Quo periculo nullum humanū membrum vacat. Nihil autem horum sic, vt aliud curatur. Ita protinus in his à cōmuni fluentis morbi cōtemplatione, ad propriā medicina descendit. Atq; in hac quoq; rursus alia proprietatis notitia sæpe necessaria est: quia non eadem omnibus, etiā in similibus casibus opitulant. Siquidē certæ quædā res sunt, quæ in pluribus vārem aut adstringūt, aut resolvunt. Inueniuntur tamen, in quibus aliter atq; in cæteris, idē eueniat. In his ergo cōmunium inspectio cōtraria est, ppriorum tantum salutaris. Et causæ quoq; æstimatio sæpe morbum soluit. Ergo etiā ingeniosissimus seculi nostri medicus, quem nuper vidimus, Cassius febricitanti cuidā, & magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi cæpisse cognosceret, aquā frigidā ingressit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo freghisset, protinus febrem somno et sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune prouidit, nō ex eo, quod

quod aut strictum corpus erat, aut fluebat: sed ex
 caussa, quæ antè præcesserat. Estq; etiã proprium
 aliquid & loci & tēporis, istis quoq; autoribus,
 qui cū disputāt, quemadmodum sanis homini-
 bus agēdum sit, præcipiunt, vt grauibus aut lo-
 cis aut temporibus, magis vitetur frigus, æstus,
 satietas, labor, libido, magisq; vt conquiescat ijs-
 dem aut locis, aut temporibus. si quis grauitatem
 corporis sentit, ac neq; vomitu stomachum, neq;
 purgatiōe aluum sollicitet. Quæ vera quidē sunt,
 à communibus tñ ad quædā propria descēdunt:
 nisi persuadere nobis volunt, sanis quidē consi-
 derandum esse, qđ cælum qđ tempus anni sit, æ-
 gris verò non est. Quibus tanto magis omnis ob-
 seruatio necessaria est, quāto magis obnoxia of-
 fensis infirmitas est. Quinetiā morborum in ijsdē
 hominibus aliæ atq; aliæ proprietates sunt: &
 qui secundis aliquñ frustra curatus est, cōtrarijs
 sæpe restituitur. Plurimaq; in dando cibo discri-
 mina reperiuntur, ex quibus contentus vno ero.
 Nā famem facilius fert adolescens, quā puer:
 facilius* in denso cælo, quā in tenui: facilius in
 hyeme, quā æstate: facilius vno cibo, quā pran-
 dio quoq; assuetus: facilius in exercitatus, quā
 exercitatus homo sustinet. Sæpe aut in eo magis
 necessaria cibi festinatio est, qui minus in ediam
 tolerat. Ob quæ competit eū, qui propria non no-
 uit, communia tantum intueri debere: eumq; qui
 nosse propria potest, illa quidem nō oportere ne-
 gligere, sed his quoq; insistere. Ideoq; cū par
 scientia

* Quibus-
 dā videtur
 hic legēdū
 potius, in
 tenui cœ-
 lo, quā i
 dēso: & æ-
 state quā
 hyeme:
 propterea
 quod Hip-
 pocrat. di-

eat libro 1. scientia sit, utiliorem tñ medicum esse amicū
 Aphor Vē quā extraneū. Igitur ut ad propositū meū
 res hyeme redeam, rationalem quidē puto medicinam esse
 & vere sunt redere, rationalem quidē puto medicinam esse
 calidissimā. debere, instrui verò ab evidentibus causis, obs-
 Quare per curis omnibus non à cogitatione artificis, sed ab
 ea tempo- ipsa arte reiectis. Incidere autē viutorum corpo-
 ra alimēta ra, & crudele, & superuacuum est: mortuorum
 copiosiora corpora discentibus necessarium. Nā positum, &
 sunt exhibenda. Et ordinē nosse debent: quæ cadauera melius, quā
 Paul⁹ Aegina lib. vinus, et vulneratus homo representant. Sed et
 iridē 1. 53. cætera, quæ modò in viuis cognosci possunt, in
 Hyeme qui ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius,
 dē & for- sed aliquanto mitius, vsus ipse monstrauit. His
 riori exer- propositis, primū dicam, quemadmodum sanos
 citatiōe, & agere cōueniat: tum ad ea transibo, quæ ad mor-
 pleniore ti bo vtendū est. Nisi eō
 bo vtendū est. Nisi eō
 referas, quod ī dē-
 so cælo, &
 per hyemē,
 corpora
 sunt robu-
 stiora, atq;
 iō etiā faci-
 lius quāli-
 bet mole-
 stia ferunt.

* Reuēto
 res videtur
 transferre
 Plin li. 29.
 cap. 1.

Quemadmodum sanos agere conueniat.

C A P. I.



ANVS homo, qui & bene valet,
 & sue spontis est, nullis obligare se
 legibus debet: ac neq; medico, neq;
 iatralipta egere. Hūc oportet va-
 rium habere vitæ genus: modò ruri esse, modò in
 vrbe: sæpiusq; in agro, nauigare, venari, quiesce-
 re interdum, sed frequētius se exercere. Siquidē
 ignauia corpus hebetat, labor firmat: illa maturā
 senectutem, hic lōgā adolescentiā reddit. Prodest
 etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis
 uti: modò vngi, modo id ipsum negligere: nullum
 cibi genus fugere, quo populus vtatur: interdum

in com

in conuiuio esse, interdū ab eo se retrahere: modò plus iusto, modò non amplius assumere: bis die potius, quàm semel cibū capere: et semper quàm plurimum, dummodo hunc cōcoquat. Sed ut huius generis exercitationes, cibiq; necessarij sunt, sic athletici superuacui. Nā & intermissus propter ciuiles aliquas necessitates ordo exercitationis corpus affligit: & ea corpora, quæ more eorum repleta sunt, celerrime & senescunt, & agrotāt. Cōcubitus verò neq; nimis concupiscendus, neq; nimis pertimescendus est. Rarus, corpus excitat, frequens soluit. Cū autē frequens, non numero sit, sed natura, ratione ætatis & corporis scire licet, eum non inutilem esse, quem corporis neq; lāguor, neq; dolor sequitur. Idē interdū peior est, noctu tutior: ita tamē, si neq; illū cibis, neq; hunc cū vigilia labor statim sequit̃. Hæc firmis seruanda sunt, cauendumq; ne in secunda valetudine, aduersæ præsidia cōsumantur.

Quæ stomacho imbecillis seruanda sint.

C A P. II.

ET imbecillis stomacho (quo in numero magna pars urbanorum, omnesq; penè cupidi literarum sunt) obseruatio maior necessaria est: ut quod vel corporis, vel loci, vel studij ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur qui bene concoxit, manē tuto surget: qui parum, quiescere debet: & si manē surgendi necessitas fuerit, redormire. Qui non concoxit, ex toto conquiescere, ac neq; labori se, neq; exercitationi, neq; negotio credere.

Paul⁹ Aegineta li. 1. ca. 37. Frequēs cōcubitus, corpus rari⁹, frigid⁹, & imbellius reddit.

credere. Qui crudus sine præcordiorum dolore ructat, is ex interuallo aquam frigidam bibere, & se nihilominus continere. Habitare verò ædificio lucido, per flatum æstiuum hybernium solem habente, cauere meridianum solem, matutinum & vespertinum frigus, itemq; auras fluminis, atq; stagnorum, minimeq; nubilo cælo, soli aperienti se committere, ne modò frigus, modò calor moueat. Quæ res maximè grauedines, distillationesq; concitat. Magis verò grauibus locis ista seruanda sunt, in quibus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem licet, integrum corpus esse, cum quotidie mane vrina alba, dein ruffa est. Illud concoquere, hoc concoxisse significat. Vbi expectatus est aliquis, paulum intermittere, deinde (nisi hyems est) fouere os multa aqua frigida debet, longis diebus meridiari potius ante cibum, sin minus, post eum: per hyemem potissimum totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, non post cibum id facere, sed post cōcoctionem. Quem interdum vel domestica, vel ciuilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod seruandum curationi corporis sui est. Prima autem eius cura-

Exercitatio. Exercitatio exercitatio est, quæ semper antecedere cibum debet: in eo, qui minus laborauit, et bene concoxit, amplior: in eo, qui fatigatus est, & minus concoxit, remissior. Comode verò exercent, clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio: atq; hæc non utiq; plana commodior est. Siquidem melius ascensus quoq; & descensus cum quadam varietate

varietate corpus moueat, nisi tamen id perquam
 imbecillum est. Melior autem est sub diuo, quam
 in porticu: melior (si caput patitur) in sole, quam
 in umbra: melior in umbra, quam parietes, aut
 viridaria efficiunt, quam quæ tecto subest: me-
 lior recta, quam flexuosa. *Exercitationis autem* *Lassitudo*
plerunq; finis esse debet sudor, aut certè lassitu- *est grani-*
do, quæ citra fatigationem sit, idq; ipsum, modò *tas corpo-*
minus, modò magis faciendum est. Ac ne his *ris. Vergil.*
quidem Athletarum exemplo, vel certa esse lex, *Lassitudo pa-*
vel immodicus esse labor debet. Exercitationem *uera col-*
recte sequitur, modò vinctio, vel in sole, vel ad *lo. quæ etiã*
ignem, modò balneum, sed in cõclauis, quàm ma- *citra labo-*
xime & alto, & lucido, et spatioso. Ex his re- *rẽ accidit.*
rò neutrum sæpe fieri oportet, sed sæpius alter- *Fatigatio-*
utrum pro corporis natura. Post hæc paulum con- *nẽ verò nĩ*
quiescere opus est. Vbi ad cibum ventum est, *mietatẽ la-*
nunquam utilis est nimia satietas. Sæpe etiam *boris itellĩ*
inutilis nimia abstinentia. Sæpe si qua intempe- *gimus. Idẽ*
*rantia subest, *durior est in potione, quàm in* *Veloces ia-*
esca. Cibus à salsamentis, oleribus, similibusq; *culo cer-*
rebus melius incipit. Tum caro assumenda est, *nos, cursũ-*
quæ assa optima, aut elixa est. Condita omnia *q; fatigat.*
duabus de causis inutilia sunt, quoniam et plus *quod mox*
propter dulcedinem assumitur, & quod modò *imodicũ la-*
par est, tamen ægrius cõcoquitur. Secunda men- *borẽ appel-*
sa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coace- *lauit. Verũ*
scit. Si quis itaq; hoc parum valet, palmulas po- *de generi-*
maq; & similia melius primo cibo assumit. Post *b^o lassitu-*
multas potiones, quæ aliquantum sitim excessẽ- *dinis legẽ-*
runt, *dus ẽ lib. 3.*
 Galenĩ de
 Sanitate
 tuenda.
 ** tutior*
 Cibus.

runt, nihil edendum est, post satietatem, nihil agendum. Vbi expletus est aliquis, facilius concoquit, si quicquid assumpsit potione aque frigida includit, tum paulisper inuigilat, deinde bene dormit. Si quis interdum se impleuit, post cibum neq; frigori, neq; aestui, neq; labori se debet committere. Neq; enim tam facile haec inani corpore quam repleto nocent. Si quibus de causis futura inedia est, labor omnis vitandus est.

Observationes quaedam prout res nouae accidunt, & prout corporum genera, & sexus, & aetates, & tempora anni sunt.

C A P.

III.

ATq; haec quidem penè perpetua sunt. Quasdam autem observationes desiderant et nouae res, et corporum genera, et sexus, et aetates, et tempora anni. Nam neq; ex salubri loco in grauem, neq; ex graui in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in grauem prima hyeme: ex graui in eum, qui salubris est, prima aestate transire melius est. Neq; verò ex multa fame, nimia satietas; neq; ex nimia satietate, fame idonea est. Periclitaturq; et qui secul, et qui bis die cibum incontinenter, contra consuetudinem assumit. Item neq; ex nimio labore subito otium, neq; ex nimio otio subitus labor sine graui noxa est. Ergo cum quis mutare aliquid volet, paulatim debet assuescere. Omne etiā laborem facilius,

Puer,
Senex,
Homo.

facilius, vel puer, vel senex, quàm insuetus homo sustinet. Atq; ideo quoq; nimis otiosa vita utilis non est, quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit, aut multo plus quàm solet, etiam is qui assuevit, huic ieiuno dormiendū est, multo magis, si etiam os amarū est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo ieiuno est, sed etiam in posterū diem permanendum, nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est, surgere oportet, & lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modicè magis aliquis laboravit, tamen ingredi aliquid eodē modo debet. Communia deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumpturus, ubi paulum ambulauerunt, si balneum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem vngi, atq; sudare: si est, ante omnia in tepidario residere, deinde ubi paulum conquieuerunt, intrare, & descendere in solium, tum multo oleo vngi, leniterq; perfricari, iterum in solium descendere. Post hæc os aqua calida fouere, deinde frigida. Balneum his feruēs idoneum non est. Ergo si nimium alicui fatigato penè febris est, huic abunde est loco tepido dimittere se inguinibus tenus in aquam calidam, cui paulum olei adiectum sit: deinde totum quidem corpus, maxime tamen eas partes, quæ in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinū, & paulum coneriti salis sit adiectū. Post hæc, omnibus fatigatis, aptum est cibum sumere, eoq; hu-

c mida

mido uti: aqua, vel certè diluta potione esse contentos, maximeq; ea qua moueat urinam. Illud quoq; nosse oportet, quòd ex labore sudanti, frigida potio perniciosissima est, atq; etiam (cum sudor se remisit) itinere fatigatis inutilis. A balneo quoque venientibus Asclepiades inutilem eam iudicauit. Quod in his verum est, quibus aluus facile, nec tutò resoluitur, quiq; facile inhorrescunt. Perpetuum in omnibus non est, cum potius naturale sit, potione æstuantè stomachum refrigerari, frigentè calefieri. Quod ita præcipio, ut tamen fatear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc frigidū bibendū esse. Solet etiam prodesse, post varium cibum, frequentesq; dilutas potiones, vomitus, & postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio vrget, in vicè modò aqua, modò vinum bibendum est, raroq; balneo vtendum. Leuatq; lassitudinē etiam laboris mutatio, eumq; quem nouum genus eiusdem laboris pressit (id quod in consuetudine est) reficit. Fatigato quotidianum cubile tutissimum est, insolitū contrà lassat. Quod enim contra consuetudinem est, nocet, seu molle, seu durum est. Propria quedam ad eum pertinet, qui ambulando fatigatur: hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio, post iter, primum sedile, deinde vnctio, tum calida aqua in balneo magis superiores partes, quàm inferiores foueat. Si quis verò exustus in sole est, huic in balneum protinus eundum est, persundendumq; oleo corpus & caput,

put, deinde in solium bene calidum descēdendum est, tum multa aqua per caput infundenda, prius calida, deinde frigida. At ei qui perfrixit, opus est balneo primum inuoluto sedere donec insudet, tum vngi, deinde lauari, cibum modicum, deinde potiones meracas assumere. Is verò qui nauigabit, & nausea pressus est, si multam bilem euomuit, vel abstinere cibo debet, vel paulū aliquid assumere. Si pituitam acidam effudit, utiq; sumere cibum, sed assueto leuiorem: si sine vomitu nausea fuit, vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui verò toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis sedit, huic nihil currēdum, sed lentè ambulandum est. Lenta quoq; in balneo mora, dein cœna exigua prodesse consueuerunt. Si quis in balneo aëstuat, reficit hunc ore exceptum, & in eo retentum acetum. Si id non est, eodem modo frigida aqua assumpta. Ante omnia autem norit quisq; naturam sui corporis: quoniam alij graciles, alij obesi sunt, alij calidi, alij frigidiores, alij humidi, alij sicci, alios aëstricta, alios resoluta aluus exercet. Raro quisquam, non aliquam partē corporis imbecillam habet. Tenuis verò homo implere se debet, plenus extenuare: calidus refrigerare, frigidus calefacere: madens siccare, siccus madefacere; itemq; aluum firmare is, cui fusa, soluere is, cui aëstricta est. Succurrendumq; semper parti maximè laboranti est. Implet autem corpus modica exercitatio, frequētior quies, vntio, & si post prandium est balneum, contra-

Vomitibus

Et a alius, modicum frigus hyeme, somnus &
 plenus & non nimis longus, molle cubile, animi
 securitas, assumpta per cibos & potiones maxi-
 mè dulcia & pingua, cibus & frequentior, &
 quantus plenissimus potest concoqui. Extenuat
 corpus aqua calida, si quis in eam descendit, ma-
 gisq; si salsa est, in ieiunio balneum, inurens sol,
 & omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium
 vel brevis, vel longus, lectus per æstatem terra,
 hyeme durum cubile, cursus, multa ambulatio,
 omnisq; vehemēs exercitatio, vomitus, deiectio,
 acida res & austera, & semel die assumptæ
 epule, & vini non perfrigidi potio ieiunio in
 consuetudinem adducta. Cum verò inter exte-
 nuantia posuerim vomitum, & deiectionem, de
 his quoq; propria quedam dicenda sunt. Eiectum
 esse ab Asclepiade vomitum in eo volumine, quod
 de Tuenda sanitate composuit, video, neq; repre-
 hendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quo-
 tidie eijciendo vorandi facultatem moliuntur.
 Paulò etiam longius processit. Idem purgationes
 quoq; eodem volumine expulit. Et sunt hæc per-
 niciosæ, si nimis valentibus medicamentis fiunt.
 Sed hæc tamen submouenda esse non est perpe-
 tuum, quia corporum temporumq; ratio potest ea
 facere necessaria, dum et modo, & non nisi cum
 opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si
 quid iam corruptum esset, expelli debere confessus
 est. Ita non ex toto res condemnanda est. Sed esse
 eius etiam plures causæ possunt, estq; in ea que-
 dam

dam paulo subtilior observatio adhibenda. Vomitus utilis est hyeme, quam æstate. Nam tum & pituita plus, & capitis gravitas maior subest. Inutilis est gracilibus, & imbecillum stomachum habentibus. Utilis est plenis & biliosis omnibus, si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt. Nam siue plus est, quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur, non oportet. Si verò corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua via primum expelli potest, eijcere. Itaq; ubi amari ructus cum dolore & gravitate præcordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Item prodest ei, cui pectus æstuat, & frequens saliva, vel nausea est, aut cui sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est. Similiterq; ei, qui vel cælum vel locum mutat. hisq; quibus (si per plures dies non vomuerint) dolor præcordia infestat. Neq; ignoro inter hæc præcipi quietem, quæ non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus, nec in omnibus idem facit. Itaq; istud luxuriæ causa fieri non oportere confiteor. Interdum valetudinis causa rectè fieri, experimentis credo. Commoneo tamen, ne quis, qui valere, et senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tanquam tepidam antè debet assumere: si difficilius, aquæ vel salis, vel mellis paulum adycere. At qui mane vomiturus est, Prouocantè bibere mulsum, vel hyssopum, aut esse radiculam debet, deinde aquam tepidam, vt supra

scriptum est, bibere. Cetera quæ antiqui medici præceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum (si stomachus infirmus est) paulum cibi, sed huius idonei, gustandum, & aquæ frigide cyathi tres bibendi sunt. Si autem vomitus fauces exasperavit, qui vomuit (si mane id fecit) ambulare debet, tum vngi, deinde cænare. Si post cænam, postero die lauare, & in balneo sudare, hinc proximus cibus, mediocrius utilior est, isq; esse debet cum pane hesterno, vino austero, meraco, & carne assa, cibusq; omnibus quàm siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius consulat, si biduo continuerit, quàm si post quintum demum diem vomuerit, nisi hac mora gravitatem

Deiectio. pectori faciet. Deiectio autem medicamento quoq; petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoq; inflammationes, caligines, capitis dolores, aliaq; superioris partis mala increscunt. Quid enim inter hæc adiuuare possunt quies & inedia, quæ per illam maxime eueniunt? Qui eijcere volet, primum cibus, vinisq; utetur his, quæ hoc præstant. Dehinc si parum illa proficient,

Purgatio- aloem sumat. Sed Purgationes quoq; ut interdum
nes. necessarie sunt, sic ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus, & ob hoc infirmum erit, cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit. Calefacit autem vntio, aqua salsa, magisq; si calida est, omnia & salsa, amara, carnosæ, si post cibum est balneum, vinum austerrum: refrigerat in ieiunio & bal-

neum

neum & somnus, nisi nimis longus est, et omnia
 acida, aqua quàm frigidissima, oleum si aque
 misceatur. Humidum autem corpus efficit labor
 * maior, quàm ex consuetudine, frequens bal- * aliàs, mi
 neum, cibus plenior, multa potio, posthac ambu- nor
 latio, & vigilia: per se quoq; ambulatio multa,
 & vehemens, & matutina exercitatio, & non
 protinus cibus adiectus, ea genera esca quæ ve-
 niunt ex locis frigidis, & pluuijs, & irriguis.
 Contrà siccatur, * modica exercitatio, fames, vnctio * aliàs, im
 sine aqua, calor, sol * modicus, frigida aqua, cibus modica
 exercitationi statim subiectus, & is ipse ex sic- * aliàs, im
 cis & æstuosis locis veniens. Alium astringit modicus
 labor, sedile, creta figuralis corpori illita, cibus
 imminutus, & is ipse semel die assumptus ab eo,
 qui bis solet: exigua potio, neque adhibita, nisi
 cum cibi quis quantum assumpturus est, cepit:
 post cibum quies. Contra soluit, aucta ambula-
 tio atque esca, post motus qui post cibum est, sub-
 inde potiones cibo immixta. Illud quoque scire
 oportet, quòd ventrem vomitus solutum compri-
 mit, compressum soluit. Itemq; comprimit is vo-
 mitus, qui statim post cibum est: soluit is, qui
 tarde superuenit. Quod ad ætates verò pertinet,
 in ediam facillime sustinent mediæ ætates, mi-
 nus iuuenes, minime pueri, & senectute confe-
 cti. Quo minus fert facile quisq; eo sæpius debet
 cibum assumere, maximeq; eo eget, qui increscit.
 Calida lauatio, & pueris & senibus apta est.
 Vinum dilutius pueris, senibus meracius, neutri

etati quæ inflationes mouent. Iuuenum minus,
quæ assumant, & quomodo curentur, interest.
Quibus iuuenibus fluxit aluus, plerunq; in sene-
ctute cōtrahitur: quibus in adolescētia fuit astri-
cta, sæpe in senectute soluitur. Melior est autem
in iuvene fusior, in sene astrictior. Tempus quoq;
anni considerare oportet. Hyeme plus esse conue-
nit: minus, sed meracius bibere: multo pane vti,
carne potius elixa, modicè oleribus: semel die ci-
bum capere, nisi si nimis venter astrictus est. Si
prandet aliquis, vtilius est exiguum aliquid, &
ipsum siccum sine carne, sine potione sumere. Eo
tempore anni calidis omnibus potius vtendū est,
vel calorē mouentibus. Venus tum non æquè per-
niciosa est. At vere paulum cibo demēdum, adij-
ciendūq; potioni, sed dilutius tamen bibendum
est: magis carne vtendum, magis oleribus: trans-
eundū paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tem-
pore anni tutissima est. Aestate verò & potione
& cibo corpus sæpius eget. Ideo prandere quoq;
commodum est. Eo tempore aptissima sunt &
caro, & olus, potio quàm dilutissima, vt & si-
tim tollat, nec corpus incendat, frigida lauatio,
caro assa, frigidi cibi, vel qui refrigerent. Vt sæ-
pius autē cibo vtendum, sic exiguus est. Per au-
tumnū propter cæli varietatē periculum ma-
ximum est. Itaq; neq; sine veste, neq; sine calcea-
mentis prodire oportet, præcipueq; diebus frigi-
dioribus: neq; sub diuo nocte dormire, aut certe
bene operiri. Cibo verò iam paulo pleniore vti
licet:

licet : minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quæ immodicè toto die plerunq; sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur. Ita non hæc, sed consummatio omniū nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quàm in his noxæ est. Sed his vti non sæpius, quàm alio cibo conuenit. Deniq; aliquid densiori cibo, cùm id accedit, necessarium est demi. Neque æstate verò, neque autumnò utilis vniuersus est. Tolerabilior tamen per autumnum : æstate verò in totum, si fieri potest, abstinendum.

De his qui aliqua parte corporis laborant,
& primum de his quibus caput infirmum est.

C A P. IIII.

Proximum est, vt de his dicam, qui partes aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infirmum est, is (si bene concoxerit) leniter perfricare id manè manibus suis debet: nunquam id (si fieri potest) veste velare, aut ad cutem tondere: vtileq; lunam vitare, maximeq; ante ipsum lunæ, solisq; concursus: sed nusquam post cibum progredi. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere, multum ambulare: sed (si licet) sub tecto, neq; in sole. Vbiq; autem vitare solis ardorem, maximeq; post cibum & vinum: potius vngi quàm lauari, nunquam ad flammam vngi, interdum ad prunam. Si in balneum venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi vngi, tum transire in calidarium: vbi sudabit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per

c s caput

Aqua frigida capiti prodest.

caput se totum perfundere : tum tepida uti, deinde frigida, diutiusq; ea caput, quam ceteras partes perfundere : deinde id aliquandiu perfricare : nouissimè detergere & ungere. Capiti nihil aquè prodest, atq; aqua frigida : itaq; is, cui hoc infirmum est, per æstatem id bene largo canali quotidie debet aliquandiu subijcere. Semper autem, etiam si sine balneo unctus est, neque totum corpus refrigerare sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cum ceteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad ceruices aqua descendat, eamq; ne quid oculis, alijs'ue partibus noceat, defluentem subinde manibus ad os regerere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat : isq; , si ieiunio caput leditur, assumendus etiam medio die est : si non leditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutū, leue, quam aquam magis expedit : ut cum caput grauius esse cæperit, sit quò cōfugiat : eiq; ex toto neq; vinū, neq; aqua semper utilia sunt : medicamentū vtrunq; est, cum inuicem assumitur. Scribere, legere, voce contendere, huic opus non est, utiq; post cænā, postquam nec cogitatio quidē ei satis tuta est, maximè tamē vomitus alienus est.

De his qui lippitudine, grauedine, destillatione, tonsillisq; laborant. C A P. V.

NEque verò his solis, quos capitis imbecillitas torquet, usus aquæ frigidae prodest : sed ijs etiam, quos assidue lippitudines, grauedines, destillationes, tonsillæq; malè habent. His autem

autem non caput tantum quotidie perfunden-
dum est, sed os quoque multa frigida aqua fouen-
dum est: præcipueq; omnibus, quibus hoc utile
auxilium est, eo utendum est, ubi grauius cæli
Austri reddiderunt. Cumq; omnibus inutilis sit,
post cibum aut contentio, aut cogitatio animi:
tñ his præcipue, qui vel capitis, vel arteriæ do-
lores habere consueuerunt, vel quoslibet alios
oris affectus. Vitari etiã grauedines, destillatio-
nesq; possunt, si quàm minime eï (qui his oppor-
tunus est) aërem vel loca, aquasq; mutet, si ca-
put in se protegit, ne incendatur, ne'ue subitum
ex repentino nubilo frigus id moueat, si post con-
coctionem ieiunus caput radit, si post cibum ne-
que legit, neq; scribit.

Ad solutam alui remedia. CAP. VI.

Quem verò frequenter citata aluius exercet,
huic opus est pila, similibusq; superiores
partes exercere, dum ieiunus est ambulare, vi-
tare solis nimium ardorē, continua balnea, vngi
citra sudorem, non vti cibis varijs, minimeq; in-
rulentis, aut leguminibus, oleribus'ue his, quæ ce-
lenter descendunt, omnia denique fugere quæ
tarde concoquuntur. Venatio, duriq; pisces, et ex
domesticis animalibus assa caro maximè iu-
uant. Nunquam vinum salsum bibere expedit, Plin. lib.
ne tenue quidem, aut dulce, sed austerum, & ple 14. cap. 3.
nius, neq; id ipsum peruetus. Si mulso vti volet, Tenue,
id ex decocto melle faciendū est. Si frigida potio- Dulce,
nes ventrem eius non turbant, his utendum po- Austerū,
tissimum Plinius.

tissimum est. Si quid offense in cœna sensit, vomere debet, idq; postero quoq; die facere, tertio modici ponderis panē ex vino esse, adiecta rrua vel olea, vel ex defruto, similibusq; alijs, deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conquiescere, ac neq; intendere animum, neq; ambulatione, quamuis leui, dimoueri.

Remedia ad coli dolorem. C A P. VII.

ET si laxius intestinū dolere cōsuevit (quod *κῶλον* nominant) cum id nihil nisi genus inflationis sit, id agendum est, vt concoquat aliquis, vt lectione, & alijs generibus exerceatur: vtatur balneo calido, cibis quoq; & potionibus calidis: deniq; omnimodo frigus euitet, item dulcia omnia, leguminaq; , & quicquid inflare consuevit.

Quæ agenda sint stomacho laborantibus.

C A P. VIII.

SI quis verò stomacho laborat, legere clarè debet: post lectionē ambulare: tum pila, vel armis, alio'ue quo genere, quo superior pars mouetur, exerceri: non aquam, sed vinum calidum bibere ieiunus: tum cibum bis die assumere, sic tamen vt facile concoquat: vti vino tenui, & austero, & post cibum frigidis potionibus potius. Stomachū autem infirmum indicant, pallor, macies, præcordiorum dolor, nausea, & nolentium vomitus, in ieiuno dolor capitis. Quæ in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neq; credendum utiq; nostris est, qui cum in aduersa valetudine vinum

num aut frigidam aquam concupierunt, deliciarum patrociniū in accusationem, non merentis stomachi habent. At qui tardè concoquunt, & quorum ideo præcordia inflātur, qui'ue propter ardorem aliquem noctu sitire consueverunt, antè quàm conquiescant, duos, tres'ue cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam aduersus tardam concoctionem clarè legere, deinde ambulare, tum vel vngi, vel lauari assidue, vinum frigidum bibere, & post cibum magnam potionem, sed (vt suprà dixi) per siphonem, deinde omnes potiones aqua frigida intercludere. Cui verò cibus acescit, is ante eum bibere aquam egellidam debet, & vomere. At is cui ex hoc frequens deiectio incidit, quoties alius ei constiterit, frigida potione potissimum vtatur.

Quid obseruandum sit dolore neruorum laborantibus.

CAP. IX.

SI cui verò dolere nerui solent (quod in podagra, chiragra'ue esse consuevit) huic quantum fieri potest, exercendum id est, quod affectum est, obijciendumq; labori & frigori, nisi cum dolor increuit. Sub dio quies optima est. Venus semper inimica est. Cōcoctio (sicut in omnibus corporis affectibus) necessaria est. Cruditas enim id maxime ledit, & quoties offensum corpus est, vitiosa pars maxime sentit. Vt concoctio autem omnibus vitijs occurrit, sic rursus alijs frigus, alijs calor. Quæ sequi quisq; pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum est seni, tenui, vulneri,

vulncri, præcordijs, intestinis, vesicæ, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, vulvæ, cerebro. Idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram. Ex hoc horrores, tremoresq; nascuntur. At prodest iuuenibus, & omnibus plenis, erectiorq; mens est, & melius concoquitur, vbi frigus quidem est, sed cauetur. Aqua verò frigida infusa, præterquam capiti, etiam stomacho prodest. Item articulis, doloribusq; qui sunt sine vlcere. Item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant. Calor autem adiuvat omnia quæ frigus infestat. Item lippientes si nec dolor, nec lacrymæ sunt. Nervos quoque qui contrahuntur, præcipueq; ea vlcera, quæ ex frigore sunt. Idem corporis colorem bonum facit, urinam movet. Si nimius est, corpus effæminat, nervos emollit, stomachum solvit. Minimè verò aut frigus, aut calor tuta sunt, vbi subita insuetis sunt. Nam frigus lateris dolores, aliaq; vitia: frigida aqua strumas excitat. Calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudorem digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.


Observatio in pestilentia.

C A P. X.

Est etiam observatio necessaria, qua quis in pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare. Vbi id non licet, gestari, ambulare sub diuo, ante æstum leniter, eodemq; modo vngi, & ut supra cōprehensum est, vitare
fatig

fatigationem, crudelitatem, frigus, calorem, libidinem, multoq; magis se continere, si qua grauitas in corpore est: tum neq; mane surgendum, neq; pedibus nudis ambulandum est, minimeq; post cibum, aut balneum, neq; ieiuno, neq; cœnato vomendum est. Neque mouenda alius, atque etiam si per se mota est, comprimenda est. Abstinentum potius, si plenius corpus est. Itemq; vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, vtique si cibus quoque antecessit, qui tamen semel die tunc commodius assumitur: insuper etiā modicus, ne crudelitatem moueat. Alternis diebus inuicem modò aqua, modò vinum bibendum est. Quibus seruatis, ex reliqua victus consuetudine, quàm minimū mutari debet. Cum verò hæc in omni pestilētia facienda sint, tum in ea maxime, quàm austru excitant. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, vbi graui tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel vbi in graues regiones venerunt. Ac si cætera res aliqua prohibebit, vtique abstinere debet. Atq; ita ab vino ad aquam, ab hac ad vinum eo, qui suprapositus est, modo transitus ei esse.

LIBER II.



INSTANTIS autē aduersæ valetudinis signa complura sunt. In quibus explicandis nō dubitabo auctoritate antiquorum virorum vtī, maximeq; Hippocratis: cum recentiores quoque Medici

Medici, quāvis quaedam in curationibus mutarint, tamen haec illum optimè praesagisse fateantur. Sed antequā dico, quibus praecedētibz morborum timor subsit, non alienū videtur exponere, quae tempora anni, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora maximè tuta, vel periculis opportuna sint, quod genus aduersae valetudinis in quoq; timeri maximè possit. Non quò non omni tempore, in omni tempestatum genere, omnis aetatis, omnis habitus hominū per omnia genera morborum & egrotent, & moriantur: sed quòd frequentius tamen quaedam eueniant. Ideoq; vtile est scire vnumquemque, quid, & quando maxime caueat.

Quae anni tempora, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora vel tuta, vel morbis opportuna sint: & quod valetudinis genus in quoque timeri possit. CAP. I.

Igitur saluberrimum ver est, proxima deinde ab hoc hyems, periculosior aestas, autumnus longe periculosissimus. Ex tempestatibus verò optimae aequales sunt, siue frigidae, siue calidae: pessimae, quae variant maxime. Quò fit, vt Autumnus plurimos opprimat. Nam ferè meridianis temporibus calor, nocturnis atq; matutinis simulq; etiam vespertinis frigus est. Corpus ergo & aestate, & subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed vt eo tempore id maxime fit, sic quādocunq; euenit, noxiū est. Vbi aequalitas autem est, tamen saluberrimi sunt

sunt sereni dies, meliores pluuij, quàm tantum
 nebulosi, aut nubili, optimiq; hyeme qui omni
 vento vacant: æstare quibus Fauonij perflant.
 Si genus aliud ventorij est, salubriores Septen-
 trionales, quàm Subsolani, vel Austri sunt. Sic
 tamen, vt hæc interdum regionum sorte muten-
 tentur. Nam ferè ventus vbiq; à mediterraneis
 regionibus veniens salubris, à mari grauis est.
 Neq; solum in bono tempestatum habitu certior
 valetudo est, sed priores morbi quoq; (si qui inci-
 derunt) leuiiores sunt, & promptius finiuntur.
 Pessimũ ergo cælum est, quod ægrum fecit, adeo
 vt in id quoq; genus, quod natura peius est in
 hoc statu, salubris mutatio sit. Aetas media tu-
 tissima est, quæ neq; iuuenta calore, neq; senectū-
 tis frigore infestatur. Longis morbis senectus,
 acutis adolescentia magis patet. Corpus autẽ ha-
 bilissimum quadratum est, neq; gracile, neq; ob-
 esum. Nam longa statura, vt in iuuenta decora
 est, sic matura senectute conficitur. Gracile cor-
 pus, infirmũ: obesum, hebes est. Vere tamẽ maxi-
 mẽ quæcunq; humoris motu nouantur, in metu
 esse consuerunt. Ergo tum lippitudines, pustule,
 profusio sanguinis, abscessus corporis, quæ ἀπο-
 σκίματα Græci nomināt, bilis atra, quæ μελαγ-
 χολία appellāt, insania, morbus comitialis, an-
 gina, grauedines, destillationes oriri solent. Hi
 quoq; morbi qui in articulis, neruisq; modo vr-
 gent, modo quiescunt, tum maximè & inchoan-
 tur & repetunt. At æstas non quidẽ vacat ple-
 d risq;

Pluuii,
 Nebulosi,
 Nubili.

Corp⁹ qua-
 dratum.

risq; ab his morbis, sed adiicit febres, vel continuas, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alui deiectiones, auriculari dolores, ulcera oris, can-
 cros, & in ceteris quidē partibus, sed maxime obscenis, & quicquid sudore hominem resoluit.
 Vix quicquā ex his in autumnum non incidit:
 Febres in- sed oriuntur eo quoq; tēpore febres incertae, lienis
 certae. dolor, aqua inter cutem, tabes, quā Græci φθίσις
 nominant: vrinae difficultas, quam σπαστικήα
 appellant: tenuioris intestini morbus, quē ἐλεος
 nominant. Fit item lenitas intestinorum, quae
 ἀνετηγία vocatur, coxae dolores, morbi comi-
 tiales. Idemq; tempus & diutinis malis fatiga-
 tos, & ab aestate tantum proxima oppressos in-
 terimit, & alijs nouis morbis conficit, & quos-
 dam longissimis implicat, maximeq; quartanis,
 quae per hyemem quoque exerceant. Neq; aliud
 magis tēpus pestilentiae patet, cuiuscunq; ea gene-
 ris est, quāuis varijs rationibus nocet. Hyems au-
 tem capitis dolores, tussim, & quicquid in fau-
 cibus, in lateribus, in visceribus mali contrahi-
 tur, irritat. Ex tēpestatibus Aquilo tussim mo-
 uet, fauces exasperat, ventrē astringit, vrinam
 Aquilo. suppressit, horrores excitat, item dolores lateris
 & pectoris. Sanū tamen corpus spissat, & mobi-
 lius, atq; expeditius reddit. Auster aures hebe-
 tat, sensus tardat, capitis dolores mouet, aluum
 Auster. soluit, totū corpus efficit hebes, humidū, langui-
 dum. Ceteri venti quō vel huic vel illi propiores
 sunt, eo magis vicinos his illis'ue affectus faciunt.
 Deniq;

Deniq; omnis calor & iecur, & lienem inflam-
 mat: mentem hebetat: ut anima deficiat, ut san-
 guis prorumpat, efficit. Frigus modo nervorum
 distentionē, modo rigorem infert, illud *σπασμὸς*,
 hoc *τέτανος* & Græcè nominatur: nigriciem in
 ulceribus, horrore in febribus excitat. In sicca-
 tibus acutæ febres, lippitudines, tormina, urinae
 difficultas, articulorum dolores oriuntur. Per hym-
 bres longæ febres, alui deiectiones, angina, can-
 cri, morbi comitiales, resolutio nervorum, quam
παράλυσις Græci nominant. Neq; solum inter-
 est, quales dies sint, sed etiam quales antè præ-
 cesserint. Si hyems sicca Septentrionales ventos
 habuit, ver autem Austros & pluias exhibet,
 ferè subeunt lippitudines, tormina, febres, maxi-
 meq; in mollioribus corporibus, ideoq; præcipuè
 in mulieribus. Si verò Austri, pluiæq; hyemē
 occuparunt, ver autē frigidum et siccum est, gra-
 uida quidem scēminæ, quibus dum adest partus,
 abortu periclitatur. Hæ verò quæ gignunt, imbe-
 cillosq; , vixq; vitales edunt. Ceteros lippitudo
 arida, & si seniores sunt, grauedines, atq; destil-
 lationes malè habet. At si à prima hyeme Au-
 stri ad vltimū ver continuarunt, laterū dolores,
 & insania febricitantiū, quæ *φρενίτις* apellant,
 quàm celerrime rapiunt. Vbi primò calor à pri-
 mo vere orsus, æstatē quoq; similē exhibet, ne-
 cesse est multū sudorē in febribus subsequi. At si
 sicca estas Aquilones habuit, autūno verò hym-
 bres, Austriq; sunt, tota hyeme quæ proxima
 d 2 est

est tuſſis, deſtillatio, rautitas, in quibusdā etiam
 tabes, oriūtur. Sin autem autumnus quoq; aequē
 ſiccus, iſdem Aquilonibus perflatur, omnibus
 quidē mollioribus corporibus, inter quæ mulie-
 bria eſſe propoſui, ſecunda valetudo contingit.
 Durioribus verò inſtare poſſunt & aride lip-
 pitudines, et febres partim acute, partim longæ,
 & hi morbi, qui ex atra bile naſcuntur. Quod
 ad atates verò pertinet, pueri, proximiq; hiſ, ve-
 re optime valēt, & æſtate prima tutiſſimi ſunt:
 Senes æſtate, & autumnī prima parte: iuvenes
 hyeme, quiq; inter iuventam ſenectutemq; ſunt.
 Inimicior ſenibus hyems, æſtas adoleſcentibus
 eſt. Tum ſi qua imbecillitas oritur, proximū eſt,
 ut infantes, teneroſq; adhuc pueros ſerpentia
 vlcera oriſ (quæ ἀφθας Græci nominant) vom-
 itus, nocturnæ vigiliæ, aurium humor, circa umbi-
 licum inſtāmationes exerceant. Propriè etiā den-
 tientium gingivarum exulcerationes, diſtentiones
 nervorum, febricula interdum, alui deiectiones
 *maxil-
 læq; nes, *maximeq; caninis dentibus orientibus ma-
 le habent. Quæ pericula pleniſſimi cuiuſq; ſunt,
 & cui maxime venter adſtriſtus eſt. At ubi
 ætas paulum proceſſit, glandule, & vertebrarū
 quæ in ſpina ſunt, aliquæ inclinationes: ſtruma,
 verrucarum quedam genera dolentia (ἀγκυρό-
 σσας Græci appellant) & plura alia tubercu-
 la oriuntur. Incipiente verò iam pube, ex iſdem
 multe & longæ febres, ſanguinis ex naribus
 curſus. Maximeq; omnis pueritia primum circa
 quadrag

quadragesimum diem, deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem inciderunt, ac neq; pubertate, neque primis coitibus, neq; in foemina primis menstruis finita sunt, fere longa sunt. Sapius tamen morbi pueriles, qui diutius manserunt, terminantur. Adolescentia morbis acutis, item comitialibus, tabiq; maxime obiecta est, fereq; iuvenes sunt, qui sanguinem expuunt. Post hanc aetatem laterum & pulmonis dolores, lethargus, cholera, insania, sanguinis per quaedam etiam velut ora venarum (αἰμορροΐδας Graeci appellant) profusio. In senectute spiritus & urinae difficultas, grauedo articulorum, & renum dolores, nervorum resolutiones, malus corporis habitus (ναρξία Graeci appellant) nocturnae vigiliae, vitia longiora aurium, oculorum, etiam narium, praecipueq; soluta aluus, & quae sequuntur hanc tormina, vel leuitas intestinorum, ceteraq; fusi ventris mala. Praeter haec graciles, tabes, deiectiones, destillationes. Item viscerum & laterum dolores fatigant. Obesi plerunq; acutis morbis, & difficultate spirandi strangulantur, subitoq; saepe moriuntur. Quod in corpore tenuiore vix euenit.

De *signis aduersae valetudinis futurae.

*notis.

C A P. II.

ANte aduersam autem valetudinem (vt supra dixi) quaedam notae oriuntur, quarum omnium commune est, aliter se corpus habere, atq;

d 3

consue

consuevit, neq; in peius tantū, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, et speciosior, & coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet. Quæ quia neq; in eodem habitu subsistere, neq; ultra progredi possunt, ferè retro, quasi ruina quadam, reuoluuntur. Peius tamen signum est, ubi aliquis contra consuetudinem emacruit, & colorem decorēq; amisit, quoniam in his quæ superant, est quod morbus demat: in his quæ desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Præter hæc protinus timeri debet, si grauiora membra sunt, si crebra vlcera oriuntur, si corpus supra cōsuetudinem incaluit, si grauior somnus pressit, si tumultuosa somnia fuerunt, si sæpius expergiscitur aliquis, quàm assuevit, deinde iterum soporatur, si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinem insudat, maximeq; circa pectus, aut ceruices, aut crura, vel genua, vel coxas. Item si marcet animus, si loqui & moueri piget, si corpus torpet, si dolor præcordiorum est, * alias, aut totius pectoris, * aut, qui in plurimis euenit, aut in pluribus capitibus: si salivæ plenum est os, si oculi cum doloribus vere vertuntur, si tempora astricta sunt, si membra capitis inhorrescunt, si spiritus grauior est, si circa frontem intentæ venæ mouentur, si frequentes oscitationes, si genua quasi fatigata sunt, totum' ve corpus lassitudinē sentit. Ex quibus sæpe plura, nunquam nō aliqua, febrem antecedunt. In primis tamen illud considerandum est, nunquid sæpius horum aliquid eueniat, ac ideo neque corporis

poris vlla difficultas subsequatur. Sunt enim quedam proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quicquam in futurum præ- sagiri potest. Facile itaq; securus est in his aliquis, quæ sæpe sine periculo euasit. Ille sollicitari debet, cui hæc noua sunt, aut qui ista nunquam sine custodia sui tuta habuit.

Quæ bona in ægrotantibus signa sint.

C A P. III.

VBi verò febris aliquem occupat, scire licet non periclitari, si in latus aut dextrum, aut sinistrum, vt ipsi visum est, cubat, cruribus paulum reductis: qui ferè sani quoq; iacentis habitus est: si facile conuertitur, si noctu dormit, si interdiu vigilat, si ex facili spirat, si non conflatur, si circa vmbilicum & pubem cutis plana est: si p̄cordia eius sine vlllo sensu doloris æqualiter mollia in vtraque parte sunt: quòd si paulò tumidiora sunt, sed tamē digitis cedunt, & non dolent, hæc valetudo, vt spatium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoque quod æqualiter molle & calidū est, quodq; æqualiter totum insudat, & cuius febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur, quando iam ad sanitatē venit corpus. Sternutamentū etiam inter bona indicia est: et cupiditas cibi, vel à primo seruata, vel etiam post fastidium orta. Neq; terrere debet ea febris, quæ eodē die finita est: ac ne ea quidem, quæ quamuis longiore tempore euauit, tamen ante alteram accessionem ex toto quieuit,

d 4 sic vt

sic ut corpus integrum quod εἰληγὴς Græci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet, & in urina subsidere album, leue, equale, sic ut etiam si quæ quasi nubecula innatarint, in imum deferantur. At venter ei qui à periculo tutus est, reddit modò mollia, figurata eodem ferè tempore, quo secunda valetudine: assuevit modò cōuenientia his quæ assumuntur. Peior cita aluius est. Sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, et ruffa est, neq; sœditate odoris similem aluum sani hominis excedit. Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine morbi descendisse, nihil nocet. Si inflammatio in superioribus partibus dolorem tumoremq; fecit, bonum signum est. Sonus ventris inde ad inferiores partes euolutus, magisq; etiam si sine difficultate cum stercore excessit.

Mala signa ægrotantium. CAP. II II.

Contra grauis morbi periculum est, ubi supinus æger iacet, porrectis manibus & cruribus, ubi residere vult, in ipso acuti morbi impetu, præcipueq; pulmonibus laborantibus. Vbi nocturna vigilia premitur, etiam si interdiu somnus accedit. Ex quo tamen peior est, qui inter quartam horam & noctem, quàm qui matutino tempore ad quartam. Pessimum tamen est, si somnus neq; noctu, neq; interdiu accedit: id enim ferè sine continuo dolore esse non potest.

Aequè

Aequè verò signū malum est, etiam somno ultra debitum vrgeri, peiusq; quo magis se sopor interdiu, noctuq; continuat. Mali etiam morbi testimonium est, vehementer & crebro spirare, à sexto die cœpisse inhorrescere, pus expuere, vix excreare, dolorem habere continuum, difficulter ferre morbum, iactare brachia & crura, sine voluntate lacrymare, habere humorem glutinosum dentibus inhaerentem, cutem circa umbilicum & pubem macram, præcordia inflammata, dolentia, dura, tumida, intenta: magisq; si hæc dextra parte, quàm sinistra sunt: periculosissimum tamen est, si venæ quoq; ibi vehementer agitantur. Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter emacrescere, caput, & pedes, manusq; calidas habere, ventre & lateribus frigidibus, aut frigidas extremas partes acuto morbo urgente, aut post sudorem inhorrescere, aut post vomitum singultum esse, vel rubere oculos, aut post cupiditatem cibi, post'ue longas febres hunc fastidire, aut multum sudare, maximeq; frigido sudore: aut habere sudores non per totum corpus æquales, quiq; febrem non finiant, & eas febres quæ quotidie tempore eodem reuertantur, quæ'ue semper pares accessiones habeant, neq; tertio quoq; die leuentur, quæ'ue cōtinuent,* vel per accessiones increscant, per dis-
cessiones tantum molliantur, nec vnquam integrum corpus dimittant. Pessimum est, si ne leuatur quidem febris, sed aequè concitata conti-
d s nuat.

nuat. Periculosum est etiā post arquatum mor-
bum febrē oriri, utiq; si præcordia dextra parte
dura manserunt, ac dolentibus his læua. Nulla
acuta febris leuiter terrere eos debet: neq; unquā
in acuta febre, ut à somno, non est terribilis ner-
uorum distentio. Timere etiam ex somno, mali
morbi est. Itemq; in prima febre protinus men-
tem esse turbatam, membrum' ve aliquod esse re-
solutum. Ex quo casu quāuis vita redditur, ta-
men id ferè membrū debilitatur. Vomitus etiam
periculosus est syncere pituitæ, vel bilis, peiorq;
si viridis, aut niger est. At mala vrina est, in
qua subsidunt subrubra, aut liuida: deterior, in
qua quasi fila quædam tenuia, atq; alba: pessima
ex his, si tanquam ex fursuribus factas nube-
culas representat: diluta quoq; atq; alba vitiosa
est, sed in phreneticis maxime. Alius autē mala
est ex toto suppressa. Periculosa etiā quæ inter
febres fluens, conquiescere hominem in cubili
non patitur: utiq; si quod descendit est perliqui-
dum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans.
Præter hæc periculum ostendit id quod excerni-
tur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idēq;
subpallidum, vel si est aut liuidum, aut biliosum,
aut cruentum, aut peioris odoris, quàm ex con-
suetudine. Malum est etiam, quod post longas
febres syncerum est.

De signis longæ valetudinis. CAP. V.

Post hæc indicia, notū est longum morbum
fieri. Sic enim necesse est, nisi occidit. Neq;
vlla

Nulla alia spes in malis magnis est, quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturque in id tempus, quod curationi locum praestet. Protinus tamen signa quaedam sunt, ex quibus colligere possumus morbum, & si non interemerit, longius tamen tempus habiturum. Vbi frigidus sudor inter febres non acutus circa caput tantum, et cervices oritur: aut vbi febre non quiescente corpus insudat: aut vbi corpus modò frigidum, modò calidum est, & color alius ex alio fit: aut vbi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatem non pervenit: aut vbi eger pro spatio parum emacrescit. Item si vrina modò liquida & pura est, modò habet quaedam subsidientia, si leuia, atque alba, rubra ve sunt, quae in ea subsident, aut si quasdam quasi maculas representat, aut si bullulas excitat.

Vrina.

De indicijs mortis.

CAP. VI.

Sed inter hac quidē proposito metu spes tamen superest. Ad vltima verò iam ventum esse testantur, nares acutae, collapsa tempora, oculi concavi, frigida languidaque aures, & imis partibus leniter versa, cutis circa frontem dura et intenta, color aut niger, aut perpallidus, multoque magis si ita haec sunt, ut neque vigilia praecesserit, neque ventris resolutio, neque inedia. Ex quibus causis interdum hac species oritur, sed vno die finitur. Itaque diutius durans mortis index est. Si verò in morbo vetere iam triduo talis est, in propinquo mors est: magisque si praeter haec

Habes de his indicijs Hippocratem ipsum in primo Prognosticon, unde haec autor desumpsit, ut aliamul ta in hoc secundo libro.

hæc oculi quoq; lumē refugiunt, & illacrymant,
 quæq; in ijs alba esse debent, rubescunt, atq; in
 hisdem venulæ pallent, pituitaq; in ijs immatans
 nouissimè angulis inhærescit, alterq; ex his mi-
 nor est, hiq; aut vehementer subsederunt, aut fa-
 cti tumidiores sunt: perq; somnum palpebræ non
 committuntur, sed inter has ex albo oculorum
 aliquid apparet: neq; id fluens aluus expressit:
 eademq; palpebræ pallent, & idem pallor labra
 & nares decolorat. Eademq; labra & nares
 oculiq; & palpebræ & supercilia, aliqua've
 ex his peruertuntur, isq; propter imbecillitatem
 iam non audit, aut non videt: eadem mors de-
 nuntiatur, vbi æger supinus cubat, eiq; genua
 contracta sunt. Vbi deorsum ad pedes subinde
 delabitur. Vbi brachia & crura nudat, & in-
 æquabiliter dispergit, neq; his calor subest. Vbi
 hiat, vbi assidue dormit: vbi is qui mentis suæ
 non est, neq; id facere sanus solet, dentibus stri-
 det. Vbi vlcus quod aut antè, aut in ipso mor-
 bo natum est, aridum, & aut pallidum, aut li-
 uidum factum est. Illa quoq; mortis indicia sunt,
 ungues, digitiq; pallidi, frigidus spiritus, aut si
 manibus quis in febre & acuto morbo vel in-
 sania, pulmonis've dolore, vel capitis, in veste
 floccos legit, fimbrias've diducit, vel in adiun-
 cto pariete, si qua minuta eminent, carpit. Do-
 lores etiam circa coxas & inferiores partes or-
 ti, si ad viscera transierunt, subitoq; desierunt,
 mortem subesse testantur, magisq;, si alia quoq;
 signa

signa accesserunt. Neq; is seruari potest, qui si-
 ne* vllotremore febricitans, subito strangulatur, * alij, tu-
 aut deuorare saliuam suam non potest. Cui' ve in more. alij,
 eodem febris corporisq; habitu ceruix conuerti- timore
 tur, sic vt deuorare aequè nihil possit. Aut cui si-
 mul & continua febris, & vltima corporis in-
 firmitas est; aut cui febre non quiescente, exte-
 rior pars friget, interior sic calet, vt etiam sitim
 faciat: aut qui febre aequè non quiescente simul
 & delirio, et spirandi difficultate vexatur: aut
 qui epoto veratro exceptus distentione neruo-
 rum est: aut qui ebrius obmutuit. Is enim febre,
 adiecta neruorum distentione consumitur, nisi
 aut febris* accessit, aut eo tempore, quo ebrietas * abscessit
 solui debet, loqui coepit. Mulier quoq; grauida,
 acuto morbo facile consumitur: & is cui somnus
 dolorem auget, & cui protinus in recenti mor-
 bo bilis atravel infra, vel supra se ostēdit, cui' ve
 alterutrum modò se prompsit, cū iam longo mor-
 bo corpus eius esset extenuatum & affectum.
 sputum etiam biliosum & purulentum, siue se-
 paratim ista, siue mixta proueniunt, interitus
 periculum ostendunt. Ac si circa septimum diem
 tale esse coepit, proximum est, vt is circa quar-
 tumdecimum diem decedat, nisi alia signa me-
 liora, peiora' ve accesserint: quæ quo leuiores,
 grauiora' ve subsecuta sunt, eò vel seriores mor-
 tem, vel maturiorem denuntiant. Sudor quoq;
 frigidus in acuta febre pestiferus est, atq; in o-
 mni morbo vomitus, qui varius, & multorum
 colorum

colorum est, præcipueq; si malus in hoc odor est.

* In magna cruditate, subaudiendum est morbi. Sic in Prognosis Hippocratis lib. 2. Vrina quoad ruffa tenuisq; apparuerit, crudum morbum significat.

Ac sanguinem quoq; in febre vomuisse, pestiferum est. Urina verò rubra, & tenuis in magna cruditate esse consuevit, & sæpe antequam spatium mature scat, hominem rapit. Itaq; sitalis diutius permanet, periculum mortis ostendit. Pestisima tamē est, præcipueq; mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Atq; in viris quidem & mulieribus talis deterrima est. In pueris verò quæ tenuis & diluta est. Aluus quoq; varia pestifera est, quæ strigmentū, sanguinem, bilem viridem, aliquid modò diuersis temporibus, modò simul, & in mistura quadam, discreta tamen repræsentat. Sed hæc quidem potest paulo diutius trahere. In præcipiti verò iam esse denunciat quæ liquida, eademq; vel nigra, vel pallida, vel pinguis est, utiq; si magna fæditas odoris accessit. Illud interrogari me posse ab aliquo scio: Si certa future mortis indicia sunt, quomodo interdum deserti à medicis conualescant, quosdamq; fama prodiderit in ipsis funeribus reuixisse? quinetiā vir iure magni nominis Democritus, ne finita quidem vitæ satis certas notas esse proposuit, quibus medici credidissent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa future mortis essent. Aduersus quos ne illud quidem dicam, quòd in vicino sæpe quadam notæ posita, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt. quod Asclepiades funeri obuius intellexit, eum viuere, qui efferebatur, ne protinus crimen artis esset, si quod professoris

fessoris sit. Illa tamē moderatius subiiciam: Con-
iecturalem artem esse medicinam, rationemq; Medicinæ
certitudo.
coniecturæ talem esse, ut cum sæpius aliquando
responderit, interdum tamen fallat nos. Si quid
itaq; vix in millesimo corpore aliquando deci-
pit, id notam non habet, cum per innumerabiles
homines respondeat. Idq; non in his tantum, quæ
pestifera sunt, dico: sed in his quoq; quæ saluta-
ria. Siquidem etiam spes interdum frustratur,
& moritur aliquis, de quo medicus securus pri-
mò fuit. Quæq; medendi causæ reperta sunt, non-
nunquam in peius aliquid conuertunt. Neq; id
evitare humana imbecillitas in tanta varietate
corporum potest. Sed est tamen medicinæ fides,
quæ multo sæpius, perq; multo plures egros pro-
dest. Neq; tamē ignorare oportet, in acutis mor-
bis fallaces magis notas esse, et salutis et mortis.

De notis, quas aliquis in singulis morborum
generibus habere possit. CAP. VII.

SEd cum proposuerim signa quæ in omni ad-
uersa valetudine communia esse consueue-
runt, ea quoq; transibo, ut quas aliquis in singu-
lis morborum generibus habere possit notas,
indicem. Quædam autem sunt, quæ ante febres,
quædam quæ inter eas, quid aut intus sit, aut
venturum sit, ostendunt. Ante febres, si caput
graue est, aut ex somno oculi caligant, aut fre-
quentia sternutamenta sunt, circa caput aliquis
pituitæ ipetus timeri potest. Si sanguis aut calor
abundat,

abundat, proximum est, ut aliqua parte proflu-
uium sanguinis fiat. Si sine causa quis emacre-
scit, ne in malum habitum corpus eius recidat,
metus est. Si præcordia dolent, aut inflammatio
gravis est, aut non toto die concocta fertur vri-
na, cruditatem esse manifestum est. Quibus diu
color sine morbo regio malus est, hi vel capitis
doloribus conflictantur, vel terram edunt. Qui
diu habent faciem pallidam, & tumidam, aut
capite, aut visceribus, aut aluo laborant. Si in
continua febre puero venter nihil reddit, muta-
turq; ei color, nec somnus accedit, ploratq; is as-
sidue, metuenda neruorum distentio est. Frequens
autem destillatio in corpore tenui longoq; tabem
timendam esse testatur. Vbi pluribus diebus non
descendit aluus, docet aut subitam deiectionem,
aut febriculam instare. Vbi pedes turgent, longæ
deiectiones sunt. Vbi dolor in imo ventre & in
coxis est, aqua inter cutem instat. Sed hoc morbi
genus ab ilibus oriri solet. Idem propositum pe-
riculum est his, quibus voluntas desidendi est,
venter nihil reddit, nisi & agrè & durum, tu-
mor in pedibus est, idemq; modò dextra, modo
sinistra parte ventris inuicem oritur atq; finitur:
sed à iocinere id malū proficisci videtur. Eiusdē
morbi nota est, vbi circa umbilicum intestina
torquentur (ἰσχόρυξ Græci nominant) coxæq; do-
lores manent, eaq; neq; tempore, neq; remedijs
soluuntur. Dolor autem articularū, prout in pe-
dibus, manibus'ue, aut alia qualibet parte sic
est,

est, ut eo loco nervi contrahantur, aut si id membrum ex levi causa fatigatum aequè frigido calidoq; offenditur, $\pi\epsilon\delta\alpha\gamma\gamma\alpha\upsilon\chi\epsilon\rho\alpha\gamma\gamma\alpha\upsilon$ ve, vel eius articuli in quo id sentitur, mori in futurum esse denuntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desit, hi vel capitis doloribus confluentur necesse est, vel in articulis aliquis exulcerationes graues habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus fœmini mēstrua non proueniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel quelibet alia pars morbo infestetur. Eademq; his pericula sunt, quibus articulorum vitia, dolores, tumoresq; sine podagra similibusq; morbis oriuntur & desinunt. Vtique si sæpe tempora iisdem dolent, noctuq; corpora insudant, frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier à partu vehementes dolores habet, neque alia præterea signa mala sunt circa vigesimum diem, aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicumq; etiam dolorem ingentem circa tempora & frontem habebit, is alterutra ratione eum finiet, magisq; si iuuenis erit, per sanguinis profusionem, si senior, per suppurationem. Febris autem quæ subito sine ratione, sine bonis signis finita est, ferè reuertitur. Cui fauces sanguine & interdum & noctu replentur, sic ut neque capitis dolores, neque præcordiorum, neq; tussis, neque vomitus, neque febricula præcesserit, huius aut in naribus, aut in faucibus vlcus
e reper

reperietur. Si mulieri ex inguine febricula orta est, neque caussa apparet, vlcus in vulua est.

Vrina. *Vrina autem crassa, ex qua quod desidet album est, significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumq; morbi esse. Eadem viridis aut viscerum dolorem tumoremq; cum aliquo periculo subesse, aut certè corpus integrum non esse testatur. At si sanguis aut pus in vrina est, vel vesica, vel renes exulcerati sunt. Si hac crassa carunculas quasdam exiguas quasi capillos habet, aut si bullat, & male olet, & interdum quasi harenam, interdum quasi sanguinem trahit, dolent autem coxæ, quæq; inter has, superq; pubem sunt, & accedunt frequentes ructus, interdum uomitus biliosus, extremæq; partes frigescent, vrinae crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est aque simile, vel ruffum, vel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est, aliud verò cum multo spiritu redditur, utiq; in renibus vitium est. Aut si paulatim destillat, vel si sanguis per hanc editur, & in eo quadam cruenta concreta sunt, idq; ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem vesica vitium est. Calculosi verò his indicijs cognoscuntur: Difficulter vrina redditur, paulatimq; interdum etiam sine voluntate destillat. Eadem harenosa est, nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamq; quidam promptius recti, quidam*

quidam resupinati, maximeq; hi qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemq; extendendo, dolorem leuant. Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea cursu omniq; motu augentur. Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis vicibus implicant. Fœminæ verò oras naturalium suorū manibus admotis scabere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admoverunt, ubi vesicæ cervicem is urget, calculum sentiunt. At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est. Mulieri gravida sine modo fusa aluus elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est quod intus gerit. Durae mammae sanis illud esse testantur. Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus, iecur inflammatum esse significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit, vel distentio nervorum vel rigor timeri potest. At si à priore parte id evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casum, que tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur. Si ora venarum, sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit. At si longa tristitia cum longo timore & vigilia est, atra bilis morbus subest. Quibus sepe ex naribus fluit sanguis, his

aut lientumet, aut capitis dolores sunt, quos sequitur, aut quedam ante oculos tanquam imagines obuersentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivæ mala sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit. Quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigre cicatrices fiant. Quibus causa doloris, neque sensus eius est, his mens labat. Si in ventrem sanguis confluxit, ibi in pus vertitur. Si à coxis, & ab inferioribus partibus dolor in petus transit, neq; vllum signum malum accessit, suppurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua ex parte dolor, aut prurigo cum rubore, aut calore est, ibi aliquid suppurat. *Vrina.* Urina quoque quæ in homine sano parum liquida est, circa aures futurum aliquam suppurationem esse denuntiat. Hæc verò cum sine febre quoque vel latentium, vel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, vbi febris accessit, atq; etiam aliorum morborum tunc signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est, vbi expeditior alicuius, quàm sani fuit, sermo est: subitaq; loquacitas orta est, & hæc ipsa solito audacior: aut vbi raro quis & vehemèter spirat, venasq; concitat. is habet, præcordijs duris & tumentibus. Oculorum quoq; frequens motus, & in capitis dolore offuscæ oculis tenebræ, vel nullo dolore substante somnus ereptus, continuataq; nocte & die vigilia, vel prostratum contra consuetudinem corpus in ventrem, sic, vt ipsius alui dolor.

lor id non coëgerit : item robusto adhuc corpore insolitus dentium stridor insanie signa sunt. Si quid etiam abscessit, & antequam suppuraret, manente adhuc corpore insolita febre subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris quoque dolor acutus, cum febre continua, vehementi q̄, sæpe mentem turbat, & ex eo casu iuniores interdum intra septimum diem moriuntur, seniores tardius : quoniam neq; equè magnas febres experiuntur, neque equè insaniant, ita sustinent, dum is affectus intus versatur. Suffusæ quoque sanguine mulieris mammae, furorem venturum esse testantur. Quibus autem longæ febres sunt, his abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem id malum transit, idq; sæpe intra septimum diem occidit. Quod nisi incidat, sequitur, ut aliqua parte suppuret. Deinde post alui longam resolutionem, tormina : Post hæc intestinorum leuitas oritur. Post nimias destillationes, tabes. Post lateris dolores, vitia pulmonum, post hæc, insania. Post magnos feruores corpori, nervorum rigor aut distentio. Vbi caput vulneratum est, delirium. Vbi vigilia torsit, nervorum distentio. Vbi vehementer venæ supra vlcera mouentur, sanguinis profluvium erit. Suppuratio verò pluribus morbis excitatur. Nam si longæ febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in ali-

e 3 quam

quam partem id malum incumbit, in iunioribus tantum: in senioribus ex eiusmodi morbo quartana ferè nascitur. Eadem suppuratio fit, si præcordia dura dolentia ante vigesimum diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeq; in adolescentibus: utique si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt, sed cum in inferioribus partibus aliquid abscedit. At si præcordia tumorem mollem habent, neq; habere intra sexaginta dies desinunt, hæretq; per omne id tempus febris, tum in superioribus partibus fit abscessus: ac, si inter ipsa ulcera non fluit, circa aures erumpit.

Cumq; omnis longus tumor ad suppurationem
 * alias, ferè spectet, * magis eò tendit is, qui in præcor-
 magis se dijs, quàm is, qui infra est. Si lassitudinis etiam
 tendit sensus in febre est, vel in maxilla, vel in articu-
 lis, aliquid abscedit. Interdum quoque urina te-
 nuis & cruda, sic diu fertur, ut alia salutaria si-
 gna sint, ex q; eo casu, plerumque infra transuer-
 sum septum (quod *διὰ τὸ πρυμνὸν* Græci vocant)
 fit abscessus. Dolor autem pulmonis, si neque per
 sputa, neque per cucurbitulas, neque per sangui-
 nis detractionem, neque per victus rationem fi-
 * intus nitus est, vomica aliquas * interdum excitat,
 exci. aut circa vigesimum diem, aut circa * quadra-
 * x x x. gesimum, nonnunquam etiam circa sexagesi-
 mum. Numerabimus autem ab eo die, quo pri-
 mum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gra-
 vitatem eius partis sensit. Sed hæ vomica modò
 à pulm

à pulmone, modò à contraria parte nascuntur. Quod suppurat ab ea parte, quam afficit, dolorem, inflammationemq; concitat, ipsum calidius est: & si in partē suam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, que nondum oculis patet, sic deprehendi potest: Si febris non dimittit, eaq; interdum lenior est, noctu increscit, multus sudor oritur, cupiditas tussendi est, & penè nihil in tussi excreatur, oculi cavi sunt, male rubent, vena sub lingua inalbescunt, in manibus sunt adunci vngues, digiti, maximeq; summi^{*} pallēt, in pedibus ^{*}calent tumores sunt, spiritus difficiliter trahitur, cibi fastidium est, pustule toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor, & tussis fuit, & spiritus difficultas, vomica vel ante, vel circa vigesimum diem erumpet. Si serius ista cœperint, necesse est quidem increcant, sed quò minus cito affecerint, eò tardius soluentur. Solent etiam in graui morbo pedes cum digitis vnguib; nigrescere. Quod si non est mors consecuta, & reliquum corpus inualuit, pedes tamen decidunt.

Quæ notæ in quoque morbi genere, vel spem, vel pericula ostendant. CAP. VIII.

Sequitur, ut in quoq; morbi genere proprias notas explicem, quæ vel spem, uel periculum ostendant. Ex vesica dolente, si purulenta vrina ^{Vrina.} processit, inq; ea leue & album subsedit, metum detrahit. In pulmonis morbo, si sputo ipse leua-

e + tur

tur dolor, quamuis id purulentum est, tamen aeger
 facile spirat, facile excreat, morbum ipsum non
 difficulter fert, potest ei secunda valetudo con-
 tingere. Neq; inter initia terreri conuenit, si pro-
 tinus sputum mistum est ruffo quodam & san-
 guine, dummodo statim edatur. Laterum dolores
 suppuratione facta, deinde intra quadragesimū
 diem purgata, finiuntur. Si in iocinore vomica
 est, & ex ea fertur pus purum & album, salus
 ei facilis. Id enim malum in tunica est. Ex sup-
 purationibus verò, hæ tolerabiles sunt, quæ in
 exteriorem partem feruntur & acuiuntur. Et ex
 his quæ intus procedunt, hæ leniores, quæ contra
 se cutem non afficiunt, eamq; & sine dolore esse,
 & eiusdem coloris, cuius reliquæ partes sunt,
 sinunt esse. Pus quoq; quacunq; parte erumpit, si
 est leue, album, & vnius coloris, sine vlllo metu
 est, & quo effuso, febris protinus conquieuit,
 desieruntq; urgere cibi fastidium, & potionis
 desiderium: si quando etiam suppuratio descen-
 dit in crura, sputumq; eiusdem factum pro ruffo
 purulentum est, periculi minus est. At in tabe
 eius qui saluus futurus est, sputum esse debet al-
 bum, æquale totum, eiusdemq; coloris, sine pitui-
 ta, eiq; etiam simile esse oportet si quid in nares
 à capite destillat. Longe optimum est febrem
 omnino non esse: secundum est, tantulum esse, vt
 neq; cibum impediat, neq; crebram sitim faciat.
 Alius in hac valetudine ea tuta est, quæ quoti-
 die coacta, eaq; conuenientia his, quæ assumun-
 tur,

Sputi iudi-
 catio.

tur, reddit. Corpus id, quod minimè tenue, maximeq; lati pectoris atque setosi est, cuiusq; cartilago exigua, & carnosae est. Super tabem Alui iudicatio. si mulieri quoque suppressa menstrua fuerunt, & circa pectus atque scapulas dolor mansit, subitoq; sanguis erupit, leuari morbus solet. Nam & tussis minuitur, & sitis atque febriculae desinunt. Sed iisdem ferè, nisi redit sanguis, vomica erumpit, quæ quo cruentior, eo melior est. Aqua autem inter cutem minime terribilis est, quæ nullo antecedente morbo cæpit, deinde quæ longo morbo superuenit. Utique si firma viscera sunt, si spiritus facilis, si nullus dolor, si sine calore corpus est, æqualiterq; in extremis partibus macrum est, si venter mollis, si nulla tussis, nulla sitis, si lingua ne per somnum quidem inarescit, si cibi cupiditas est, si venter medicamentis mouetur, si per se excernit mollia, & figurata, si extenuatur, si vrina & vini mutatione, & epotis aliquibus medicamentis mutatur: si corpus sine lassitudine est, & morbum facile sustinet. Siquidem in quo omnia hæc sunt, is ex toto tutus est: in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum verò vitia, ut podagræ, chiragræq;, si iuuenes tentarunt, neque callum induxerunt, scilicet possunt, maximeq; torminibus leniuntur, & ex quocunq; modo venter fluit. Item morbus comitialis ante pubertatem ortus, non agrè finitur, & in quo ab una parte corporis venientis accessionis sensus incipit,

pit, optimum est à manibus pedibus'ue initium fieri, deinde à lateribus, pessimum inter hæc à capite. Atque in his quoque ea maxime pro-
 Deiectio
 sine vlla
 noxa est. sunt, quæ per deiectiones excernuntur. Ipsa au-
 tem deiectio sine vlla noxa est, quæ sine febre est, si celeriter desinit, si contracto ventre nullus motus eius sentitur, si extremam aluum spiritus sequitur. Acræ tormina quidem periculosa non sunt, si sanguis & strigmenta descendunt, dum
 *ad sint febris cæteræq; accessiones huius morbi * absint, adeo ut etiam gravida mulier non solum reseruari possit, sed etiam partum reservare. Prodestq; in hoc morbo, si iam ætate aliquis processit. Contra intestinorum levitas facilius à teneris ætatibus depellitur, utique si fieri urina & ali cibo corpus incipit. Eadem ætas prodest & in coxæ dolore, & humerorum, & in omni resolutione nervorum. Ex quibus coxa si sine torpore est, si leviter friget, quamvis magnos dolores habet, tamen & facile & mature sanatur, resolutumq; membrum, si nihilominus aliter fieri sanum potest, oris resolutio etiam, aluo cita finitur. Omnisq; deiectio lippienti prodest. At varix ortus, vel per ora venarum subita profusio sanguinis, vel tormina, insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt, vomitu atræ bilis solvuntur. Et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas deiectiones supprimit vomitus. Mulier sanguinẽ vomens profusis

fusis menſtruis liberatur. Quæ menſtruis non
 purgatur, ſi ſanguinem ex naribus fudit, omni
 periculo vacat. Quæ locis laborat, aut difficulter
 partum edit, ſternutamento leuatur. Aëſtīua
 quartana ferè breuis eſt. Cui calor & tremor eſt,
 ſaluti delirium eſt. Lienofis bono tormina ſunt.
 Deniq; ipſa febris (quod maxime mirum videri
 poteſt) ſepe præſidio eſt. Nam & præcordio-
 rum dolores, ſi ſine inflammatione ſunt, finit,
 & in iocineris dolore ſuccurrit, & neruorum
 diſtentionem rigoremq; (ſi poſtea cæpit) ex
 toto tollit, & ex difficultate vrine morbum
 tenuioris inteſtini ortum, ſi vrinam per calorem
 mouet, leuat. At dolores capitis, quibus oculo-
 rum caligo, & rubor cum quadam frontis pru-
 rigine accedunt, ſanguinis profuſione, vel fortui-
 ta, vel etiam petita ſummoventur. Si capitis ac
 frontis dolores ex vento, vel frigore, aut æſtu
 ſunt, grauedine & ſternutamentis finiuntur. Fe-
 brem autem ardentem (quam Græci *ναυσόδιον* *ναύσο-*
vac vocant) ſubitus horror exoluit. Si in febre au-
 res obtuſæ ſunt, ſi ſanguis è naribus fluxit, aut
 venter reſolutus eſt, illud malum deſinit ex to-
 to. Nihil plus aduerſus ſurditatem, quàm bilioſa
 alius poteſt. Quibus in fiſtula urinae vti minu-
 ti* abſceſſus (quos *ὀμματα* Græci vocant) eſſe *apices
 cæperunt, iſs vbi prius ea parte profluxit, ſanitas
 redditur. Ex quibus cum pleraq; per ſe proue-
 niant, ſcire licet inter ea quoque, quæ ars adhi-
 bet, naturam plurimum poſſe. Contra, ſi caput fe-
 bre

bre continenti dolet, neque quicquam reddit, malum atque mortiferum est: maximeq; id periculum est pueris à septimo anno ad quartumdecimum. In pulmonis morbo si sputum primis diebus non fuit, deinde à septimo die cœpit, & ultra septimum mansit, periculosum est. Quantoq; magis mistos, neque inter se diductos colores habet, tanto deterius. Et tamen nihil peius est, quam syncerum id edi, siue ruffum est, siue cruentum, siue album, siue glutinosum, siue pallidum, siue spumans: nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt tussis, destillatio, etiam (quod aliàs salutare habetur) sternutamentum. Periculosissimum est, si hæc secuta subita deiectio est. Ferè vero quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, & mitiora signa, & asperiora esse consueverunt. Ex iocinore si pus cruentum exit, mortiferum est. At ex suppurationibus hæc pessimæ sunt quæ intus tendunt, sic ut exteriorem quoq; cutem decolorent. Ex his deinde, quæ in exteriorem partem prorumpunt, quæ maxime, quæq; planissime sunt, Quod si ne rupta quidem vomica, vel pure extrinsecus emissio febris quieuit, aut quavis quiescit, tamen repetit. Item si sitis est, si cibi fastidium, si venter liquidus, si pus est luidum, & pallidum, si nihil ager excreat nisi pituitam spumantem, periculum certum est. Atq; ex his quidem suppurationibus, quas pulmonis morbi concitarunt, ferè senes moriuntur: ex cæteris iuniores.

res. At in tabe sputum mixtum purulentum, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit, & siti affligit, in corpore tenui periculum subesse testatur. Si quis etiâ in eo morbo diutius traxit, ubi capilli fluunt, ubi vrina quædam araneis similia Vrina subsidentia ostendit, atq; in his odor fædus est, maximeq; ubi post hæc orta deiectionis est, protinus moritur. Utique si tempus autumnus est, quo ferè, qui cætera parte anni traxerunt, resolvuntur. Item pus expuisse in hoc morbo, deinde ex toto spueri desisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo vomica, fistulæq; oriri, quæ non facile sanescunt, nisi si multa signa bonæ valetudinis subsequuta sunt. Ex reliquis verò minime facile sanantur virgines, aut hæ mulieres, quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui verò sano subitus dolor capitis ortus est, dein somnus oppressit, sic ut stertat, neque expergiscatur, intra septimum diem pereundum est: magis si eum alius cito non antecesserit. Si palpebræ dormientis non coeunt, si album oculorum apparet. Quos tamen ita mors sequitur, si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo caput, ad sanitatem raro perducitur, utique si contraria his quæ suprâ posita sunt subsequuntur, æquè in ea quoque tussis spem tollit. Item si sanguis sursum, deorsumq; erupit, & aqua medium corpus implevit. Quibusdam etiam in hoc morbo tumores oriuntur, deinde desunt, deinde rursus

rursus assurgunt. Hi quidem tutiores sunt, quam qui supra comprehensi sunt, si attenduntur, sed ferè fiducia secundæ valetudinis opprimuntur. Illud iure aliquis mirabitur, quomodo quedam simul & affligant nostrâ corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem impleuit, siue in magno abscessu multum puris coit, simul id omne effudisse æquè mortiferum est, ac si quis sani corporis vulnere factus exanguis est. Articuli verò qui sic dolent, ut super eos ex callo quedam tubercula, innata sint, nunquam liberantur: quæq; eorum vitia vel in senectute cœperunt, vel in senectutem ab adolescentia peruenierunt, ut aliquando leniri possunt, sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoq; comitialis post annum quintum & vigesimum ortus ægrè curatur: multoq; ægrius is, qui post quadragesimum annum cœpit: adeo ut in ea ætate aliquid in natura spei, vix quicquam in medicina sit. In eodem morbo si simul totum corpus afficitur, neque antè in partibus aliquis venientis mali sensus est, sed homo ex improviso concidit, cuiuscunque is ætatis est, vix sanescit. Si verò aut mens læsa est, aut nervorum facta resolutio, medicine locus non est. Deiectionibus quoque si febris accessit, si inflammatio iocinoris, aut præcordiorum, aut ventris, si immodica sitis, si longius tempus, si alius varia, si cum dolore est, etiam mortis periculum subest, maximeq; si inter hæc tormenta

mina vetera esse cœperunt. Isq; morbus maxime pueros absorbet usque ad annum decimum. Ceteræ ætates facilius sustinent. Mulier quoque grauida eiusmodi casu rapi potest, atque etiam si ipsa conualuit, partum tamen perdit. Quinetiam tormina ab atra bile orsa mortifera sunt, aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra aluus profluxit, aut intestinorum leuitas. Periculosior est, si frequens deiectio est. Si venter omnibus horis & cum somno, & sine hoc profluit. Si similiter noctu & interdiu. Si quod excernitur aut crudum est, aut nigrum, & præter id etiam leue, & mali odoris sit: si sitis vrget, si post potionem vrina non redditur, quod euenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit, si os exulceratur, si rubet facies, & quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur, si venter est quasi fermentatus, pinguis atque rugosus, si cibi cupiditas non est. Inter quæ cum euident mors sit, multo euidentior est, si iam longum quoque id vitium est, maximeq; si etiam in corpore simili est: si verò in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo arquato durum fieri iecur perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt, deinde inuersa sunt, vel in aquam inter cutem, vel in intestionorum leuitatem, vix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris,
nisi

nisi resolutus est, inter septimanam diem occidit. Multo ex parte, si cum febre, vehementibus etiam & assiduiscapitis doloribus premitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflammatio est in his partibus, quibus viscera continentur, frequenter spirare signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, & in cervices ac scapulas transit, rursusq; in caput revertitur, aut à capite ad cervices scapulasq; peruenit, perniciosus est, nisi vomitum aliquam excitauit, sic ut pus extusceretur, aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit, aut nisi in capite modica prurigo, toto ne corpore pustule ortæ sunt. Neque magnam malum est, ubi torpor atque prurigo perueniunt, modo per totum caput, modo in parte, aut sensu alius ibi quasi frigoris est, eaq; ad summam quoque linguam perueniunt. Et cum in a silem abscessibus auxilium sit, ea difficilior sunt, quò minus saepe sub his malis illi subsequuntur. In coxa vero doloribus si vehementis torpor est, frigiditasq; cruris & coxa, aliusq; nisi coacta non reddat, idq; quod excernitur mucosum est, nonq; etas eius hominis quadragensimum annum excessit, si mortuus erat longissimus, minimèq; curatus, neq; sanari poterit, nisi aut vere, aut autumno. Difficilis eque curatio est, in eadē atate, ubi humerorum dolor, vel ad manus peruenit, vel ad scapulas tendit, torpor enim & dolorem creant, neque bilis voluntu lenatur. Quamvisque vero parte

corp

corporis membrum aliquod resolutum est, si neque mouetur, & emacrescit, in pristinum habitum non reuertitur, eoq; minus, quo vetustius id vitium est, & quo magis in corpore senili est. Omniq; resolutioni neruorum ad medicinam non idonea tempora sunt, hyems, & autumnus: aliquid sperari potest vere & æstate. Isq; morbus mediocri vix sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiam dolor minus medicinæ patet, qui sursum procedit. Mulieri grauida, si subito mammae emacruerunt, abortus periculum est. Quæ neque peperit, neque grauida est, si lac habet, à mensuris defecta est. Quartana æstiuæ breuis, autumnalis ferè longa est, maximeq; quæ cæpit hyeme appropinquante. Si sanguis profuxit, deinde secuta est dementia cum distentione neruorum, periculum mortis est. Itemq; si medicamentis purgatum, & adhuc inanem neruorum distentio oppressit, aut si in magno dolore extremæ partes frigent. Neque is ad vitam redit, qui ex suspendio, spumante ore detractus est. Aluus nigra, sanguini atro similis repentina, siue cum febre, siue etiam sine hac, perniciosa est.

De morborum curationibus.

CAP. IX.

Cognitis indicijs, quæ nos vel spe consolentur, vel metu terreant, ad curationes morborum transcundum est. Ex his quedam communes sunt, quedam propriæ. Communes, quæ pluribus morbis opitulantur. Propriæ, quæ singulis.

gulis. Antè de communibus dicam. Ex quibus tamen quedam non agros solùm, sed sanos quoque sustinent: quedam in aduersa tantum valetudine adhibentur. Omne verò auxilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adijcit, aut euocat, aut reprimat, aut refrigerat, aut calefacit, simulq; aut durat, aut mollit. Quedam non vno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrarijs adiuuant. Demitur materia, sanguinis detractione, cucurbitula, deiectione, vomitu, frictione, gestatione, omniq; exercitatione, corporis abstinentia, sudore. De quibus protinus dicam.

De sanguinis detractione per venas. CAP. X.

Sanguinem incisa vena mitti, nouum non est: sed nullum penè morbum esse, in quo non mittatur, nouum est. Item mitti iunioribus, & fœminis vterum non gerentibus, vetus est. In pueris verò idem experiri, & in senioribus, & in grauidis quoque mulieribus, vetus non est: siquidem antiqui, primam ultimamq; etatem sustinere non posse hoc auxilij genus iudicabāt, persuaserantq; sibi mulierem grauidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam. Postea verò vsus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasq; potiores obseruationes adhibendus esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim non quæ aetas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ vires sint. Ergo si iuuenis imbecillus est, aut si mulier, quæ grauida non est, parum

rum valet, malè sanguis emittitur. Emoritur enim vis, si quæ his supererat, & hoc modo erepta est. At firmus puer, & robustus senex, & grauida mulier valens, tutò curantur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest, quia ferè minus roboris illis atatibus subest. Mulieriq; prægnanti post curationem quoque viribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partu sustinendum. Non quicquid aut intentione animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est, cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret, neque conceptionem solam videat, sed vires æstimet, & ex eo colligat, possit nec ne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in vna muliere duo corpora simul sustineat. Interest enim inter valens corpus, & obesum, inter tenue & infirmum. Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem eiusmodi sustinent, celeriusq; ea si nimium est pinguis aliquis affligitur. Ideoq; vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa specie æstimatur. Neque enim solum hæc considerata sunt, sed etiam morbi genus, quod sit. Vtrum superans, an deficiens materia læserit. Corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel deest, vel integra est, istud alienum est. At si vel copia sui male habet, vel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, pleneq; venæ tument, sanguinis detractione requirit. Item viscerum, morbi,

f 2 nervor

neruorumq; resolutio, & rigor, & distentio,
quicquid deniq; fauces difficultate spiritus stran-
gulat, quicquid subito supprimit vocem, quis-
quis intolerabilis dolor est, & quacunq; de cau-
sa, ruptum aliquid intus atque collisum est. Item
malus corporis habitus, omnesq; acuti morbi,
qui modo (vt supra dixi) non infirmitate, sed
onere nocent. Fieri tamen potest, vt morbus qui-
dem id desideret, corpus autem vix pati posse
videatur. Sed si nullum tamen appareat aliud
auxilium, periturusq; sit, qui laborat, nisi teme-
raria quoq; via fuerit adiutus in hoc statu: boni
medici est ostendere, quàm nulla spes sine san-
guinis detractione sit, fateriq; quantus in hac
ipsa re sit metus. Et tum demum si exigatur, san-
guinem mittere. De quo dubitari in eiusmodi
re non oportet. Satius est enim, anceps auxi-
lium experiri, quàm nullum. Idq; maxime fie-
ri debet, vbi nerui resoluti sunt. Vbi subito ali-
quis obmutuit. Vbi angina strangulatur. Vbi
prioris febris accessio penè cōfecit, paremq; sub-
sequi verisimile est, neq; eandem videntur susti-
nere acri vires posse. Cum sit autem minime cru-
do sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpe-
tuum est. Neque enim semper concoctionem res
exspectat. Ergo si ex superiore parte aliquis de-
cidit, si contusus est, si ex aliquo subito casu san-
guinem vomit, quamui paulo ante sumpsit ci-
bum, tamen protinus ei demenda materia est,
ne, si subsederit, corpus affligat. Idemq; etiam in
alijs

alijs casibus repentinis, qui strangulabunt, dictū
 erit. At si morbi ratio patiatur, tum demū nulla
 cruditis* suspēctione remanente id fiet. Ideoq; *suspicio-
 ei rei videtur aptissimus aduersæ valetudinis ne
 dies secundus aut tertius. Sed ut aliquando etiā
 primo die sanguinem mittere necesse est, sic
 nunquam vtile post diem quartum est, cum iam
 spatio ipso materia & exhausta est, & cor-
 pus corrumpit, ut detractio imbecillum id fa-
 cere possit, non possit integrum. Quod si vehe-
 mens febris urget, in ipso impetu eius sangui-
 nem mittere, hominem iugulare est. Expectanda
 ergo remissio est, si non decrescit, sed crescere de-
 sist, neq; speratur remissio, tunc quoq; quamvis
 peior, sola tamen occasio non omittenda est. Fe-
 re etiam ista medicina ubi necessaria est, in bi-
 dum diuidēda est. Satiū est enim primū le-
 uare agrū, deinde perpurgare, quam simul omni
 vi effusa fortasse precipitare. Quod si in cura
 quoq; aqua, que inter cutem est, ita respondet, *ista
 quanto magis necesse est in sanguine respōdeat?
 Admitti vero is debet, si totius corporis causa sit,
 ex brachio: si partis alicuius, ex ea ipsa parte,
 aut certe quam proxima, quia non ubiq; mitteri
 potest, sed in temporibus, in brachijs, iuxta ta-
 los. Neq; ignoro quosdam dicere, quam longissi-
 me sanguinem inde, ubi ledit, esse mittendum:
 sic enim averti materia cursū: at illo modo in
 id ipsum quod grauat, euocari. Sed id ipsum fal-
 sum est. Proximum enim locum primo exhau-
 rit.

rit. Ex vltterioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur, vbi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamen vsus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse. Si quod in humero vitium est, ex altero brachio: credo, quia si quid parum cesserit, opportuniore hęc partes iniurię sunt, quā quę iā malē habent. Auertitur quoq; interdū sanguis, vbi alia parte prorumpens, alia emittitur. Desinit enim fluere quā volumus, inde obiectis quę prohibeant, alio dato itinere. Mittere autem sanguinem cum sit expeditissimum, vsum habenti, tum ignaro difficilimum est. Iuncta enim est vena arterijs, his nervi. Ita si nervum scalpellus attigit, sequitur nervorum distentio, ea quę hominem crudeliter consumit. At arteria incisa neq; coit, neq; sanescit, interdum etiam vt sanguis vehementer erumpat, efficit. Ipsius quoq; venę, si forte præcisa est, capita comprimuntur, neq; sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neq; venam incidit. Nonnunquam etiā ea latet, neq; facile reperitur. Ita multę res id difficile inscio faciunt, quod perito facilimum est. Incidenda ad medium vena est, ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumq; oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, vitiosus est. Ideoq; vtiliter effunditur. Si rabet, & pellucet, integer est. Eaq; missio sanguinis adeo non prodest, vt etiam noceat, prob

protinusq; is supprimendus est. Sed id euenire non potest sub eo medico, qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut aque niger assidue ac primo die profluat. Quod quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit, supprimendus est. Semperq; antè finis faciendus est, quàm anima deficiat. Deligandumq; brachium super imposito expresso ex aqua frigida penicillo, * & postero die aduerso medio digito vena ferienda, ut recens coitus eius resoluatur, iterumq; sanguinem fundat. Siue autem primo, siue secundo die sanguis, qui crassus & niger initio fluxerat, & rubere & pellucere cœpit, satis materiæ detractum est, atq; quod superest, syncerum est. Ideoq; protinus brachium deligandum, habendumq; ita est, donec valens cicatricula sit, quæ celerrime in vena confirmatur.

* aliàs: & postero die auerso medio digito, nō autem scalpello, vena faciendā.

De sanguinis detractione per cucurbitulas.

C A P. XI.

Cucurbitularum verò duo genera sunt, æneum, & corneum. Aenea altera parte patet, altera clausa est. Cornea altera parte æquè patens, altera foramen habet exiguum. In aneam linamētum ardens coniicitur, ac sic os eius corpori aptatur, imprimiturq; donec inhereat. Cornea per se corpori imponitur, deinde ubi ea parte qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superq; cera cauum id clausum est, æquè inhaerescit. Vtraq; non ex his tantum materiæ generibus, sed etiam ex quolibet alio rectè
f 4 fit.

fit. At si cætera defecerunt, caliculus quoq; aut
 puliarius oris cōpressioris, ei rei commodè apta-
 tur. Vbi inhæsit, si concisa antè scalpello cutis est,
 sanguinem extrahit: si integra est, spiritum. Er-
 go vbi materia quæ intus est lædit, illo modo:
 vbi inflatio, hoc imponi solet. Vsus autem cucur-
 bitula præcipuus est, vbi non in toto corpore, sed
 in parte aliqua vitium est, quam exhaustiri ad
 confirmandam valetudinem satis est. Idq; ipsum
 testimonium est, etiam scalpello sanguinem, vbi
 membro succurritur ab ea potissimè parte, quæ
 iam læsa est, esse mittendum, quòd nemo cucur-
 bitulam diuersæ parti imponit, nisi cum profu-
 sionem sanguinis eò auertit, sed ei ipsi quæ dolet
 quæq; liberanda est. Opus etiam esse cucurbi-
 tula potest in morbis longis, quamuis & ijs iam
 spatium aliquod accessit, siue corrupta materia,
 siue spiritu male habente. In acutis quoq; qui-
 busdam, si & leuari corpus debet, & ex vena
 sanguinem mitti, vires non patiuntur. Idq; au-
 xilium vt minus vehemens, ita magis tutum.
 Neque vnquam periculosum est, etiam si in me-
 dio febris impetu, etiam si in cruditate adhibe-
 tur. Ideoq; vbi sanguinem mitti opus est, si in-
 cisa vena, præceps periculum est, aut si in par-
 te corporis etiam vitium est, huc potius confu-
 giendum est. Cum eo tamen, vt sciamus, hic vt
 nullum periculum, ita leuius præsidium esse, nec
 posse vehementi malo, nisi æquè vehemens au-
 xilium succurrere.

De

De Deiectione. CAP. XII.

Deiectionem autem antiqui varijs medicamentis, crebraq; alui ductione in omnibus ferè morbis moliebantur, dabantq; aut nigrum veratrū aut filiculam, aut squamam arii, quæm λεπιδόχαλκον Græci vocant, aut lactucæ marinæ lac, cuius gutta pani adiecta abunde purgat, aut lac vel asinum, vel bubulum, vel caprinum, eiq; salis paulum adijciebant, decoquebantq; id, & sublatis his, quæ coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogebant. Sed medicamenta stomachum ferè ledunt. Ideoq; omnibus catharticis aloë miscenda est. Alius si vehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in aduersa valetudine medicamentum eius rei causa rectè datur, nisi ubi is morbus sine febre est. Ut cum veratrum nigrum, aut atra bile vexatis, aut cum tristitia insanientibus, aut ijs quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At ubi febres sunt, satius est eius rei causa cibos, potionesq; assumere, qui simul & alant, & ventrem molliant. Suntq; valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio convenit. Plerunque verò alius* potioni- *potius
bus ducenda est, quod ab Asclepiade quoque sic *vitupe-
*temperatum, ut tamen servatum sit, video ple- ratum
runque seculo nostro præteriri. Est autem ea
moderatio, quam is secutus videtur, aptissima:
ut neq; sæpe ea medicina tentetur, & tamen se-
mel sumptum vel bis non omittatur. Si caput
f s graus

graue est: si oculi caligant: si morbus maioris in-
 testini est, quod Græci κῶλον nominant: si in
 imo ventre, aut in coxa dolores sunt: si in stoma-
 chum quedam biliosa concurrunt, vel etiam pi-
 tuita eò se, humor' ve aliquis aquæ similis con-
 fert: si spiritus difficilius redditur: si nihil per se
 venter excernit, utiq; si iuxta quoq; stercus est,
 & intus remanet: aut si stercoris odorem, nihil
 deiciens, ager ex spiritu suo sentit: aut si cor-
 ruptum est quod excernitur: aut si prima inedia
 febrem non sustulit: aut si sanguinem mitti,
 cum opus sit, vires non patiuntur, tempus' ve
 eius rei præterit: aut si multum ante morbum
 portauit aliquis potauit: aut si is qui sæpe vel sponte, vel
 casu purgatus est, subito habet aluum suppres-
 sam. Seruanda verò illa sunt, ne ante diem ter-
 tium ducatur, ne vlla cruditate substantive, ne in
 corpore infirmo, diuq; in aduersa valetudine
 exhausto, ne' ve in eo, cui satis aluus reddit quo-
 tidie, qui' ve eam liquidam habebit, ne in ipso
 accessionis impetu, quia quod tum infusum est,
 aluo continetur, regeſtumq; in caput, multo gra-
 uius periculum efficit. Pridie verò abſtinere
 debet ager, ut aptus tali curationi sit. Eodem die
 ante aliquot horas aquam calidam bibere, ut
 *aliàs, superiores eius partes madescât, tum *deicien-
 immitten da aluus est, si leui medicina contenti sumus,
 da i aluū pura aqua: si paulò valentiori, mulsæ, si leni: ex
 aqua, in qua fœnum græcum, vel ptisana, vel
 malua decocta sit. Si reprimendi caussa, ex ver-
 benis

benis. Acris autem est marina aqua, vel alia sale adiecto, atq; utraq; decocta commodior est. Acrior fit adiecto vel oleo vel nitro, vel melle quoque. Si acrior est, eo plus extrahit, sed minus facile sustinetur. Id quod infunditur, neque frigidum esse oportet, neq; calidum, ne alterutro modo laedat. Cum infusum est, quantum fieri potest, continere se in lectulo debet ager, nec primæ cupiditati deiectionis protinus cedere. Vbi necesse est, tum demum *desidere. Fereq; eo modo *residere. do dempta materia superioribus partibus levatis morbum ipsum mollit. Cum verò quoties res coëgit, desidendo aliquis se exhausit, paulisper debet conquiescere, & ne vires deficient, utiq; eo die cibum assumere: qui plenior an exiguus sit dandus, ex ratione eius accessionis, quæ expectabitur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

De Vomitu.

CAP. XIII.

AT Vomitus, ut in secunda quoq; valetudine saepe necessarius biliosis est, sic etiam in his morbis, quos bilis concitavit. Ergo omnibus qui ante febres horrore & tremore vexantur, omnibus, qui cholera laborant, omnibus etiã cum quadam hilaritate insanientibus, & comitiali quoq; morbo oppressis, necessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut in cholera, si febris est, ut inter horrores, asperioribus medicamentis opus non est, sicut in deiectionibus quoq; supra dictum

dictum est, satisq; est ea vomitus causa sumi, que sanis quoq; sumenda esse proposui. At ubi longi, valentesq; morbi sine febre sunt, ut comitialis aut insania, veratro quoq; albo utendum est. Iul neq; hyeme, neq; æstate recte datur, optime vere, tolerabiliter autumno. Quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humidum sit. Illud scire oportet, omne eiusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper ægris prodesse, semper sanis nocere.

De Frictione.

CAP. XIIII.

DE Frictione verò & Gestatione adeo multa Asclepiades, tanquam inuentor eius, posuit: quod in eo volumine quod communis, vi nium auxiliorum scripsit, cum trium tantis facemiscilicet, ret mentionem, *huius & equi & gestationis, & aquæ tamen maximam partem in hoc consumpserit. et gestat. Oportet autem neq; recentiores viros in his fraudare, quæ vel reppererunt, vel recte secuti sunt, & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt, autoribus suis reddere. Neq; dubitari potest, quin latius quidem, & dilucidius, ubi & quomodo frictione utendum esset, Asclepiades præceperit, nihil tamen repercrit, quod non à vetustissimo autore Hippocrate paucis verbis comprehensum sit, qui dixit, Frictione si vehemens sit, durari corpus: si lenis, molliri: si multa, minui: si modica, impleri. Sequitur ergo, ut tam utendum sit, cum aut astringendum corpus

corpus sit, quod fluens est; aut molliendum, quod induruit: aut dirigendum in eo quod copia nocet; aut alendum id, quod tenue, & infirmum est. Quas tamen species si quis curiosius aestimet, quod iam ad medicum non pertinet, facile intelliget, omnes ex una causa pendere, quae demit. Nam & astringitur aliquid eo dempto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat: & mollitur eo detracto, quod duriciem creabat; & impletur non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem digestionem quadam relaxatam penetrat. Diversarum verò rerum in modo causa est. Inter unctionem autem & frictionem, multum interest. Ungi enim, leviterque pertractari corpus etiam in acutis & recentibus morbis oportet, in remissione tamen & ante cibum. Longa verò frictione uti, neque in acutis morbis, neque incrementibus convenit, praeterquam cum phreneticis somnus ea queritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, & iam à primo impetu inclinata. Neque ignoro quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse, incrementibus morbi, non cum iam per se finiuntur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli, quod duobus de causis necessarium est, ut & quam primum bona valetudo contingat: & ne morbus, qui remanet, iterum, quamvis levi de causa, exasperetur. Potest enim morbus minus gra-
uis

uis esse quàm fuerit, neque ideo tamen solui, sed reliquijs quibusdam inherere, quas admotum aliquod auxilium discutit. Sed ut leuata quoque aduersa valetudine rectè frictio adhibetur, sic nunquam adhibenda est febre increcente. Verum si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit, minus certè cum ea remiserit. Eodem autem modo in tutis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus modo est in partibus, aut quia ipsius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam & capitis longos dolores, ipsius frictio leuat, non in impetu tamen doloris, et membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen sepius aliud perfricandum est, cum aliud dolet, maximeq; cum à summis, aut à medijs partibus corporis euccare materiam volumus, ideoq; extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex viribus hominis colligendum est. Et si is perinfirmus est, potest satis esse quinquagies: si robustior, potest ducenties esse faciendum. Inter utrunq; deinde, prout vires sunt. Quò fit, ut etsam minus sepe in muliere, quàm in viro, minus sepe in puero vel sene, quàm in iuvene manus dimouenda sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentiq; frictione opus est. Nam neque totum corpus infirmari cito per partem potest, & opus est quàm plurimum materie digerere, siue id ipsum membrum,

brum, siue per id aliud leuamus. At ubi totius corporis imbecillitas hanc curationem per totum id exigit, breuior esse debet & lenior, ut tantummodo summam cutem emolliat, quò facilius capax ex recenti cibo nouæ materiæ fiat. In malis iam ægrum esse testatur, ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, ut supra posui. Sed tunc quoq; vnicum in frictione præsidium est, quæ si calorem in cutem euocauit, potest alicui medicinæ locum facere.

De Gestatione.

CAP. XV.

Gestatio quoque longis etiam & inclinatis morbis aptissima est, utilisq; est & his corporibus, quæ iam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt: & his quibus lentæ morborum reliquæ remanent, neq; aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti, vehementiq; febre, præcipueq; ardente, ad discutendam eam, gestatione dixit utendum esse. Sed id periculose fit, meliusq; quiete eiusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen experiri volet, sic experiatur, si lingua nõ erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut præcordijs suberit. Et ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, siue id in toto, siue in parte est, nisi tamen solis nervis dolentibus: neq; vnquam in recenti febre, sed in remissione eius. Genera autem gestationis plura sunt adhibenda: quæ sunt & pro viribus cuiusq;

iusq; , & pro opibus, ne aut imbecillum hominem nimis digérant, aut humili obsint. Gestationum lenissima est naui, vel in portu, vel in flumine; vehementior in alto mari naui, vel lectica, aut scamno: acrior vehiculo. Atq; hæc ipsa, & intendi & leniri possunt: si nihil horum est, suspendi lectus debet, & moueri: si ne id quidem est, at certè vni pedi lecti funiculus subiiciendus est, atq; ita lectus huc & illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis, infirmisimis conueniunt. Valentiora verò his, qui iam pluribus diebus febre liberati sunt: aut his, qui grauium morborum initia sic sentiunt, vt adhuc febre vacent. Quod & in tabe, & in stomachi vitijs, & cum aqua cutem subiit, & interdum in morbo regio fit. Aut vbi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamuis diu manent. In quibus affectibus ea quoq; genera exercitationum necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco, quo quemadmodum sani, neque firmi homines se gererent, præcepimus.

De Abstinentia.

CAP. XVI.

Abstinentia verò duo genera sunt. Alterum vbi nihil assumit ager. Alterum, vbi non nisi quod oportet. Initia morborum, primum famem, sitimq; desiderant: ipsi deinde morbi moderationem, vt neq; aliud, quàm expedit, neque eius ipsius nimium sumatur. Neq; enim conuenit

nit iuxta inedia protinus satietatem esse. Quòd si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit: quanto inutilius est in corpore etiam agro? Neque vlla res magis adiuvat laborantem, quàm tempestiua abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alij tempora medicis pro dono remittunt, sibiipsis modum vendicant. Liberaliter agere se credunt, qui cetera illorum arbitrio relinquunt, in genere cibi liberi sunt, quasi quæatur, quid medico liceat, non quid agro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in eius quod assumitur, vel tempore vel modo, vel genere peccatur.

De Sudore.

CAP. XVII.

Svdor etiam duobus modis elicitur: aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & harenae calide, & laconici, & clibani, & quarundam naturalium sudationes, ubi è terra profusus calidus vapor edificio includitur, sicut super Baias in myrtetis habemus. Præter hæc sole quoque, & exercitatione is mouetur. Vtiliaq; hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isq; digerendus est. Ac neruorum quoque quedam vitia sic optimè curantur. Sed cetera infirmis possunt conuenire: Sol, & exercitatio tantum robustioribus, qui tamen sine febre, vel initio morbi, vel etiam grauib; morbis tenentur. Cauendum autem est, ne quid horum vel in febre,

g

vel

vel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. Nam modò discussis febribus initium cibi plenioris, viniq; firmioris valetudini facit: modò febrem ipsam tollit, fereq; adhibetur, ubi summam cutem relaxari, euocariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur, Asclepiades audacius. Neque terrere autem ea res, si tempestiva est, debet: & ante tempus nocet. Quisquis febre liberatus est, simul atq; ea vno die non accessit, eo qui proximus est, post tempus accessio- nis, tutò lauari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quarto'ue die reuer- tatur, quandocunq; non accessit, balneum tutum est. Manentibus verò adhuc febribus, si hæ sunt lentæ, licnesq; iamdiu male habent, rectè medi- cina ista tentatur. Cum eo tamen, ne præcordia dura sint, ne'ue ea tumeant, ne'ue lingua aspera sit, ne'ue aut in medio corpore, aut in capite do- lor ullus sit, ne'ue tum febris increseat. At in his quidem febribus quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt, alterum ante horro- rem, alterum febre finita. In his verò qui lentis febriculis diu detinentur, cum aut ex toto recef- sit accessio, aut si id non solet certè lenita est, iamq; corpus tam integrum est, quàm maximè esse in eo genere valetudinis solet: imbecillus ho- mo iturus in balneum, vitare debet, ne antè fri- gus aliquod experiatur. Vbi in balneum ve- nire resistere nit, paulisper residere, expeririq; num tempora astring

astringantur, & an sudor aliquis oriatur. Illud
 si incidit, hoc non secutum est, inutile eo die bal-
 neum est: perungendus est is leniter, & referen-
 dus est, vitandumq; omnimodo frigus, & absti-
 nentia vtendum. At si temporibus integris, pri-
 mum ibi, deinde alibi sudor incipit, fouendum os
 aqua calida, tum in solio desidendum est: atque
 ibi quoque videndum, num sub primo contactu
 aquae calidae summa cutis inhorrescat, quod vix
 tamen fieri potest, si priora rectè cesserunt. Cer-
 tum id autem signum inutile balnei est. Antè
 verò, an postea, quàm in aquam calidam se de-
 mittat, aliquis perungi debeat, ex ratione vale-
 tudinis suae cognoscat. Ferè tamen, nisi vbi no-
 minatim, vt postea fiat, id præcipietur, moto su-
 dore leuiter corpus perungendum, deinde in a-
 quam calidam demittendum est. Atq; hic quoq;
 habenda virium ratio est. Neq; committendum,
 vt per æstum anima deficiat: sed maturius is
 auferendus, curiosèq; in vestimentis inuoluen-
 dus est, vt neque ad eum frigus aspiret, & ibi
 quoque antequam aliquid assumat, insudet. Fo-
 menta quoque calida sunt, milium, sal, harena,
 quodlibet eorum calefactum, & in linteum con-
 iectum. Si minore vi opus est, etiam solum lin-
 teum. At si maiore, extincti titiones, inuolutiq;
 panniculis, & sic circumdati. Quinetiam calido
 oleo replentur vtriculi, & in vasa fictilia, ad si-
 militudinem, quas lenticulas vocant aqua con-
 iicitur, & sal sicco linteo excipitur, demitti-
 turq;

De his ex-
 tinctis ti-
 tionibus ha-
 bes infra li.
 3 cap. 12.
 Lenticulæ.

turq; in aquam bene calidam, tum super id membrum, quod fouendum est, collocatur: iuxtaq; ignem ferramenta duo sunt capitulis paulo latioribus, alterumq; ex his demittitur in eum salem, & aqua super leuiter aspergitur. Vbi frigere cæpit, ad ignem refertur, & idem in altero fit, deinde inuicem in utroque inter quæ descendit salsus & calidus succus, qui contractis aliquo morbo neruis opitulatur. His omnibus commune est digerere id, quod vel præcordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoq; utendum sit, in ipsis morborum generibus dicetur.

Qui cibi, potionésue, aut valentis, aut mediæ, aut imbecillæ materiæ sint. CAP. XVIII.

Cum de his dictum sit, quæ detrahendo iuant, ad ea veniendum est, quæ nos alunt, id est cibum & potionem. Hæc autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundæ valetudinis communia præsidia sunt. Pertinetq; ad rem, omnium proprietates nosse: primum, ut sani sciant, quomodo his utantur: deinde ut ex-
 quentibus nobis morborum curationem, liceat species rerum, quæ assidue necessariae erunt, subijcere. Neque necesse est subinde singulas illas nominare. Scire igitur oportet omnia legumina, quæq; ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse. Id valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est. Item omne animal quadupes

drupes domi natum, omnem grandem feram,
 quales sunt capra, ceruus, aper, onager: omnem
 grandem auem, quales sunt anser, & pavo, &
 grus. Omnes belluas marinas, ex quibus nūc
 est, quæq; his pares sunt. Item mel, & caseum.
 Quò minus mirum est, opus pistorium, valen-
 tissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle,
 caseo constat. In media verò materia, numera-
 ri ex oleribus debere ea, quorum radices vel
 bulbos assumimus. Ex quadrupedibus, leporem.
 Aues omnes à minimis ad Phœnicopterum:
 item pisces omnes, qui salem non patiuntur, so-
 lidi'ue saliantur. Imbecillissimam verò mate-
 riam esse omne olus, & quicquid in cauliculo
 nascitur, qualis est cucurbita, & cucumis, &
 capparitis. Omnia poma, oleas, cochleas, itemq;
 conchylia. Sed quamuis hæc ita discreta sunt, ta-
 men etiam quæ sub eadem specie sunt, magna
 discrimina recipiunt, aliaq; res alia vel valen-
 tior est vel infirmior. Siquidem plus alimenti
 est in carne, quàm in vlio alio. Firmius est triti-
 cum, quàm milium, idipsum quàm ordeum, &
 ex tritico firmissima siligo, deinde simila, dein-
 de cui nihil ademptum est (quod αὐτὸ πῶρον
 Græci vocant) infirmior est, ex polline infir-
 missimus cibarius panis. Ex leguminibus ve-
 rò valentior faba, vel lenticula, quàm pisum.

Cibarius
panis.

Varro lib.
4. de Ling.
Latin. Ra-
dix, inquit,

g 3 dicula

peregrinū
vocabulū:
sic enim an-
tiqui Græ-
ci, quū nūc
Raphanū.

*fragilia

dicula appellatur. Item firmior brassica, & be-
ta, & porrum, quā lactuca, vel cucurbita, vel
asparagus. At ex fructibus surculorum valen-
tiores vna, ficus, nuces, palmulae, quā quæ po-
ma proprie nominantur. Atque ex his ipsis fir-
miora quæ succosa, quā quæ *frigida sunt.
Itemq; ex his avibus, quæ in media specie sunt,
valentior ea, quæ pedibus, quā quæ volatu
magis nititur: & ex his quæ volatu fidunt, fir-
miores sunt, quæ grandiores aves, quā quæ
minute sunt, vt ficedula & turdus. Atque ea
quoq; quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præ-
stant, quā quæ natandi scientiam non habent.
Inter domesticas verò quadrupedes, leuissima
suilla est, grauiissima bubula. Itemq; ex feris
quo maius quodque animal, eo robustior ex eo
cibus est. Pisciumq; eorum, qui ex media mate-
ria sunt, quibus maxime vtimur: tamen gra-
uissimi sunt, ex quibus salsamenta quoque fieri
possunt, qualis Lacertus est, deinde qui quam-
uis teneriores, tamen duri sunt, vt aurata, cor-
uus, scarus, oculata: tum plani. post quos etiam
leniores, lupi, mulliq; & post hos omnes saxa-
tiles. Neque verò in generibus rerum tantum-
modo discrimen est, sed etiam in ipsis, quod &
etate fit, & membro, & solo, & cælo, & ha-
bitu. Nam quadrupes animal omne si lactans
est, minus alimenti præstat. Item quo tenerior
pullus cohortalis est. In piscibus quoque media
etatis, quæ nondum summam magnitudinem im-
pleuit.

pleuit. Deinde ex eodem sue ungule, rostrum, aures, cerebellum. Ex agno, hædo'ue, cum petiolis totum caput aliquāto, quā cætera membra, leuiora sunt, adeo ut in media materia poni possint. Ex auibus, colla ala'ue recte infirmis annumerantur. Quod ad solum verò pertinet, frumentum quoque valentius est collinum, quā campestre. Leuior piscis inter saxa editus, quā in harena: leuior in harena, quā in limo. Quò fit, ut ex stagno, vel lacu, vel flumine eadem genera grauiora sint. Leuiorq; qui in alto, quā qui in vado vixit. Omne etiam ferum animal domestico leuius: & quodcunque humido cælo, quā quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pingua, quā macra, recentia quā salsa, noua quā vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit iurulenta, quā assa: magis assa, quā *frixæ. Ouum durum valen- *elixæ tissimæ materiæ est, molle vel sorbile, imbecillissimæ. Cumq; panificia omnia firmissima sint, elota tamen quædam genera frumenti, ut alica, ὀπυζα, ptisana, vel ex hisdem facta sorbitio, vel pulticula, & aqua quoque madens panis imbecillissimis annumerari potest. Ex potionibus verò, quæcunque ex frumento facta est, itemq; lac, mulsum, defrutum, passum, vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magnæ vetustatis, valentissimi generis est. At acetum, & id vinum, quod paucorum annorum, vel austerrum, vel lene est, in media materia est. Ideoq;

§ 4 infirm

infirmis nunquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est: firmiorque; ex frumento potio est, quod firmitus fuit ipsum frumentum: firmior ex eo vino, quod bono solo, quam quod tenui, quodque; temperato caelo, quam quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumque; aut frigido, aut calido natum est. Multum quod plus mellis habet, defrutum quo magis incoctum est, passum quo ex sicciore uva est, eo valentius est. Aqua leuissima pluuialis est, deinde fontana, tum ex flumine, tum ex puteo, post haec ex niue, aut glacie, grauior his ex lacu, grauissima ex palude. Facilis etiam & necessaria cognitio est naturam eius requirantibus. Nam leuis pondere apparet, & ex his quae pondere pares sunt, eo melior quaeque; est, quo celerius & calefit, & frigescit, quoque; celerius ex ea legumina percoquantur. Ferè verò sequitur, ut quod valentior quaeque; materia est, eo minus facile concoquatur, sed si concocta est, plus alat. Itaque utendum est materiae genere pro viribus, modusque; omnibus pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus rebus infirmis opus est. Mediocriter firmos media materia optime sustinet: & robustis apta validissima est. Plus deinde aliquis assumere ex leuioribus potest, magis in his, quae valentissima sunt, temperare sibi debet.

Quae natura ac proprietas cuiusque rei sit, quae
 uel scimus.

C A P. XIX.

Neque

NEquæ hæc sola discrimina sunt, sed etiam aliæ res boni succi, aliæ mali sunt, quas *ὀχυλὰς*, vel *κακοχυλὰς* Græci vocant. Aliæ lenes, aliæ acres, aliæ crassiore pituitam in nobis faciunt, aliæ tenuiorem, aliæ idoneæ sunt stomacho, aliæ alienæ sunt. Itemq; aliæ inflant, aliæ ab hoc absunt, aliæ calefaciunt, aliæ refrigerant, aliæ facile in stomacho acescunt, aliæ non facile intus corrumpuntur, aliæ mouent aluum, aliæ supprimunt, aliæ citant urinam, aliæ tardant. Quædam somnum mouent, quædam sensus excitant. Quæ omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud aliter, vel corpori, vel valetudini conuenit.

Quæ res boni succi sint.

C A P. XX.

Boni succi sunt, triticum, siligo, alica, oryza, amyllum. Item & lenes sunt & stomacho aptæ & calefaciunt, tragus, ptisana, lac, caseus mollis, omnis venatio, omnes aues, quæ ex media materia sunt. Ex maioribus quoque hæc, quas supra nominauimus. Mediꝝ inter teneros durosq; pisces, vt mullus & lupus, verna, lactuca, vrtica, malua, cucumis, cucurbita, ouum sorbile, portulaca, cochleæ, palmule. Ex pomis quodcunq; neq; acerbum neq; acidum est. Vinum dulce vel lene, passum, defrutum, oleæ quæ ex his duobus in alterutro seruatæ sunt, vuluæ, rostra, *trunculiq;. In summa omnis pinguis caro, *ventri-

omnis glutinosa, omne iecur.

culiq;

g s

Quæ

Quæ res mali succi sint.

CAP. XXI.

MAli verò succi sunt milium, panicum, ordeum, legumina, caro domestica perniacra, omnisq; caro salsa, omne salsamentum, garum, vetus caseus, cicer, radícula, rapa, napi, bulbi, brassica, magisq; etiam cyma eius, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca, nasturtium, thymum, nepeta, satureia, hyssopum, ruta, anethum, sceniculum, cuminum, anisum, lapathum, sinapi, & allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcumq; acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, pisces quoq; saxatiles, omnesq; qui ex tenerrimo genere sunt, aut hi qui rursus nimium duri, virisq; sunt, ut fere quos stagna, lacus, limosi uerui ferunt, quiue in nimiam magnitudinem excesserunt.

Quæ res lenes, quæue acres sint.

CAP. XXII.

Lenes autem sunt, sorbitiones, pulticula, laganum, amyllum, ptisana, pinguis caro, & quæcumq; glutinosa est. Quod ferè quidem in omni, quæ domestica sit, præcipue tamen in vngulis, trunculisq; suum, in petiolis, capitulisq; hædorum, & vitulorum, & agnorum, omnibusq; cerebellis. Item si qui proprie bulbi nominantur, lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acria sunt omnia nimis austera, omnia acida, omnia salsa, & mel quidem, quo melius est, eo magis. Item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cucumis

Petiolis, id est, paruis pedibus: à Catone petecini, in de re rustic. appellati.

mis

mis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radícula, intubus, ocymum, lactuca, maximaq; olerum pars.

Quæ res crassiores, quæ tæ tenuiorem pituitam faciant.

CAP. XXIII.

Crassiores autem pituitam faciunt, onasorbilia, alica, oryza, amyllum, ptisana, lucbulbi, omniaq; fere glutinosa. Extenuant eandem omnia salsa, atq; acria, & acida.

Quæ res stomacho idoneæ sint.

CAP. XXIII.

Stomacho autem aptissima sunt, quæ cum iusto austera sunt, etiam quæ acida sunt, quæq; contacta sale modico sunt. Itē panis sine fermento, & elota alica, vel oryza, vel ptisana, omnis auis, omnis venatio atq; vtraq; vel assa, vel elixa. Ex domesticis animalibus bubula. Si quid ex cæteris sumitur, macrius potius, quàm pingue. Ex sue ungule, rostra, aures, *vulvæq; steriles. *vulvæ, Ex oleribus intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, sifer. Ex pomis cerasium, morum, sorbum, pirum fragile, quale crus luminum, vel neuianum est. Item pira, quæ reponuntur tarentina atq; signina. Malum orbiculatum, aut scandianum, vel amerinum, vel cotoneum, vel punicum. Vux ex olla, molle ouum, palmula, nuclei, pinei, oleæ albæ ex dura muria, eadem aceto intinctæ, vel nigra, quæ in arbore bene permaturuerunt, vel quæ in passo, defructo uel seruata sunt. Vinum austerum, licet iam asperum sit, item resinatū.

Duri

Duri ex media materia pisces, ostrea, pectines, murices, purpure, cochleæ: cibi, potionesq; vel frigida vel feruentes, absinthium.

Quæ res alienæ stomacho sint. C A P. XXV.

Aliena verò stomacho sunt omnia tepida, omnia salsa, omnia iurulenta, prædulcia, omnia pinguis, sorbitio, panis fermentatus, iteq; vel ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices oleum, & quodcunq; olus ex oleo garo'ue estur, mel, mulsum, defrutū, passum, lac, omnis caseus, vna recens, ficus & viridis & arida, legumina omnia, quæq; inflare consueuerunt: item thymum, nepeta, satureia, hyssopum, nasturtium, lappathum, lapsana, iuglandes. Ex his autem intelligi potest, non quicquid boni succi est, protinus stomacho conuenire: neq; quicquid stomacho conuenit, protinus boni succi esse.

Quæ inflant, aut inflammationem leuent.

C A P. XXVI.

Inflant autem omnia fere legumina, omnia pinguis, omnia dulcia, omnia iurulenta, mustum, atque etiam id vinum, cui nihil adhuc ætatis accessit. Ex oleribus allium, cepa, brassica, omnesq; radices, excepto sisere & pastinaca, bulbi, ficus etiam arida, sed magis virides, vna recentes, nuges omnes, exceptis nucleis pineis, lac, omnisq; caseus, quicquid deinde subcrudum aliquis assumpsit. Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchylijs, ouis vel mollibus, vel sorbilibus, vi-

no

no vetere. Fœniculum verò & anethum inflationes etiam leuant.

Quæ res aut calefaciant, aut refrigerent.

CAP. XXVII.

AT calefaciunt piper, sal, caro omnis iurulentata, alliū, cepa, ficus arida, salsamentū, vinum, & quo meracius est, eo magis. Refrigerant olera, quorum crudi caules assununtur, vt intubus, & lactuca. Item coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austerā, pira fragilia, caro elixa, præcipueq; acetum, siue cibus ex eo, siue potio assumitur.

Quæ res intus facile vitientur, vel minime corrumpantur.

CAP. XXVIII.

FAcile autem intus corrumpuntur, panis fermentatus, & quisquis alius quam ex tritico est, lac, mel, ideoq; * lactaria atq; omne pisto- * lactatia riū opus, teneri pisces, ostrea, olera, caseus, et recens, & vetus, crassa vel tenera caro, vinū dulce, mulsum, defrutum, passum, quicquid deinde vel iurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue. At minime intus vitiantur, panis sine fermento, aues, & eæ potius duriores, aurati pisces: neque solum aurata pura, aut scarus, sed etiam lolligo, locusta, polypus. Item bubula, omnisq; dura caro, eademq; aptior est, si macra, si salsa est, omniaq; salsamenta, cochleæ, murices, purpure, vinum austerum, vel resinatum.

Quæ res aluum moueant. CAP. XXIX.

AT aluum mouent, panis fermentatus, magisq; si cibarius vel hordeaceus est, brassica,

ca, si subcruda est, lactuca, anethum, nasturtiū,
 ocymum, rrtica, portulaca, radícula, cappari,
 allium, cepa, malua, lapathum, beta, asparagus,
 cucurbita, cerasia, mora, vna, omnia mitia, ficus
 etiam arida, sed magis viridis, vna recētes, pin-
 guet, minutæ aues, cochlea, garum, salsamenta,
 ostrea, pelorides, echini, muscoli, & omnes fere
 conchule, maximeq; ius earum, saxatiles, &
 omnes teneri pisces, sepiarum atramentū, si qua
 caro assumitur pinguis eadem, vel iurulenta,
 * lactatia vel elixa, aues, que natant, mel crudum, lac, * la-
 ctaria omnia, mulsum, vinum dulce, vel salsum,
 aqua tenera, omnia tepida, dulcia, pinguis, eli-
 xa, iurulenta, salsa, diluta.

Panis.

Quæ res alium astringant. C A P. XXX.

Contra astringunt, panis ex siligine, vel ex
 simila, magis si sine sermēto est, magis etiā
 si rētus est, intenditurq; vis eius etiam si bis
 coquitur. Pulicula vel ex alica, vel ex panico,
 vel ex milio, itemq; ex iisdem sorbitio, & ma-
 gi si hæc antefricta sunt. Lenticula, cui vel be-
 ta, vel intubus, vel ambubeia vel plantago ad-
 iecta est, magisq; etiam, si illa antefricta est,
 per se etiā intubus, vel ex plantagine vel am-
 bubeia fricta, minuta olera, brassica bis deco-
 cta, dura oua, magisq; si assa sunt, minutæ aues,
 merula, palumbus, magisq; si in posca decoctus
 est, graues omnes aues, que magis currūt, quā
 volant, lepus, caprea, iecur ex his que seum ha-
 bent, maximeq; bubulum, ac seum ipsum, ca-
 seus,

seus, qui vehementior vetustate fit, vel ea mutatione quam in caseo transmarino videmus, aut si recens est ex melle, mulso'ue decoctus. Item mel coctum, pira immatura, sorba, magisq; ea, quæ torminalia vocantur, mala cydonia, & punica, oleæ vel albæ vel permaturæ, myrta, palmule, purpureæ, murices, vinum resinatum vel asperum, item meracum, acetum, mulsum quod inferbuit, item defrutum, passum, aqua vel tepida, vel præfrigida, dura, id est ea quæ tarde putrescit, ideoq; pluuia potissimum, omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, & in eadem carne assa potius quam elixa.

Quæ res urinam mouent. C A P. XXXI.

VRinam autem mouent, quæcumq; in horto nascentia boni odoris sunt, vt apium, ruta, anethum, ocymum, menta, hyssopum, anesum, coriandrum, nasturtium, cruca, fœniculum. Præter hæc asparagus, capparis, nepeta, thymum, satireia, lapsana, pastinaca, magisq; agrestis, radícula, siser, cepa. Ex venatione maxime lepus, vinum tenue, piper & rotundum & longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei.

Quæ res somnum moueant, aut sensus excitent. C A P. XXXII.

Somno verò aptum est papauer, lactuca, maximeq; æstiuæ, cuius cauliculus iam lacte repletus est, morum, porrum. Sensus excitant nepeta, thymum, satireia, hyssopum, præcipueq; pulegium, ruta & cepa.

Quæ

Quæ res corpus aut erodant, aut reprimant,
aut refrigerent, aut calefaciant, aut du-
rent, aut emolliant. C A P. XXXIII.

EVocare verò materiam multa admodum
possunt. Sed ea quæ ex peregrinis medica-
mentis maxime constant, alijsq; magis quàm
quibus ratione victus succurritur, opitulantur,
in presentia differã. Ponam ea verò, quæ prom-
pta, & his morbis (de quibus protinus dictu-
rus sum) apta corpus erodunt, & sic ex eo, quod
mali est, extrahunt. Habent autem hanc facul-
tatem semina erucæ, nasturtij, radiculæ, præci-
pue tamen omnium sinapi. Salis quoque & fici
eadem vis est. Leniter verò simul & reprimunt

vel ace- & molliunt lana succida ex aceto vel vino,
to vel vi- cui oleum adiectum est, contrita palmulæ, furfu-
no, quo res in salsa aqua, vel aceto decocti. At simul re-
oleu adi. primunt, & refrigerant, herba muralis, parthe-

Herba san-
guinalis.

gium, ocymum, herba sanguinalis, quam Græci
πολύγονον vocant, portulaca, papaveris folia, ca-
preoliq; vitium, coriandri folia, hyoscyamũ, mu-
scus, siser, apium, solanum, quàm ῥύχνον Græci
vocant, brassicæ folia, intubus, plantago, fœnicu-
li semen, contrita pira vel mala, præcipueq; cy-
donia, lenticula, aqua frigida, maximeq; plu-
uialis, vinum, acetum, & ex horum aliquo ma-
gis, madens vel panis, vel farina, vel spongia,
vel cinis, vellana succida, vel etiam linteolum,
creta cumolia, gypsum, melinum, myrteum, rosa,
acerb

acerbum oleum, verbenarum contusa cum teneris caulibus folia, cuius generis sunt olea, cypressus, myrtus, lentiscus, tamaris, ligustrum, rosa, rubus, laurus, hedera, punicum malum. Sine frigore autem reprimunt cocta mala cydonia, malicorium, aqua calida, in qua verbenæ coctæ sunt, quas supra proposui, pulvis velex fecerini, velex myrti folijs, amara nuges. Calefacit verò ex qualibet farina cataplasma, siue ex tritici, siue ex farri, siue hordei, siue erui, vel lolij, vel milij, vel panici, vel lenticule vel fabæ, vel lupini, vel lini, vel sæni græci, ubi ea deserbuit, calidâq; imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quàm ex aqua cocta. Præterea cyprinum, irinum, medulla, adeps ex felle iuncta oleo, magisq; si vetus est, sal, nitrû, git, piper, quinquefolium, fereq; quæ vehementer & reprimunt, & refrigerant. Durant quæ calefaciunt & digerunt, & emolliunt. Præcipueq; ad emolliendû potest cataplasma ex lini vel sæni græci semine. His autem omnibus & simplicibus & permixtis variè medici vtuntur, ut magis quid quisq; persuasit sibi appareat, quàm quid euidenter cõperit.

h LIB

LIBER III.

De morborum generibus.

CAP. I.



PROVISIS omnibus, que pertinent ad vniuersa genera morborū, ad singulorum curationes veniam. Hos autem in duas species Græci diuiserunt, aliosq; ex his acutos, alios longos esse dixerunt. Ideoq; quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdem alij inter acutos, alij inter longos retulerunt. Ex quo plura eorum genera esse manifestum est. Quidam enim breues utique sunt, qui cito vel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur. Quidam longi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque exitium est. Tertiumq; genus eorum est, qui modò acuti, modò longi sunt. Idq; non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est, sed in alijs quoque fit. Atque etiam præter hos, quartum est, quod neq; acutum dici potest, quia non perimit: neque utique longum, quia si occurritur, facile sanatur. Ego cum de singulis dicam, cuius quisque generis sit, indicabo. Diuidam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, & eos qui oriuntur in partibus. Incipiā à prioribus, pauca de omnibus præfatus. In nullo quidem morbo minus fortuna sibi vendicare, quam
 *fortuna ars potest, utpote cum repugnante natura, nihil medicina proficiat. Magis tamē ignoscendum medico est parum proficienti in acutis morbis,

bi, quàm in longis. Hic enim breue spatium est, intra quod si quod auxilium non profuit, ager extinguitur. Ibi & deliberationi & mutationi remediorum tempus patet, adeo ut rarò, si inter initia medicus accessit, obsequens ager sine illius vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quò vetustior est, longus autem quò recentior, eò facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet, quòd non omnibus aegris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi autores, quasi sola vendicauerint, prout cuique cesserant. Oportet itaque ubi aliquid non respondit, non tanti putare autorem, quanti aegrum, & experiri aliud atque aliud. Sic tamen, ut in acutis morbis citò mutetur, quod nihil prodest: in longis, quos tempus ut facit, sic etiam soluit, non statim condemnatur, si quid non statim profuit. Minus verò remoueat, si quid paulum saltem iuvat, quia profectus tempore expletur.

Quomodo morbi cognoscantur, & an incrementum, an constant, an minuantur: & qua ratione ab initio, qui languere incipit, curari debeat.

CAP. II

Protinus autem inter initia scire facile est, quis acutus morbus, quis longus sit: non in his solis in quibus semper ita se habet, sed in his quoque in quibus variat. Nam ubi sine intermissionibus accessiones & dolores graues

h 2

urgent

vrget, acutus morbus est. Vbi lenti dolores, len-
 taue febres sunt, & spatia inter accessiones por-
 riguntur, acceduntq; ea signa, quæ in priore vo-
 lumine exposita sunt, longum hunc futurum esse
 manifestum est. Videndum etiam est, morbus
 an increseat, an consistat, an minuat, quia
 quedam remedia incrementibus morbis, plura
 inclinantibus conueniunt. Ea q; quæ decrescen-
 tibus apta sunt, vbi acutus increescens vrget, in
 remissionibus potius experienda sunt. Increscit
 autem morbus, dum grauiore dolores accessio-
 nes q; veniunt, hæq; & antè quàm proximæ re-
 uertuntur, & postea desinunt. Atque in longis
 quoq; morbis etiam tales notas non habentibus,
 scire licet increescere, si somnus incertus est, si
 deterior concoctio, si sædiore deiectiones, si
 tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit cor-
 pus frigus aut calor, si idem magis pallet. Ea ve-
 rò quàm contraria his sunt, decedentis eius no-
 te sunt. Præter hæc in acutis morbis serius eger
 alendus est, nec nisi iam inclinatis, vt primò
 dempta materia impetum frangat. In longis ma-
 * aduentu turius, vt sustinere spatium & affecturi mali
 ri possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed
 in parte est, magis tamen ad rem pertinet vim
 totius corporis molliri, quàm propriæ partes
 agræ sanentur. Multum etiam interest, ab ini-
 tio quis recte curatus sit, an perperam, quia cu-
 ratio minus his prodest, in quibus assiduè fru-
 stra fuit. Si quis temere habitus, adhuc integris
 virib

viribus viuit, admota curatione momento resti-
tuitur. Sed cum ab his cœperim, quæ notas quas-
dam future aduersæ valetudinis exhibent, cura-
tionum quoque principium ab animaduersione
eiusdem temporis faciam. Igitur si quid ex his
quæ proposita sunt, incidit, omnium optima sunt,
quies, & abstinentia. Si quid bibendum, aqua.
Idq; interdum vno die fieri satis est. Interdum,
si terrentia manent, biduo. proximeq; absti-
nentiam sumendus est cibus exiguus, bibenda
aqua, postera die etiam vinum, deinde inui-
cem alternis diebus, modò aqua, modò vinum,
donec omnis causæ metus finiatur. Per hæc enim
sepe instans grauis morbus discutitur. Pluri-
miq; falluntur, dum se primo die protinus subla-
turos languorem, aut exercitatione, aut balneo,
aut coacta deiectione, aut vomitu, aut sudatio-
nibus, aut vino sperant. Non quo non interdum
id incidat, aut non decipiat, sed quò sæpius fal-
lat, solaq; abstinentia sine vllò periculo medea-
tur. Cum præsertim etiam pro modo terroris mo-
derari liceat, & si leuiora indicia fuerint, satis
sit à vino tantum abstinere: quod subtractum,
plus quàm si cibo aliquid dematur, adiuvat: si
paulò grauiora, facile sit, non aquam tantum bi-
bere, sed etiam cibo carnem subtrahere. Interdum
panis quoq; minus quàm pro consuetudine assu-
mere, humidoq; cibo esse contentum, & olerè po-
tissimum. Satisq; sit tum ex toto à cibo, à vino,
ab omni motu corporis abstinere, cum velle-

mentes nota terruerunt. Neque dubium est quin
vix quisquam, qui non dissimulauit, sed per hæc
mature morbo occurrit, agrotet.

De Februm generibus.

C A P. III.

A Tque hæc quidem sanis facienda sunt, tan-
tum causam metuentibus. sequitur verò
curatio febrili, quod & in toto corpore, & vul-
gare maxime morbi genus est. Ex his una quo-
tidiana, altera tertiana, altera quartana est. In-
terdum etiam longiore circuitu quædã redeunt,
sed id raro euenit. In prioribus & morbi sunt,
& medicina. At quartane quidem simplicio-
res sunt. Incipiunt fere ab horrore, deinde calor
erumpit, finitaq; febre biduum integrum est, ita
quarto die reuertitur. Tertianarum verò duo
genera sunt. Alterum eodem modo quo quarta-
na & incipiens & desinens, illo tantum inter-
posito discrimine, quod vnum diem præstat
integrum, tertio redit. Alterum longe pernicio-
sius, quod tertio quidem die reuertitur, ex octo
autẽ & quadraginta horis, fere sex & triginta
per accessionem occupat, interdum etiam vel mi-
nus vel plus, neq; ex toto in remissione desistit,
sed tantum lenius est. Id genus pleriq; medici he-
mitritæon appellat. Quotidiana verò variæ sunt,
Frigus. & multiplices. Aliæ enim protinus à calore in-
cipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus vo-
Horror. co, ubi extremæ partes membrorum inalgescunt:
horror

horrorē, ubi totum corpus intremittit. Rursus alie sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas: alie sic, ut aliquantum quidem minuat ex febre, nihilominus tamen quedā reliquie remaneant, donec altera accessio accedat, ac saepe alie vix quicquam, aut nihil remittant, sed ita ut continuent. Deinde alie feruorem ingentem habent, alie tolerabilem, alie quotidie pares sunt; alie impares, atq; inuicem altero die leniores, altero vehemētiores, alie tēpore eodem postridie reuertuntur, alie vel serius vel celerius, alie diem non Elemq; accessionē et decessionē implent, alie minus, alie plus, alie cum decedūt sudorē mouent, alie non mouent: atq; aliās per sudorem ad integritatem venit, aliās corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam, modō singule singulis diebus fiunt, modō binæ, plures re concurrunt. Ex quo saepe euenit, ut quotidie plures accessiones, remissionesq; sint. Sic tamen ut vnaqueq; alicui priori respondeat. Interdum verō accessiones quoq; confunduntur, sic ut notari neq; tempora earum, neque spatia possint. Neq; verum est, quod dicitur a quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex vlcere. Faciliior enim semper curatio foret, si hoc verum esset. Sed quod euidentes causse faciunt, facere etiam abditæ possunt. Neq; de re, sed de verbo controuersiam mouent. Qui cum aliter aliterq; in eodē morbo febres accedant, non easdē inordinate re-

b 4 dire,

dire, sed alias, aliasq; subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiam si verè diceretur. Tempora quoq; remissionum modò liberalia, modò rix vlla sunt.

De curationū diuersis generibus. CAP IIII.

ET febrium quidem ratio maxime talis est. Curationū verò diuersa genera sunt, prout autores aliqui habēt. Asclepiades officium esse medici dicit, vt tutò, vt celeriter, vt iucunde curet. Id notum est, sed ferè periculosa esse nimiū, & festinatio & voluptas solet. Qua verò moderatione vtendū sit, vt quantum fieri potest omnia ista cōtingant, prima semper habita salute in ipsis partibus curationū considerandū erit. Et ante omnia queritur, primis diebus ager qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eò quòd cruditatē maxime horrebant: deinde eam materiam, quæ ledere videbatur, ducēdo sepius aluum subtrahēbant. Asclepiades medicamenta sustulit, aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. Febre verò ipsa præcipuè se ad eius remedium vtī professus est. Conuellendas enim vires ægri putauit, luce, vigilia, siti ingenti: sic, vt ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur, qui per omnia iuncundam eius disciplinam esse contendunt. * His enim vltioribus quidem diebus cubātis etiam luxuriæ subscripsit: primis verò tortoris vicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones,

* Et is e-
nim

potiones, & aliud duci non nisi raro debere, con-
 cedo. Et id non ideo tamen agendum, ut agri vi-
 res conuellantur, existimo: quoniam ex imbecil-
 litate summum periculum est. Nilui ergo tan-
 tam materiam superatam oportet, quæ naturali-
 ter* digeritur, ubi nihil noui accedit. Itaq; abs- * detra-
 tinendus à cibo primis diebus est, in luce haberi hatur
 dus aeger, nisi infirmus interdum est, quoniam
 corpus ista quoq; digerit, isq; cubare quam ma-
 ximo conclauì debet. Quod ad sitim verò so-
 mnusq; pertinet, moderandum est, ut interdum
 vigilet: noctu, si potest, conquiescat: ac neq; po-
 tet, neq; nimium siti crucietur. Os etiam eius e-
 lui potest, ubi & siccum est, et ipsi sœtet, quam-
 uis id tempus aptum potioni non est. Commodeq;
 Erasistratus dixit, sæpe inferiore parte humo-
 rem non requirente, os & fauces requirere, neq;
 ad rem male haberi agrum pertinere. Ac primò
 quidem sic tenendus est. Optimum verò medi-
 camentum est, opportunè cibus datus, qui quan-
 do primum dari debeat, queritur. Plerique ex
 antiquis tarde dabant, sæpe quinto die, sæpe sex-
 to, & id fortasse vel in Asia, vel in Aegypto
 cœli ratio patitur. Asclepiades ubi agrum tri-
 duo per omnia fatigarat, quarto die cibo desti-
 nabat. At Themison nuper, non quando cœpisset
 febris, sed quando desisset, aut certè lenata
 esset, considerabat, & ab illo tempore expectato
 die tertio, si non accesserat febris, statim: si acces-
 serat, ubi ea vel desierat, vel si assidue inhiere-
 h 5 bat,

bat, si certè se inclinauerat, cibum dabat. Nihil autem horum utiq; perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto, potest post vnā accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale cœlum, quæ ætas, quod tempus anni. Minimeq; in rebus multum inter se differentibus, quod intermittendum non est, perpetuum esse præceptum temporis potest. In morbo qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est, itemq; eo cœlo, quo magis digerit. Ob quam causam in Aphrica, nullo die æger abstinere recte videtur. Maturius etiam puero, quàm iuueni, æstate, quàm hyeme dari debet. Vnum illud & semper & ubiq; seruandum est, vt ægri vires subinde assidens medicus inspicat, & quamdiu supererunt, abstinentia pugnet: si imbecillitatem vereri cœperit, cibo subueniat. Id enim eius officium est, vt ægrum neq; superuacua materia oneret, neq; imbecillitatem

*fami *fame perdat. Idq; apud Erasistratum quoq;
 prodat inuenio, qui quamuis parum docuit, quādo venter, quando corpus ipsum exinaniiretur, dicendo tamen hac esse visenda, et tum cibum dandum, cum corpori deberetur: satis ostendit, dum vires superessent, dari non oportere: ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest ab vno medico multos non posse curari, cumq; (si artifex est) idoneum esse, qui non multum ab ægro

gro recedit. Sed qui quæstui seruiunt, quoniam
is maior ex populo est, libenter amplectuntur ea
præcepta, quæ sedulitatem non exigunt, ut in
hac ipsa re. Facile est enim dies, vel accessiones
numerare his quoq; qui ægrum rarò vident. ille
assideat necesse est, qui quod solum opus est, vi-
surus est, quando nimis imbecillus futurus sit,
nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad ini-
tium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit.

Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio, Dies impa-
res.
quoniam antiqui potissimè impares sequeban-
tur, eosq; , tanquam tunc de agris iudicaretur,
ægrorum nominabant. Hi erant dies tertius,
quintus, septimus, nonus, undecimus, quartus-
decimus, unus & vigesimus, ita ut summa po-
tentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni
& vigesimo daretur. Igitur sic agros nutrie-
bant, ut dierum imparium accessiones expecta-
rent, deinde postea cibum quasi leuioribus ac-
cessionibus instantibus darent, adeo ut Hippo-
crates, si alio die febris desisset, recidiuam timere
sit solitus. Id Asclepiades iure ut vanum repu-
diavit, neq; in ullo die, quia par, imparue esset,
his vel maius, vel minus periculum esse dixit.
Interdum enim peiores dies pares fiunt, & op-
portunius post earum accessiones cibus datur.
Nonnunquam etiam in ipso morbo, dierum ratio
mutatur, fitq; grauior, qui remissior esse consue-
uerat, atq; ipse quartusdecimus par est, in quo
esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum
octauum

octauum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius numerus inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octauum, neq; decimum, neq; duodecimum diem sumendum quasi potentiores. Plus enim tribuebant nono & undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab undecimo non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem, ei quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse grauissimum. Ita illo quoq; autore in die pari & grauior febris esse potest, & certa futuri nota. Atq; idem alio loco quartum quemq; diem, ut in utrumq; efficacissimum apprehendit, id est, quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum, in quo & ab impari ad paris rationem transit: & ne hoc quidem propositum conseruauit, cum à septimo die undecimus, non quartus, sed quintus sit: adeo apparet quacunq; ratione ad numerum respeximus, nihil rationis sub illo quidem autore reperiri. Verum in his quidē antiquos tunc celebres admodum Pythagorici numeri fesellerunt, cum hic quoq; medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri, & ex his coniectare, quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet, scire, tum ne oporteat dari, cum iam bene venæ conqueuerunt, aut etiam num manentibus reliquis febris. Antiqui enim quàm integerrimis corporibus alimentum offerebant. Asclepiades incli-
nata

Sed si octauus primi naturam habet: undecimus quartus, non quintus erit.

nata quidem febre, sed adhuc tamen inherente.
 In quo^{*} vanam rationē secutus est, non quò non^{*} *vanam*
 sit interdum maturius cibus dandus, si mature
 timetur altera accessio: sed quò scilicet quàm sa-
 nissimo dari debeat. Nilinus enim corrumpitur
 quod integro corpori infertur. Neq; tamen^{*} *re-* ^{*}*non va-*
 rum est, quod Themisoni videbatur, si duabus *num est*
 horis integer futurus esset ager, satius esse tunc
 dare, vt ab integro corpore potissimum diduce-
 retur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset
 optimum. Sed cum hoc breue tempus nò præstet,
 satius esse principia cibi à decedente febre quàm
 reliquias ab incipiente excipi, ita, si longius tem-
 pus secundum est, quàm integerrimo dandus
 est: si breue, etiam antequàm ex toto integer fiat.
 Quo loco verò integritas est, eodem est remissio,
^{*}*que maxime in febre continua potest esse.* At ^{*}*siqua*
 hic quoq; queritur, vtrum tot horæ expectandæ
 sint, quot febrem habuerunt, an satis sit, primam
 partem earum præteriri, vt aegris iucundius in-
 sidat, quibus interdum non vacat. Tutissimum
 est autem ante totius accessionis tempus præter-
 ire, quamuis vbi longa febris fuit, potest indul-
 geri egro maturius, dum tamen ante minime
 pars dimidia prætereatur. Idq; non in ea sola fe-
 bre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus
 ita seruandum est.

De febrium speciebus, & singularum curatio-
 nibus: & primò, quando cibus febricitan-
 tibus dandus sit.

CAP. V.

Hæc

Hæc magis per omnia genera febrium perpetua sunt, nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desit, eaq; vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex aestu, alia' ve simili re fuit, sic ut interior nulla causa metum fecerit, postero die cum tempus accessionis ita transijt, ut nihil mouerit, cibus dari potest. At si ex alto calor venit, & grauitas vel capitis vel præcordiorum secuta est, neq; apparet quid corpus considerit, quamuis vnâ accessionem secuta integritas est, tamen quia tertiana timeri potest, expectandus est dies tertius: & ubi accessionis tempus præterijt, cibus dandus est, sed exiguus, quia quartana quoq; timeri potest. Et die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia vtendum. Si verò postero, tertio' ve, aut quarto die secuta febris est, scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quartanarūq;, quarum & certus circuitus est, & finis integer, & quia liberaliter quæta tempora sunt, expeditior ratio est: de quibus suo loco dicam. Nunc verò eas explicabo, quæ quotidie vrgent. Igitur tertio quoq; die cibus agro commodissime datur, ut alter febrem minuat, alter viribus subueniat. Sed his dari debet, si quotidiana febris est, quæ ex toto desinat, simul atq; corpus integrū factum est. si quamuis nō accessiones, febres tamen iunguntur, & quotidie quidē increscūt, sed sine integritate tamē remittunt, cum corpus ita se habet, ut maior remissio nō expectetur.

Etetur. Si altero die grauior, altero leuior accessio
 est, post grauiorem. Ferè verò grauiorè accessio-
 nem leuior nox sequitur: quò sit, ut grauiorè ac-
 cessione nox quoq; tristior antecedit. At si con-
 tinuatur febris, neq; leuior unquã sit, & dari ci-
 bum necesse est, quãdo dari debeat, magna quidẽ
 dissensio est. Quidam, quia ferè remissius matu-
 tinum tẽpus agris est, tunc putant dandũ. Quod
 si respondet, non quia mane est, sed quia remis-
 sio est agris, dari debet. Si verò ne tunc quidem
 ulla requies agris est, hoc ipso peius id tempus
 est, quòd cum sua natura melius esse debeat, mor-
 bi vitio non est, simulq; insequitur tẽpus meri-
 dianum: à quo cum omnis ager ferè peior fiat,
 timeri potest, ne ille magis etiam, quàm ex con-
 suetudine vrgeatur. Igitur alij vespere tali agro
 cibum dant. Sed cum eo tempore ferè pessimi
 sint, qui egrotant, verendum est, ne si quid tunc
 mouerimus, fiat aliquid asperius. Ob hæc ad me-
 diam noctem decurro, id est finito iam grauis-
 simo tempore, eodemq; longissimè distante, secu-
 turis verò antelucanis horis, quibus omnes ferè
 maximè dormiunt: deinde matutino tempore,
 quod natura sua lenissimum est. Si verò febres Febres va-
 vagæ sunt, quia verendum est, ne cibum statim gæ.
 subsequantur, quandocumq; quis ex accessione
 lenatus est, tunc debet assumere. At si plures * hunc
 accessiones eodem die veniunt, considerare oportet,
 pares ne per omnia sint, (quod vix fieri po-
 test) an impares. Si per omnia pares sunt, post
eam

eam potius accessionem cibus dari debet, quæ non inter meridiem & vespere definit. Si impares sunt, considerandum est, quo distent. Nam si altera grauior, altera leuior est, post grauiorẽ dari debet: si altera longior, altera breuior, post longiorem: si altera grauior, altera longior est, considerandum est, vtra magis affligat, illa vi, an hæc tempore, & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest, quanta, qualesq; inter eas remissiones sint. Nã si post alteram febrem motio manet, post alteram integrum corpus est: integro corpore, cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet, sed alterum tamen longius tempus remissionis est, id potius eligendum est, adeo vt vbi accessiones continuantur, protinus inclinata priore dandus cibus sit. Etenim perpetuum est, ad quod omne cõsiliũ dirigi potest, cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere, & hoc saluo, dare quàm integer-rimo corpori. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed cum sit aptissimum tertio quoq; die cibum dare, tamen si corpus infirmum est, quotidie dandus est: multoq; magis si continentes febres sine remissione sunt, quanto magis corpus affligunt, aut si due plures'ue accessiones eodem die veniunt. Quæ res efficit, vt & à primo die protinus cibus dari quotidie debeat. Si protinus venie conciderunt, & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud
tamen

tamen in his seruandum est, vt post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cum verò febris incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur, scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita: deinde cum decessio eius consistit: tertium si necesse est, quandoque decedit, cetera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas vrget, satius esse consistente iam incremento febris aliquid offerre, quàm increscente. Satius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen, vt nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque Hercule satis est, ipsis tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, & ad eum dirigere curationem, seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam mali affectus interueniunt. Cum verò semper agros securos agere conueniat, vt corpore tantum, non etiam animo laborent, tum precipuè, vbi cibum sumpserunt. atque si qua sunt, quæ exasperatura eorum animos sunt, optimum est, * ea dum agrotant eorum * eadem notitiæ subtrahere. Si id fieri non potest, sustine- agrotan- re tamen post cibum vsque somni tempus, & tium no- cum experrectis sunt, tum exponere. titiæ sub.

Quanto poriones febricitantibus dari expediat.

CAP. VI.

Sed de cibo facilior quidem cum agris ratio est, quorum sæpe stomachus hunc respuit, etiam si mens concupiscit. De portione verò in-

i

gens

gens pugna est, eoq; magis, quo maior febris est. Hec enim sitim accedit, et tum maxime aquam exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus aeger est, ubi febris conquieverit, protinus sitim quoq; quieturam, longioremq; accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum. Ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Neesse est tamen quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis aegris in potione, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet, nisi subito sic venae conciderunt, ut cibus quoq; dari debeat. Secundo verò, ceterisq; etiam, quibus cibus non dabitur, tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heraclide Tarentino dictum ratione caret, ubi aut bilis agra, aut cruditas male habet, expedire quoq; per medicas potiones misceri novam materiam corruptæ. Illud videndum est, ut qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoq; : ubi sine illo datur, delignantur, aut cum agrum dormire cupiemus. Quod ferè sitis prohibet. Satis autem convenit, cum omnibus febricitantibus, nimius humor alienus sit, tum præcipue esse sceminis, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cum tempora cibo potioniq; febris & remissionis ratio det, non est expeditissimū scire quando aeger febricitet, quando melior sit, quando deficiat. Sine quibus dispensari illa non possunt.

Venarum pulsus. Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei, quia sæpe istæ leniores, celeriores'ne sunt, & atate

etate & sexu, & corporum natura. Et plerunq;
 satis sano corpore, si stomachus infirmus est, non-
 nunquam etiam incipiente febre subeunt et qui-
 escunt, ut imbecillus is videri possit, cui facile
 laturo grauis instat accessio. Contra sepe eas
 concitat, & resoluit sol, & balneum, & exerci-
 tatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi
 affectus, adeo, ut cum primum medicus venit,
 sollicitudo ægri dubitantis quomodo ille se habe-
 re videatur, e. is moueat. Ob quam causam peri-
 ti medici est, non protinus ut venit apprehendere ^{Officium}
 manu brachium, sed primum residere hilari uul- ^{medici.}
 tu, percunctariq; quemadmodum se habeat, & si
 quis eius metus est, eum probabili sermone leni-
 re, tum deinde eius corpori manum ad mouere.
 Quis venas autem conspectus medici mouet,
 quam facile mille res turbant. Altera res est, cui
 credimus calor, æque fallax. Nam hic quoq; ex-
 citatur æstu, labore, somno, metu, solitudine.
 Igitur intueri quidem etiam ista oportet. Sed his
 non omnia credere, ac protinus quidem scire non
 febricitare eum, cuius venæ naturaliter ordinatæ
 sunt, teporq; talis est, qualis esse sanis solet. Non
 protinus autē sub calore motuq; febrem sese con-
 cipere, sed ita, si summa quoq; arida inæqualiter
 cutis est, si calor et in fronte est, & ex*imis pr.c- *intimis
 cordis oritur, si spiritus ex naribus cum feruore
 prorumpit, si color aut rubore, aut pallore nouo
 mutatus est, si oculi graues, & aut persicci, aut
 subhumidi sunt, si sudor cum fit, inæqualis est, si
 i 2 vene

venae non aequis intervallis moventur. Ob quam causam medicus neq; in tenebris, neq; à capite aegri debet residere, sed illustri loco aduersus eum, ut omnes notae ex vultu quoq; cubantis perspiciat. Vbi verò febris fuit, atq; decreuit, expectari oportet, num tempora, partesue corporis aliae paulum madescant, quae sudorem venturum esse testentur. Ac si qua nota est, tunc demum dare potius calidam aquam, cuius salubris effectus est, si sudorem per omnia membra diffundit. Huius autem rei causa continere aeger sub veste satis multa manus debet, eademq; crura, pedesq; contegere, qua male plerique egros in ipso impetu febris, pessimeq; ubi ardens ea est, male habent. Si sudare corpus coepit, linteum tepescere oportet, paulatimq; singula membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est, aut si is non venit, ubi quam maxime potuit, idoneus esse cibo aeger videtur, sub veste leniter unguendus est, tum detergendus, deinde ei cibus dandus. Cibus autem febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certe quam proximus, utiq; ex materia quam leuissima, maximeq; sorbitio, eaq; si magnae febres fuerunt, quam tenuissima esse debet. Mel quoq; despumatum huic recte adicitur, quo corpus magis nutriatur: sed id, si stomachum offendit, superuacuum est, sicut ipsa quoq; sorbitio. Dari verò in vicem eius potest, vel intrita ex aqua calida, vel alica elota, si firmus est stomachus: & compressa aluus ex aqua mulsa: si vel ille languet, vel

vel hæc profluit, ex posca. Et primo quidem cibo ita satis est: secundo verò aliquid adijci potest, ex eodẽ tamen genere materiae vel olus, vel conchylium, vel pomum. Et dum febres quidem increscunt, hic solus idoneus cibus est. Vbi verò aut desinunt, aut leuantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima: adijciendum verò aliquid ex media, ratione habita subinde & virium hominis & morbi. Ponendi verò agro varij cibi (sicut Asclepiades praecepit) tum demum sunt, vbi fastidio vrgetur, neq; satis vires sufficiunt, vt paulum ex singulis degustando famem vitet. At si neq; vis, neq; cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus ager est, ne plus assumat, quàm concoquat. Neq; verum est, quod ab eo dicitur, facilius concoqui cibos varios: eduntur enim facilius, ad concoctionẽ autem materiae, genus & modus pertinent. Neque inter magnos dolores, vt neq; crescente morbo tutũ est agrũ cibo impleri, sed vbi inclinata iam in melius valetudo est. Sunt aliae quoq; observationes in febribus necessariae, atque id quoq; videndum est, quod quidam solum praecipunt, an astrictum corpus sit, an profluat: quorũ alterum strangulat quod continet, alterum digerit. Nam si astrictum est, ducenda aluius est, mouenda vrina, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest.

dest. Vtile est etiam ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaq; aqua fouere inguina, interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere, uti cibo rarius & serius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximeq; oleribus, qualia sunt, lapathum, urtica, malua, vel iure etiam concharum, masculorum ue, aut locustarum, neq; danda caro, nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc ultra quam sitis coget. Poteritq; à balneo etiam pinguius aut dulcius dari vinum, poterit semel aut bis interponi Græcum salsum. Contrà verò si corpus profluat, sudor coercendus, quies adhibenda erit, tenebris, somnoq; quandocunq; volet utendum, non nisi leui gestatione corpus agitandum, & pro genere mali subueniendum. Nam si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decreuit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, & vomere cogere, nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut uetus morbus est. Si vero sudor exercet, duranda cutis est vel nitro, vel sale, quæ cum oleo miscentur. At si leuius id vitium est, oleo corpus ungendum est: si vehementius, rosa vel melino, vel myrteo, cui vinum austerum sit adiectum. Quisquis autem fluore aeger est, cum venit in balneum, prius ungendus, deinde in solium demittendus est. Si incute uitium est, frigida quoque, quam calida aqua melius utetur. Vbi ad cibum ventum est,
dari

dari debet is valens, frigidus, siccus, simplex, qui quàm minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum asperum, vel certè subausterrum. Si venter profluit, calidum: si sudores nocent, vomitusq; sunt, frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant.

C A P. VII.

DEsiderat etiam propriam animaduersionem in febribus pestilentie casus. In hanc minime vtile est, aut fame, aut medicamentis vti, aut ducere aluum. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimum est, precipueq; si cum dolore febris est. Si id parum tutum est, vbi febris aut tenuata est, aut leuata est, vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quàm in alijs morbis, ducere in balneum opus est, vinum calidum & meracius dare, & omnia glutinosa. Inter quæ quoque carnem generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate rapienda sunt. Quòd si puer est qui laborat, neq; tantum robur eius est, vt sanguis mitti possit, siti ei vtendum est, ducenda aluus, vel aqua, vel ptisanæ cremore, tum denuum is leuibus cibis nutriendus. Et ex toto, non sic pueri, vt viri curari debent. Ergo, vt in alio quoque genere morborum, parcius in his agendum est. Non facile sanguinem mittere, non facile ducere aluum, non cruciare vigilia, fame'ue, aut nimia siti, non uino curare satis conuenit. Vomitus post febrem eliciendus est, deinde

i 4 dand

dandus cibus ex leuissimis, tum is dormiat: postero quoque die si febris manet, abstineatur. Tertio ad similem cibum redeat. Dandaq; opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibosq; opportunos, obmissis ceteris nutriatur. Si vero ardens febris extorret, nulla medicamenti danda potio est, sed in ipsis accessionibus, oleo & aqua refrigerandus est, quæ miscenda manu sunt donec albescant, & conclauui tenendus, quò multum & purum aërem trahere possit, neq; multis vestimentis strangulandus, sed admodum leuibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia uitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est, alendus maturius est, id est, à die tertio, & ante cibum ipsdem perungendus. Si pituita in stomacho coit, inclinata iam accessione, vomere cogendus est, & tunc dandum frigidum olus, aut pomum ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus protinus vel ptisana, vel alica, vel oryzae cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum vero in summo incremento morbus est, utiq; non ante diem quartum magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiam ultra satietatem: & cum iam venter & præcordia ultra modum repleta, satisq; refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida tantum ad satietatē data pro medicamento vtuntur. Vbi utrumlibet factum est,

est, multa veste operiendus est, & collocandus ut dormiat. Fereq; post longam sitim & vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur, idq; praesentissimum auxilium est. Sed in his tamen, in quibus praeter ardorem, nulli dolores, nullus praecordiorum tumor, nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus, non ulcus, non deiection, non profluvium alui fuit. Si quis autem in huiusmodi febre leviter tussit, is neq; vehementi sibi conflictatur, neq; bibere aquam frigidam debet, sed eo modo curandus est, quo in ceteris febribus praecipitur.

Curatio semitertianae febris, quae hemitriticos dicitur. CAP. VIII.

A Trbi id genus tertianae est, quod hemitriticon Medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerunq; frequentiores accessiones, decessionesq;, ut aliud morbi genus uideri possit: porrigitq; febris inter horis vigintiquatuor et triginta sex, ut quod idem est, non idem esse videatur. Et magnopere necessarium est, neq; dari cibum, nisi in ea remissione, quae vera est: & ubi ea uenit, protinus dari, plurimiq; sub alterutro curantis errore subito moriuntur: ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet, tum dari cibus, qui neq; incitet febre, & tamen longum eius spatium sustineat.

N Curatio lentarum febrium CAP. IX.
Omnunquam etiam lentae febres sine ulla
i s remiss

remissione corpus tenent, ac neq; cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet. Fortasse enim curationi opportunior fiet. Sape igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius pertractandum est, quoniam interdum sic euenit, ut horror oriatur, & fiat initium quoddam noui motus, exq; eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoq; ex oleo & sale salubris uidetur. At si diu frigus est & torpor, & iactatio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, uel cum cibo uinum bene dilutum. Intenditur enim saepe ex eo febris, & maior ortus calor, simul & priora mala tollit, & spem remissionis in ea curatione ostendit. Neque hercules ista curatio noua est, qua nunc quidam traditos sibi egros (qui sub cautiore medicis trahebantur) interdum contrarijs remedijs sanant. Siquidem apud antiquos quoq; ante Herophilum & Erasistratum, maximeq; post Hippocratem fuit* *πέτρω* quidam, qui febricitantem hominem, ubi acceperat, multis uestimentis operiebat, ut simul calorem ingentem, sitimq; excitaret. Deinde ubi paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui dabat: ac si mouerat sudorem, explicuisse se egro iudicabat: si non mouerat, plus etiam aquae frigidae ingerebat, & tum uomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat, protinus suillam assam, & uinum homini dabat. Si non liberauerat, decoq

decoquebat aquam sale adiecto, eamq; bibere cogebat, ut mouendo ventrem purgaret. Et intra hæc omnis eius medicina erat. Eaq; non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores non refecerant, quam nunc est his quos Herophili, vel Erasistrati æmuli, diuturnos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina, quia plures, si protinus à principijs excepit, interemit. Sed cum eadem omnibus conuenire non possint, ferè quos ratio non restituit, temeritas adiuvat. Ideoq; eiusmodi medici melius alienos ægros, quam suos nutriunt. Sed est circumspecti quoq; hominis, & nouare interdum, & augere morbum, & febres accendere, quia curationem ubi id quod est non recipit, potest recipere id quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, & præcordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabritiem linguæ.

C A P. X.

Considerandū etiam est febres ne solæ sint, an alia his quoque mala accedant: id est, num caput doleat, num lingua aspera, num præcordia intēta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, & in id ingerere, deinde habere duo pitacia, quæ latitudinem frontis longitudinemq; æquent. Ex his inuicem alterum in aceto & rosa habere, alterū in fronte, aut intinctā iisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit, pura rosa utendum est. Si rosa ipsa ledit, oleo acerbo: si ista parū iuuant, teri potest
vel

vel iris arida, vel nuces amarae, vel qualibet herba ex refrigerantibus. Quorum quilibet ex aceto impositum dolorem minuit, sed magis aliud in alio. Iuuat etiam panis cum papauere iniectus, vel cum rosa, cerussa, spuma uel argenti. Ol facere quoque vel serpyllum, vel anethum non alienum est. At si in praecordijs inflammatio et dolor est, primo superimponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint, plus eò materia concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit, tunc demum ad calida et humida veniendum est, ut ea quae remanserint, discutiant. Notae verò inflammationis sunt quatuor, rubor et tumor, cum calore et dolore. Quo magis errauit Erasistratus, qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est. Hunc enim statim ipsa febris soluit. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantum praecordiorum dolor est, protinus calidis et siccis fomentis uti licet. Si verò lingua sicca est, et scabra, detergenda primum penicillo est ex aqua calida. Deinde ungenda mistis inter se rosa et melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterisa est, ungi rosa debet, cui cera sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febrem praecedat.

C A P. X I.

Solet etiā ante febres esse frigus, idque vel molestissimum morbi genus est. Vbi id expectatur,

tur, omni potione prohibendus agere est. Hæc enim paulo antè data multum mali adiicit. Item maturius veste multa tegendus est: admouenda partibus his, pro quibus metuimus, sicca & calida fomenta, sic, ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim increcant. Perfri-candæ quoq; eæ partes manibus vnclis ex vete-re oleo sunt, eiq; adijciendum aliquid ex calefa-cientibus. Contentiq; medici quidã vna frictione etiam ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissionibus, nonnulli tres aut quatuor sorbi-tionis cyathos, etiamnum vltra manente febre, dant. Deinde, ea bene finita, reficiunt stomachũ cibo frigido, & leni. Ego tum hoc puto tentan-dum, cum parum cibis semel, & post febrem datus prodest. Sed curiose perspiciendum est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere valetudinis iam minui febris videtur, & rursus intenditur. Itaque ei remis-sioni credendũ est, quæ etiam immoratur, & ia-ctationem fætoremq; quendam oris (quem ὀσμή Græci vocant) minuit. Illud satis cõuenit, si quo-tidie pares accessiones sunt, quotidie paruum ci-bum dandum: si impares, post grauiorem ci-bum, post leuiorem, aquam mulsam.

Curatio horris in febribus. C A P. XII.

HOrror autẽ eas ferè febres antecedit, quæ certum habent circuitũ, & ex toto remit-tuntur. Ideoq; tutissimæ sunt* maximè quæ cu-* maxi-rationes admittunt. Nam vbi incerta tempora meq; cur-sunt,

sunt, neq; alui ductio, neq; balneum, neq; vinum, neq; medicamentum aliud recte datur. Incertum est enim quando febris ventura sit: ita fieri potest, ut si subito venerit, summa in eo perniciēs sit, quod auxilij causa sit inuētum. Nihilq; aliud fieri potest, quā ut primis diebus bene abstinēat ager, deinde sub decessu febris eius, quae grauiſſima est, cibum sumat. At ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur, quia facilius proponere nobis & accessionum & decessionum vices possumus. In his autem cum veterauerunt, utilis fames non est. Primis tantūmodo diebus ea pugnandum est, deinde diuidenda curatio est, & ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primū aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potu tepidam

Vomitus. aquam, subsalsam, & vomere eum cogere. Nam ferē talis horror ab his oritur, quae biliosa in stomacho resederunt. Item faciendū est, si proximo quoq; circuitu aequē cessit. Saepe enim sic discutitur. Iamq; quod genus febris sit, scire licet. Itaq; sub expectatione proximae accessionis, quae instare tertia potest, deducendus in balneū est, dandaq; opera est, ut per tempus horroris in solio sit. Si ibi quoq; senserit, nihilominus idem sub expectatione accessionis quartae faciat, siquidem eo quoq; modo saepe id discutitur: si nec balneū quidem profuit, ante accessionē allium edat, aut bibat calidam aquam cum pipere, siquidem ea quoque assumpta calorem mouent, qui horrorem

non

non admittit. Deinde eo modo, quo in frigore preceptum est, antequam inhorrescere possit, operiatur. Fomentisq; protinus validioribus totum corpus circumdare conuenit, maximeq; inuolutis extinctis testis & titionibus. Si nihilominus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur, cui equè ex calefacientibus aliquid sit adiectum, abhibeaturq; frictio, quantam is sustinere poterit, maximeq; in manibus & pedibus, & spiritum ipse contineat, neque desistendum est etiam si horror est. Sape enim pertinacia inuantis, malum corporis vincit. Si quid euomuit, dāda aqua tepida, iterumq; vomere cogendus est, utendumq; eisdē est, donec horror finiatur. Sed præter hæc, ducenda aluus est, si tardius horror quiescet: siquidem id quoque exonerato corpori prodest. Ultima quoque post hæc auxilia sunt, gestatio & frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem aluum præstet, caro glutinosa, vinum cum dabitur austerrum.

Curetio quotidianę febris. CAP. XIII.

Hæc ad omnes circuitus febrium pertinent, discernendę tamen singulę sunt, sicut rationem habent dissimilem. Si quotidianę est, triduo primo magnopere abstinere oportet, tum cibus altero quoq; die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum & vinum, magisq; si horrore sublato hæc superest.

Curat

SI tertiana verò, quę ex toto intermittit, aut quartana est, medijs diebus & ambulationibus uti oportet, alijsq; exercitationibus & unctionibus. Quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus, in hoc genere morborum, multo ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod quamvis pleraq; eius viri pręcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præteryt. Est enim anceps. Ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionem dicit aluum duci oportere, quinto post horrorem vomitum elicere, deinde post febrem (sicut illi mos erat) adhuc calidis dare cibum, & vinum. Sexto die in lectulo detineri. Sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id sæpe fieri posse verisimile est. Tutius tamẽ est ut ipso ordine utamur. Triaremedia, vomitus, alui dissolutionis, vini potus per triduum, id est, die tertio, & quinto, & septimo tentare, nec vinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si verò primis diebus discussus morbus non est, inciditq; in vetustatem, quo die febris expectabitur, in lectulo se contineat, post febrem perfricetur, tum cibo assumpto bibat aquam: postero die, quo cibo vacat & ab exercitatione unctioneq; aqua tantum contentus conquiescat. Et id quidem optimum est. Si verò imbecillitas vrgebit, & post febrem vinum, & medio die paulum cibi debet assumere.

Curat

Curatio quartanę febris.

CAP. XV.

EAdem in quartana facienda sunt. Sed cum hæc tarde admodū finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaq; desūt, eodem die, & postero tertioq; continere se debet, & aquā tantummodo calidā primo die post febrē sumere, bi-duo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem. Si quarto die cum horrore febris reuertitur, vomere, sicut antè præceptū est: deinde post febrem modicū cibum sumere, vini quadrantem. Postero tertioq; die abstinere, aqua tantummodo calida (si sitiet) assumpta: septimo die balneo frigus præuenire, abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si sitiet: actum ita* septimo die balneo frigus præuenire: si febris *non redierit, ducere aluum: ubi ex eo corpus cōquieverit, inunctione vehementer perfricari, eodem modo sumere cibum, & vinum bi-duo proximo se abstinere, frictione seruata: decimo die rursus balneum experiri: & si postea febris accessit, aquē perfricari, vinum copiosius bibere: ac si proximum est, quies tot dierum, ut abstinentia cum cæteris quę præcipiuntur, febrem tollant. Si verò nihilominus remanet, aliud ex toto sequendum est curationis genus. Idq; agēdum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quominus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendā aluum, k deinde

deinde abstinendum vsq; in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit, tamē etiam febre liberatus vix refectiōi valebit. Adeo si febris sepius accesserit, concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neq; ante febrem, neque post eam tentandum erit, nisi interdum iam horrore discusso. Horror ipse per eadem quę suprà pręscripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebit vngi, & vehementer perfricari, cibum & validum & fortiter assumere, vino vti quantum libebit, postero die cum satis quieuerit, ambulare, exerceri, vngi, perfricari fortiter, cibum accipere sine vino. Tertio die abstinere. Quo die verò febrem expectabit, antē surgere, & exerceri: dareq; operam non oportet, ut in ipsam exercitationē tempus febris incurrat. Sic enim sepe illa discutitur. At si in opere occupauit, tum demum se recipere. In eiusmodi valetudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, vinum. Si vter astrictus est, soluendus est. Sed hac faciliē validiores faciunt, si imbecillitas occupauit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est: si hac quoque vehemens onerat, intra quietem, & vncionē, & cibum sistendum est, dandaq; opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana neminem iugulat, sed si ex ea facta quotidiana est, in malis ager est. Quod tamē nisi nunquā culpa vel agri vel curantis * nonnunquam fit.

Curatio

Curatio duarum quartanarum. CAP. XVI.

A Tsi duæ quartanæ sunt, neq; hæ, quas pro-
posui, exercitationes adhiberi possunt, aut
ex toto quiescere opus est: aut si id difficile est,
leuiter ambulare, considerare diligēter inuolutis pe-
dibus & capite. Quoties febris accessit et desijt,
cibum modicum sumere & vinum: reliquo tem-
pore nisi imbecillitas vrget, abstinere. Aut si
duæ febres penè iunguntur, post vtranq; cibum
sumere. Deinde vacuo tempore & moueri ali-
quid, & post vnctionē cibo vti. Cum verò vetus
quartana raro, nisi vere soluatur, vtiq; eo tēpore
attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem
impediat. Prodest q; in vetere quartana muta-
re subinde victus genus, à vino ad aquam, ab
aqua ad vinū, à lenibus cibis ad acres, ab acris-
bus ad lenes transire, esse radicē, deinde vomere,
iure'ue pulli gallinacei ventrem resolvere, oleum
ad frictiones adycere, calefacientia ante acces-
sionē sorbere, vel aceti cyathos duos, vel vnum
synapis, cum tribus Græci vini falsi, vel mista
paribus portionibus, & in aqua diluta, piper,
castoreum, laser, myrrham. Per hæc enim simi-
liaq; corpus agitandum est: vt moueatur ex eo
statu quo detinetur. Si febris quieuit, diu memi-
nisse eius diei conuenit, eoq; vitare frigus, calo-
rem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim reuer-
titur, nisi à sano quoq; aliquandiu timetur.

Curatio quotidianæ febris, quæ ex quartana fa-
cta sit.

CAP. XVII.

k 2

At

AT si ex quartana quotidiana facta est, cum id vitio inciderit, per biduum abstinere oportet, frictione uti, aquam tantummodo vesperi potui dare, tertio die saepe fit, ne febris accedat, sed siue fuit, siue non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus: at si manet, per biduum abstinentia, quanta maxime imperari corpori potest, frictione quotidie utendum est.

De tribus insanix generibus, & primo de eius curatione, quae à Graecis *φρενιτις* dicitur.

C A P. XVIII.

ET febriū quidem ratio exposita est. Super-sunt verò alij corporis affectus, qui huic superueniunt, ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt, protinus iungam. Incipiam ab insania, primamq; huius ipsius partem aggrediar, quae & acuta, & in febre est, Graeci *φρενιτις* appellant. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione egros desipere, & loqui aliena. Quod non quidē leue est, neq; incidere potest, nisi in febre vehementi, non tamen aequè pestiferum est. Nam plerunq; breue esse consuevit, leuatoq; accessionis impetu, protinus mens redit. Neq; id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre praeceptum est. Phrenitis verò tum demum est, cum continua dementia esse incipit, aut cum ager quamuis adhuc sapiat, tamen quasdam vanas imagines accipit: perfecta est, ubi mens illis imaginibus addicta est. Eius autem plura genera sunt. Siquidē
ex

Phrenitis.

ex Phreneticis alij hilares, alij tristes sunt, alij
facilius continentur, & intra verba desipiunt,
alij consurgunt, & violenter quadam manu fa-
ciunt: atq; ex his ipsis alij nihil nisi impetu pec-
cant, alij etiam artes adhibent, summamq; spem
sanitatis in captandis maiorum operum occasio-
nibus præbent, sed exitu deprehenduntur. Ex
his autem eos qui intra verba desipiunt, aut le-
uiter etiam manu peccant, onerare asperioribus
coërcitionibus superuacuum est. Eos verò, qui
violentius se gerunt, vincere cōuenit, ne vel alte-
ri vel sibi noceant. Neq; credendum est, si vin-
ctus aliquis, dum leuari vinculis cupit, sanū iam
se fingat, quamuis prudēter & miserabiliter lo-
quatur, quoniam is dolus insanientis est. Ferè
verò antiqui tales ægros in tenebris habebant,
eò quòd eis contrarium esset exterreri, & ad
quietē animi tenebras ipsas conferre aliquid iu-
dicabant. At Asclepiades, tanquā tenebris ipsis
terrentibus, in lumine habendos esse dixit: neu-
trum tamen perpetuum est. Alium enim lux,
alium tenebræ magis turbant, reperiunturq; in
quibus nullum discrimē deprehendi vel hoc, vel
illo modo possit. Optimum itaq; est vtriusq; expe-
riri, & habere eum, qui tenebras horret, in luce,
eum qui lucem, in tenebris. At vbi nullum tale
discrimen est, æger si vires habet, loco lucido, si
non habet, obscuro cōtinendus est. Remedia verò
adhibere, vbi maxime furor vrget, superuacuum
est: simul enim febris quoque increscit. Itaque

tum nihil nisi continendus ager est. Vbi verò res patitur, festināter subueniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinē mitti, ac si trucidentur: rationem hanc secutus, quòd neq; insania esset, nisi febre intenta: neq; sanguis, nisi in remissione eius rectè mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictiōe quæsiuit, cum & intentio febris somnū impediāt, & frictio non nisi in remissione eius utilis sit. Itaq; hoc quoq; auxilium debuit præterire. Quid igitur est? Multa in præcipiti periculo rectè fiunt, aliās omittenda. Et cōtinuata quoq; febris habet tempora, quibus etsi non remittit, non tamen crescit. Est q; hoc, ut non optimum, sic tamen secundum remedium* genus. Quod si vires ægri patientur, sanguis quoq; mitti debet. Nec minus deliberari potest, an alius ducenda sit, tum interposito die conuenit caput ad cutem tondere, deinde aqua fouere, in qua verberæ aliquæ decoctæ sint, vel ex reprimentibus: aut prius fouere, deinde tondere et iterum fouere, ac nouissimè rosa caput naresq; implere, offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam, mouere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quæ tamen facienda sunt in his, quibus vires non desunt. Si verò imbecillitas est, rosa tantum caput, adiecto serpyllo, similiq; aliquo madefaciendum est. Vtiles etiam in quibuscunq; viribus herbe duæ sunt, Solanum & Muralis, simul ex utraq; succo expresso caput impleatur. cum se febris remiserit, frictione
utendum

*tempus

utendum est, parcius tamen in his, qui nimis
hilares, quam in his qui nimis tristes sunt. Ad-
uersus omnium autem sic insanientium animos,
gerere se pro cuiusq; natura necessariū est. Quo-
rundam enim vani metus leuandi sunt, sicut in
homine prædiuite famem timente *accidit, cui *incidit
subinde falsa hæreditates nuntiabantur. Quo-
rundam audacia coercenda est, sicut in his fit, in
quibus continendis plagæ quoque adhibentur.
Quorundam etiam intempestiuus risus & ob-
iurgatione & minis prohibendus est. Quorum-
rundam discutiendæ tristes cogitationes, ad quod
symphonie, & cymbala, strepitusq; proficiunt.
Sæpius tamen assentiendum, quam repugnandum
est, paulatimq; & non euidenter ab his,
quæ stultè dicentur, ad meliora mens eius abdu-
cenda est. Interdum etiam elicienda ipsius in-
tentio, ut sit in hominibus studiosis literarum,
quibus liber legitur, aut rectè, si delectantur, aut
perperam, si id ipsum eos offendit. Emendando
enim, conuertere animum incipiunt. Quinetiam
recitare, si qua meminerunt, cogendi sunt. Ad
cibum quoq; quosdam non desiderantes reduxe-
runt hi, qui inter epulantes eos collocauerunt.
Omnibus verò sic affectis, somnus & diffici-
lis, & præcipuè necessarius est. Sub hoc enim
pleriq; sarescunt. Prodest ad id, atq; etiam ad
mentem ipsam componendam, crocinum vi-
guentum cum irino in caput datum. Si nihilomi-
nus vigilant hi, quidam somnū moliuntur, potui

k 4 dando

dando aquam, in qua papauer, aut hyoscyamos decocta sit: alij mandragora mala puluino subijciunt, alij vel amomum, vel sycamini lacrymam fronti inducunt. Hoc nomen apud medicos reperio. Sed cum Græci morum sycaminum appellant, mori nulla lacryma est. Sic verò significatur lacryma arboris in Aegypto nascentis, quam ibi morosycon appellant. Plurimi decoctis papaueris corticibus, ex ea aqua subinde spongia os, & caput fouent. Asclepiades ea superuacua esse dixit, quoniam in lethargum saepe * conuerterent. Precipit autem ut primo die à cibo, potione, somno abstineretur, respere ei daretur potui aqua, tunc frictio admoventur lenis, ita ut ne manum quidem qui fricaret, vehementer imprimeret: postero deinde die ejusdem omnibus factis, resperi ei daretur sorbitio * ex aqua, rursusq; frictio adhiberetur. Per * & aqua hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, & quidē adeo, ut illo conficiente nimia frictio etiā lethargi periculū afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis accersendus est, habita scilicet eadem moderatione, quæ hic quoq; necessaria est, ne quē obdormire volumus, excitare postea non possimus. Confert etiam aliquid ad somnū * Silanus Georgius iuxta cadens, vel gestatio post cibum & noctu, Val. Silanus maximeq; suspēsi lecti motus. Neq; alienum est, nū pro risi neq; sanguis antè missus est, neq; niens con- no expo- stat, neq; somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam

bitulam admouere. Quæ quia leuat morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoq; adhibenda. Nam neq; implendus æger est, ne insaniat, neq; ieiunio utiq; vexandus est, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est autem cibo infirmo, maximeq; sorbitione, portione aquæ mulsæ, cuius ternos cyathos bis hyeme, quater æstate dedisse satis est. Alterum genus insanie est, quod spatium longius recipit, quia ferè sine febre incipit, leues deinde febriculas excitat, & consistit in tristitia, quam videtur bilis atra contrahere. In hac utilis detractio sanguinis est. Si quid hanc prohibet, prima est abstinentia, secunda per album veratrum vomitumq; purgatio, post utrumlibet adhibenda bis die frictio est. Si magis valet, frequens etiam exercitatio. In ieiuno vomitus, cibus sine vino dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet etiam ex infirmissima dari posse, dum ne ea sola quis utatur, valentissima tantummodo esse remouenda. Præter hæc seruanda aliud est quam tenerrima, remouendi terrores, et potius bona spes asserenda, querenda delectatio ex fabulis ludisq;, quibus maxime capi sanus assueuerat. Laudanda si qua sunt ipsius opera, & ante oculos eius ponenda. Leuiter obiurganda vana tristitia. Subinde admonendus in his ipsis rebus, quæ sollicitant, cur non potius latitia, quam sollicitudinis causa sit. Si febris quoq; accessit, sicut aliæ febres curanda est.

k s Terti

Tertium insanie genus est ex his longissimum; adeo ut vitam ipsam non impediat, quod robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius species duæ sunt. Nam quidam imaginibus, non mente falluntur, qualem insanientem Aiacem vel Orestem poetarum fabulae ferunt: quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes an hilares sint. In tristitia nigrum veratrum deiectionis causa, in hilaritate album, ad vomitum excitandum dari debet. Idque si in potione non accepit, pani adijciendum est, quo facilius fallat. Nam si bene se purgauerit, ex magna parte morbum leuabit. Ergo etiam si semel datum veratrum, parum profecerit, interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet, leuiorem esse morbum cum risu, quam serio insanientium. Illud quoque perpetuum in omnibus morbis, ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est, venter eius ante soluendum esse: ubi à superiore, comprimendum. Si vero consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Vbi perperam aliquid dixit, aut fecit, fame, vinculis, plagis coercendus est. Cogendus est et attendere, et ediscere aliquid, et meminisse. Sic enim fiet, ut paulatim metu cogatur considerare quid faciat. Subito etiam terreri et expauescere, in hoc morbo prodest. Et ferè quicquid animum vehementer perturbat. Potesť enim quaedam fieri mutatio, cum ab eo statu mens in quo fuerat, abducta est. Interest

terest etiam si ipse sine causa subinde rideat, an
maestus, dimissusq; sit. Nam dementis hilaritas
terroribus his (de quibus supra dixi) melius cu-
ratur. Si nimia tristitia est, prodest lenis, sed
multa bis die frictio. Item per caput aqua frigi-
da infusa, demissumq; corpus in aquam & o-
leum. Illa communia sunt, insanientes vehemen-
ter exerceri debere, multa frictioe uti, neq; pin-
guem carnem, neq; vinum assumere, cibis uti
post purgationem ex media materia quam le-
uissimis. Non oportere esse vel solos, vel inter
ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut
negligant, mutare debere regiones, & si mens
redit, annua peregrinatioe esse iactandos. Raro,
sed aliquando tamen, ex metu delirium nasci-
tur. Quod genus insanientium specie similiq; vi-
ctus genere curandum est, praeterquam quod in
hoc insaniae genere solo recte vinum datur.

Cardiaci morbi curatio.

CAP. XIX.

Hic morbo praecipue contrarium est id ge-
nus, quod Cardiacum à Gracis nomina-
tur, quamvis saepe ad eum phrenetici transeunt.
Siquidem mens in illis labat, in hoc constat. Id
autem nihil aliud est, quam nimia imbecillitas
corporis, quod stomacho languente, immodico su-
dore digeritur. Licetq; protinus scire id esse, ubi
venarum exigui, imbecilliq; pulsus sunt. Sudor
autem supra consuetudinem, & modo & tempo-
re, ex toto thorace & cervicibus, atq; etiam ca-
pite prorumpit, pedibus tantummodo & cruri-
bus

bus siccioribus atq; frigentibus. At ubi id mor-
 bi genus est, curatio prima est, supra præcordia
 imponere quæ reprimant cataplasmata: secunda,
 sudorem prohibere. Id præstat acerbum oleum
 vel rosa, vel melinum aut myrteum. Quorum a-
 liquo corpus leuiter perungendum, ceratumq; ex
 aliquo horum tum imponendū est. Si sudor vin-
 cit, delinendus homo est, vel gypso vel argenti
 spuma, vel cimolia creta, vel etiam subinde ho-
 rum puluere respergendus. Idem præstat puluis
 ex contritis aridi myrti vel rubi folijs, aut ex
 austeri, & boni vini arida fece. Pluraq; similia
 sunt, quæ si desunt, satis utilis est quilibet ex via
 puluis iniectus. Super hæc verò quo minus cor-
 pus insudet, leui veste debet esse contactus, loco
 non calido, fenestris patentibus, sic, ut perflatus
 quoq; aliquis accedat. Tertium auxilium est im-
 becillitati iacentis, vino ciboq; succurrere. Cibus
 non multus quidem, sed sæpe tamen nocte ac die
 dandus est, ut nutriat, neq; oneret. Is esse de-
 bet ex infirmissima materia, et stomacho aptius.
 Nisi autem necesse est, ad uinum festinare non
 oportet. Si verendum est ne deficiat, tum & in-
 trita ex hoc, & hoc ipsum austereum quidem,
 sed tamen tenue meracum. Egelidum subinde et
 liberaliter dandum est adiecta polenta, si modo
 is æger parum cibi assumit. Idq; vinum esse de-
 bet, neq; nullarum viriū, neq; ingentium: recteq;
 tota die ac nocte, vel tres heminas æger bibet.
 Si vastius corpus est, plus etiam. Si cibum non
 accipit,

accipit, perunctum antè perfundere aqua frigida conuenit, & tum dare. Quòd si stomachus resolutus parum continet, et ante cibum & post eum sponte vomere oportet, rursusq; post vomitum, cibum sumere. Si ne id quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaq; hora sumere alterum: si id quoq; stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis superillinendum est. Qui ubi inaruerunt, efficiunt, vt vinum in stomacho contineatur, exq; eo toti corpori calor, venisq; vis redeat. Vltimum auxilium est, in aluum ptisanæ vel alicæ cremorem ex inferioribus partibus *indere, siquidem id quoq; vires tuetur. *inijcere Neq; alienum est, naribus quoq; æstuantis ad-mouere, quod reficiat, id est rosam, & vinum. Et si qua in extremis partibus frigent, vinctis & calidis manibus fouere. Per quæ si consequi potuimus, vt & sudoris impetus minuatur, & vita prorogetur, incipit iam tempus ipsum esse præsidio. Vbi in tuto esse videtur, verendum est tamen, ne ad eandem imbecillitatem citò recidat. Itaq; vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere, donec satis virium corpori redeat.

De Lethargo, & eius curatione, CAP. XX.

Alter quoq; morbus est, aliter phrenetico contrarius. In illo difficilis somnus, prompta ad omnem audaciã mens est: at in hoc marcor, & inexpugnabilis penè dormiendi necessitas, (Λήθαργος Græcè nominant) atq; id quoq; genus

genus acutum est, & nisi succurritur, celeriter iugulat. Hos egros quidam subinde excitare nituntur, admotis his, per quæ sternutamenta euocantur, & his, quæ odore fædo mouent, qualis est pix cruda, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa, iuxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu ceruinum. Si id non est, quodlibet aliud. Hæc enim cum comburuntur, odorem fædum mouent. Tharrias verò quidam accessionis esse id malum dixit, leuariq; cum ea decessit. Itaq; eos qui subinde excitant sine vsu, male habere. Interest autem in decessione expergiscatur ager, an cum febris non leuetur, aut leuata quoq; ea somnus vrgeat. Nā si expergiscitur, adhibere ei vt sopito superuacuum est. Neq; enim vigilando melior fit, sed per se, si melior est, vigilat. Si verò continens ei somnus est, utiq; excitandus est, sed his temporibus quibus febris leuissima est, vt & excernat aliquid, & sumat. Excitat autem validissimè repente aqua frigida infusa post remissionem. Itaq; perunctum oleo multo corpus tribus aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur, si equalis agro spirituserit, si mollia præcordia. Sin aliter hæc erunt, ea potiora, quæ supra comprehensa sunt. Et quod ad somnum quidem pertinet, commodissima hæc ratio est. Medendi autem causa caput radendum, deinde postea fouendum est aqua, in qua laurus aut ruta decocta sit. Altero die imponendum

dum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri bacca, aut hedera cum rosa & aceto. Praeipueq; proficit & ad excitandum hominem naribus admotum, & ad morbum ipsum depellendum capiti fronti'ue inpositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest, maximeq; opportune cibus datus, id est in remissione, quanta maxime inueniri poterit. Aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat: sic, ut si quotidie grauis accessio est, haec quotidie detur. Si alternis, post grauiorem sorbitio, post leuiorem, malsa aqua. Vinum quoq; cum tempestino cibo datum, non mediocriter adiuvat. Quod si post longas febres eiusmodi torpor corpori accessit, cetera eadem seruanda sunt. Ante accessionem autem tribus quatuor'ue horis castoreum (si venter astrictus est) mixtum cum scamonea: si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si praecordia mollia sunt, cibus vtendum est plenioribus. Si dura, in iisdem sorbitienibus subsistendum, imponendumq; est praecordijs, quod simul & reprimat, & emolliat.

De Aqua inter cutem, hoc est Hydropico morbo.

C A P. XXI.

Sed hic quidem acutus est morbus. Longius vero fieri potest eorū, quos aqua inter cutem male habet, nisi primis diebus discussus est, ὕδρωπας Graeci vocat. Atq; eius tres species sunt. Nam modò ventre vehementer intento, creber intus ex motu spiritus sonus est. Totodò corpus inaequa

inequale est, tumoribus aliter aliterq; per totum id orientibus. Modò intus in vnâ aqua contrahitur, & moto corpore ita mouetur, vt impetus eius conspici possit. Primum τυμπαίτην, secundū λονοφλεγματίαν vel ὑποσάρκα, tertium ἀσκήτην Græci nominant. Cōmunis tamen omnium est humoris nimia abūdantia, ob quam ne vlcera quidē in his agris facīle sanescunt. Sæpe verò hoc malū per se incipit. Sæpe alteri vetusto morbo, maximeq; quartanæ superuenit. Facilius in seruis, quàm in liberis tollitur, quia cūm desideret famem, sitim, mille alia tædia, longamq; patiētiam, promptius his succurritur, qui facīle cogūtur, quàm quibus inutilis libertas est. Sed ne hi quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoq; non ignobilis medicus, Chrysippi discipulus, apud Antigonū regem, amicum quendam eius notæ intemperantiæ, mediocriter eo morbo implicitum negauit posse sanari. Cumq; alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur, respondit illum ad morbum ægri respicere, se ad animum. Neq; eum res fefellit. Ille enim cūm summa diligentia nō medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmata sua deuorando, bibendoq; suam vrinam in exitium se precipitauit. Inter initia tamen non difficilima curatio est, si imperata sunt corpori, quies, sitis, inedia. At si malum inueterauerit, non sine magna molestia discutitur. Metrodorum

dorum tamen Epicuri discipulum referunt, cum hoc morbo tentaretur, neque equo animo ferret necessariam sitim, ubi diu abstinuerat, bibere solitum, deinde euomere. Quod si redditur quicquid receptum est, multum tædio demit: si à stomacho retentum est, morbum auget. Ideoq; in quolibet tentandum non est. Sed si febris quoque est, hæc in primis submouenda est per eas rationes, per quas huic succurri posse propositum est. Si sine febre ager est, tum demum ad ea veniendum est, quæ ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoque quæcunque species est, si nondum nimis occupauit, isdem auxilijs opus est. Multum ambulandum, currendum* aliquando est. Superiores maxime partes sic perfricandæ, ut spiritus ipse continetur, euocandus est sudor non exercitatione tantummodo, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusq; alijs, maximeq; utiles naturales & siccæ sudationes sunt, quales super Baias habemus in myrtetis: balneum atq; omnis humor alienus est. Ieiuno recte catapotia dantur facta ex absinthij duabus, myrrhæ tertia parte. Cibus esse debet ex media quidem materia, sed tamen generis durioris. Potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat, optimaq; est, quæ urinam mouet. Sed id ipsum tamen molliri cibo, quam medicamento melius est. Si tamē res coget,*ex his aliquid, quæ id præstent, erit decoquendum, eaq; aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere iris, nardum, l crocum,

*aliquid

*ut ex his aliquid detur, præstetur id decoquendum.

crocum, cinamum, amomum, cassia, myrrha, balsamum, galbanum, ladanum, ænanthe, panace, cardamomum, hebenus, cupressi semen, vua tyminia, quàm $\sigma\alpha\phi\acute{\iota}\delta\alpha$ $\alpha\gamma\acute{\varsigma}\acute{\iota}\alpha\upsilon$ Græci nomināt: abrotanum, rosæ folia, acorum, amara nuces, tragoriganum, styrax, costum, iunci quadrati, & rotundi semen, illud cyperon, $\chi\acute{o}\iota\upsilon\alpha\upsilon$ hoc Græci vocant. Quæ quoties posuero, non quæ hic nascuntur, sed quæ inter aromata afferuntur, significabo. Primo tamen quæ lenissima ex his sunt, id est rosæ folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque vtile est & austerum, sed quàm tenuissimum. Commodum est etiam lino quotidie ventrē metiri, & qua comprehendit alium, notam imponere, postero die videre, si plenius corpus sit, an extenuetur. Id enim quod tenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est metiri & potionem eius & vrinam. Nam si plus humoris excernitur, quàm assumitur, ita demum secundæ valetudinis spes est. Asclepiades in eo, qui ex quartana in hydropa deciderat, se abstinentia bidui & frictione vsum, tertio die iam & febre & aqua liberato, cibum & vinum dedisse, memoriæ prodidit. Hactenus communiter de omni specie dici potest. Si vehementius malum est, deducenda ratio curandi est. Ergo si inflammatio & ex ea dolor creber est, vtilis quotidianus aut alterno quoque die post cibum vomitus est. Fomentis siccis, calidisq; vtendum est. Si per hæc dolor non finitur, necessarie sunt sine ferro cucurbit

cucurbitula. Si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, & tum his utendum. Vltimum auxilium est, si cucurbitula nihil profuerunt, per alium infundere copiose aquam calidam, eamque recipere. Quinetiam quotidie ter quater'ue opus est uti frictione vehementi, cum oleo & quibusdam calefacientibus. Sed in hac frictione à ventre abstinendum est. Imponendum verò in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat, ferramentisque candentibus pluribus locis venter exulcerandus est, & seruanda vlcera diutius. Vtiliter etiam scilla cocta delinitur cutis, sed diu post has inflammationes abstinendum est ab omnibus inflantibus. At si id vitium est, cui leucophlegmatias nomen est, eas partes quæ tument, subijcere soli oportet, sed non nimium, ne febricula incidat: si is vehementior est, caput velandum est, utendumque frictione madefactis tantum manibus aqua, cui sal & nitrum & olei paulum sit adiectum, sic ut aut pueriles, aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit. Idque si vires patiuntur, ante meridiem tota hora, post meridiem semihora fieri oportet. Vtilia etiam sunt cataplasmata, quæ reprimunt, maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum quatuor ferè digitis ex parte interiore, qua per aliquot dies frequēs humor feratur, atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet. Concutiendumque multa gestatione corpus est: atque ubi inducta vulneribus ci-

catrices sunt, adiiciendum & exercitationibus est, & cibis, donec corpus ad pristinum habitum reuertatur. Cibus valens esse debet, & glutinosus, maximeq; caro. Vinum (si per stomachum licet) dulcius. Sed ita, ut inuicem biduo triduo'ue, modò aqua, modò id bibatur. Prodest etiam lactuca marina (quæ grandis iuxta mare nascitur) semen, cum aqua potui datum. Si valens est qui id accipit, ei scilla cocta (sicut supra dixi) delinitur. Autoresq; multi sunt inflatis vesicis pulsandos tumores esse. Si vero id morbi genus est, quo in vterum multa aqua contrahitur, ambulare, sed magis modicè oportet, malagma quod digerat impositum habere, idq; ipsum super imposito triplici panno, fasciâ non nimium tamen vehementer astringere. Quod à Tharria profectum, seruatum esse à pluribus video. Si iecur aut lienem affectum esse manifestum est, ficum pinguem contusam adiecto melle superponere. Si per talia auxilia venter non siccatur, sed humor nihilominus abundat, celeriore via succurrere, ut is per uentrem ipsum emittatur. Neque ignoro Erasistrato displicuisse hanc curandi viam. Morbum enim hunc iocineris putauit. Ideoq; ita illum esse sanandum, frustra q; aquam emitti, quæ vitiato illo subinde nascatur. Sed primum non huius visceris vnius hoc vitium est. Num splene affecto, & in totius corporis malo habitu fit: deinde, ut inde cœperit, tamen aqua nisi emittitur, quæ contra naturam ibi subsistit,

¶

& iocineri & ceteris* interioribus partibus no- * inferio-
 cet. Conuenitq; corpus nihilominus esse curandū. ribus
 Neque enim sanat emissus humor, sed medicina
 locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac
 ne illud quidem in controuersiam uenit, quin non
 omnes in hoc morbo sic curari possint, sed iuue-
 nes robusti, qui vel ex toto carent febre, uel certē
 satis liberales intermissiones habent. Nam quo-
 rum stomachus corruptus est, qui' ue ex atra bile
 huc deciderunt, quiq; malum corporis habitū ha-
 bent, idonei huic curationi non sunt. Cibus au-
 tem quo die primum humor emissus est, superua-
 cuus est, nisi si uires desunt. Insequentibus die-
 bus & his uinum meracius quidem, sed non ita
 multum dari debet, paulatimq; euocandus æger
 est ad exercitationes, frictiones, solem, sudatio-
 nes, nauigationes, & idoneos cibos, donec ex to-
 to conualescat. Balneum rarum res amat, fre-
 quentiorē in ieiunio vomitum. Si æstas est, in
 mare natāre commodum est. Vbi conualuit ali-
 quis, diu tamen alienus ei ueneris vsus est.

De Tabē, & eius speciebus, & curatio-
 nibus.

CAP. XXII.

Dlutius sape et periculosius Tabes eos ma-
 le habet, quos inuasit. Atq; huius quoque
 plures species sunt. Vna est, qua corpus non ali-
 tur, & naturaliter semper aliquibus decedenti-
 bus, nullis verò in eorū locū subeuntibus, summa
 macies oritur, & nisi occurritur, tollit: ἀτροφία
 hanc Greci vocant. Ea duabus fere de
 1 3 causis

causis incidere consuevit. Aut enim nimio timore aliquis minus, aut auiditate nimia plus quam debet, assumit : ita vel quod deest, infirmat : vel quod superat, corrumpitur. Altera species est, quam Græci καχεξία, appellāt, ubi malus corporis habitus est, ideoq; omnia alimenta corrumpuntur. Quod serè fit, cum longo morbo vitata corpora, etiam si illo vacant, refectiōem tamen non accipiunt, aut cum malis medicamentis corpus affectum est, aut cum diu necessaria defuerunt, aut cum inusitados et inutiles cibos aliquis assumpsit, aliquid ue simile incidit. Huic præter tabem illud quoq; nonnunquam accidere solet, ut per assiduas pustulas aut vlcera summa cutis exasperetur, vel aliquæ corporis partes intumescant. Tertia est, longeq; periculosissima species, quam Græci φθίσις nominauerunt. Oritur serè a capite, inde in pulmonē destillat : huic exulceratio accedit, ex hac febricula leuis fit, quæ etiam cum quieuit, tamen & repetit. Frequens tussis est, pus excreatur, interdum cruentum aliquid. Quicquid excreatum est, si in ignem impositum est, mali odoris est. Itaq; qui de morbo dubitant, hac nota utuntur. Cum hac genera tabis sint, animaduertere primum oportet, quid sit in quo laboratur. Deinde, si tantummodo non ali corpus apparet, causam eius attendere : & si cibi minus aliquis quam debet, assumit, adycere, sed paulatim, ne si corpus insuetum, subita multitudine onerauerit, concoctionem impediat. Si verò
plus

plus iusto quis assumere solitus est, abstinere vno die, deinde ab exiguo cibo incipere, quotidie adijcere, donec ad iustum modum perueniat. Præter hæc conuenit ambulare locis quàm minime frigidis, sole vitato, per manus quoq; exerceri. Si infirmior est, gestari, vngi, perfricari, si potest, maxime per seipsum, sæpius eodem die, & ante cibum & post eum sic, vt interdum oleo quædam adijciantur calefaciētia, donec insudet. Prodestq; ieiuno prehendere per multas partes cutem, & attrahere, vt relaxetur, aut imposita resina & abducta subinde idem facere. Vtile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atq; in ipso solio recte cibi aliquid assumitur, aut si sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi verò esse debent ex his, qui facile concoquuntur, qui maxime alunt. Ergo vini quoq; sed austeri necessarius vsus est, mouenda vrina. At si malus corporis habitus est, primū abstinendum est, deinde aluus ducēda, tum paulatim cibi dandi, adiectis exercitationibus, vnctionibus, frictionibus. Vtilius his frequens balneum est, sed ieiunis etiam vsq; ad sudorē. Cibus verò opus est copiosis, varijs, boni succi, quiq; etiam minus facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est, sed paulatim quotidieq; pluribus diebus, cum eo, vt cætera quoq; eodem modo seruentur. Quòd si mali plus est, & vera phthisis est, inter initia protinus occurrere necessarium est. Neq; enim facile is morbus cum

inueterauerit, euincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, cæli mutatione, sic, ut densius quam id est, ex quo discedit æger, petatur. Ideoq; aptissimè Alexandriam ex Italia itur. Fereq; id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus ætate firmissima maximè oriatur, id est ab anno duodecimo ad annū quintum & trigesimum. Si id imbecillitas non finit, naue tamen non longe gestari commodissimum est. Si navigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus dimouendum est, tum à negotijs abstinentum est, omnibusq; rebus, que sollicitare animum possunt, somno indulgendum, cauende destillationes, ne si quid cura leuaret, exasperent, & ob id vitanda cruditas, simulq; sol & frigus. Os obtegendum, fauces velandæ, tussicula suis remedijs finienda, et quàm diu quidem febricula incurSAT, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestiuis cibis medendum. Eoq; tempore bibenda aqua. Lac quoque, quod in capitis doloribus, & in acutis febribus, & per eas facta nimia sitis, siue præcordia tument, siue biliosa vrina est, siue sanguis fluxit, pro veneno est, in plithisitamen, sicut in omnibus longis difficilibusq; febribus, rectè dari potest. Quòd si febris aut nondum incurSAT, aut iam remisit, recurrendum est ad modicas exercitationes, maximeq; ambulationes, item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer, ut allium, porrum, idq; ipsum ex aceto, vel

ex

ex eodem intubus, ocymum, lactuca. Dein lenis,
 ut sorbitio ex ptisana, vel ex alica, vel ex amy-
 lo, lacte adiecto. Idem oryza quoque, & si ni-
 hil aliud est, far præstat. Tum inuicem, modò
 his cibus, modò illis vtendum est. Adijciendaq;
 quedam ex media materia, præcipueq; vel ex
 aprugna, cerebellum, vel pisciculus, & his simi-
 lia. Farina etiam cum seuo ouillo, caprino ue-
 mista, deinde incocta, pro medicamento est. Vi-
 num assumi debet lene, austerum. Hactenus non
 magna mole pugnatur. Si uehementior noxa est,
 ac neq; febricula neq; tussis quiescit, tenuariq;
 corpus apparet, validioribus auxilijs opus est.
 Exulcerandus est ferro candenti, vno loco sub
 mēto, altero in gutture, duobus ad mammam v-
 tranq; itē sub imis osibus scapulari (quos ὠμο-
 πλάτας Græci vocant) sic, ne sanescere vlcera
 sinamus, nisi tussi finita. Cui per se quoque me-
 dendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterq;
 die uehementer extrema partes perfricandæ,
 thorax leui manu pertractandus, post cibum
 intermittenda hora, & perfricanda crura, bra-
 chiaq;. Interpositis denis diebus demittendus est
 æger in solium, in quo sit aqua calida, & oleum:
 ceteris diebus bibenda aqua, tum & vinum: si
 tussis non est potui frigidum dandum: si æstas
 est, egelidum. Vtile est etiam cibos in remissioni-
 bus quotidie dari, frictiones, gestationesq; si-
 militer adhiberi: *itemq; acria quarto aut quin- *eadem
 to die sumere, interdum herbam sanguinalem acria

l 5 ex

ex aceto vel plantaginem esse. Medicamentum etiam est, vel plantaginis succus per se, vel mar-
rubium ex melle concoctum, ita ut illius cyathus
sorbeatur, huius cochleare plenum paulatim de-
lingatur, uel inter se mista & incocta resina te-
rebinthinae pars dimidia, butyri & mellis pars
altera. Precipua tamen ex his omnibus sunt vi-
ctus, vehiculum, & nauis, & sorbitio. Aluus
cita utique vitanda est. Comitus in hoc morbo
si frequens est, perniciosus est, maximeq; san-
guinis. Qui meliusculus esse coepit, adijcere de-
bet exercitationes, frictiones, cibos deinde, ipse
se, suppresso spiritu, perfricare, diu abstinere à
vino, balneo, venere.

De Comitialis morbi curationibus. CA. XXIII.

INter notissimos morbos est etiam is, qui Co-
mitialis, vel maior nominatur. Homo subito
concidit, ex ore spuma mouetur, deinde inter-
posito tempore ad se redit, & per seipsum con-
surgit. Id genus saepius viros quam faeminas
occupat, ac solet quidem etiam longum esse, usq;
ad mortis diem, & vitae non periculosum. Inter-
dum tamen cum recens est, hominem consumit,
& saepe eum, si remedia non sustulerunt, in pue-
ris veneris, in puellis menstruorum initium tollit:
modò cum distentione membrorum aut neruo-
rum prolabitur aliquis, modò sine illa quidem.
Hos quoque iisdem, quibus lethargicos excitare
conantur, quod admodum supernacuum est, &
quia ne lethargicus quidem his sanatur, & quia
cum

cum possit iste nunquam expergisci, atq; ita fame interire, hic ad se utiq; reuertitur. Vbi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utique sanguis mitti debet. Si accessit, non utiq; mittendus est, nisi alia quoque hortantur. Necessarium autem est ducere aluum, vel nigro veratro purgare, vel utrumq; facere, si vires patiuntur: tunc caput tondere, oleoq; & aceto perungere, cibum post diem tertium, simul cum transit hora, qua concidit, dare. Neque sorbitiones autem his, alijq; molles, & faciles cibi, neq; caro, minimeq; suilla conuenit, sed medicæ materiæ. Nam & viribus opus est, & cruditates cauenda sunt, cum quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaq; calefacientia: item, frigus, vinum, venerem, loci præcipitis conspectum, omniumq; terrentium, vomitum, lassitudinem, sollicitudines, negotia omnia. Vbi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, & inuicem alterum quæque eadem hora cibi seruata, donec quatuordecim dies transeant. Quos ubi morbus excessit, acuti vim deposuit. At si manet, curandus iam ut longus est. Quod si non quo die primum id incidit, medicus accessit, sed is qui cadere consuevit, ei traditus est, protinus eo genere victus*habito, qui supra comprehensus est, expectandus est dies, quo prolabatur, utendumq; tum *dabitur, vel sanguinis missione, vel ductione alui, vel nigro veratro, sicut præceptum est. Insequentibus deinde diebus per eos cibos quos proposui, vitatitia

tis omnibus, quæ cauenda dixi, nutriendus. Si per hæc morbus finitus non fuerit, cōfugiendum erit ad album veratrum, ac ter quoq; aut quater eo vtendum, non ita multis interpositis diebus: sic tamen, ne iterum vnquā sumat, nisi conciderit. Medijs autē diebus vires eius erūt nutriendæ, quibusdam, præter ea quæ scripta sunt, adiectis. Vbi mane experrectus est, corpus eius leuiter ex oleo vetere, cum capite (excepto ventre) permulceatur, tum ambulatione quàm maxime longa & recta vtatur: post ambulationem loco tepido vehementer & diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur: deinde per caput multa aqua frigida perfundatur, paulum cibi assumat, conquiescat, rursus ante noctem ambulatione vtatur, iterum vehementer perfricetur, sic vt neque venter, neque caput contingatur, post hæc cœnet, interpositisq; tribus aut quatuor diebus, vno aut altero acria assumat. Si ne per hæc quidem fuerit liberatus, caput radatur, vngatur oleo vetere, adiecto aceto & nitro, perfundatur aqua salsa, bibat ieiunus ex aqua castoreum, nulla aqua nisi decocta potionis causa vtatur.* Quidam iugulati gladiatoris calido sanguine epoto, tali morbo sese liberarunt. Apud quos miserum auxilium, tolerabile miseriùs malum fecit. Quod ad medicum verò pertinet, vltimum est iuxta. italum, ex utroque crure paulum sanguinis mittere, occipitium incidere, & cucurbitulas ad mouere, ferro candēte
in

in occipitio quoq; & infra, quâ summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, vt per ea perniciosus humor euadat. Quibus si finitum malum non fuerit, propè est, vt perpetuum sit. Ad leuandum id tantummodo vtendum erit exercitatione multa, frictione, cibisq; his, qui supra comprehensi sunt, præcipueq; vitanda omnia, quæ ne fierent, excepimus.

De Regii morbi curatione. CAP. XXIIII.

AEquè notus est morbus, quem interdum Arquatum, interdum Regium nominant, Quem Hippocrates ait, si post septimum diem febricitante ægro superuenit, tutum esse, mollibus tantummodo præcordijs substantibus. Diocles ex toto, si post febrem oritur etiam prodesse: si post hunc febris, occidere. Color autem eum morbum detegit maxime oculorum, in quibus quod album esse debet, fit luteum. Soletq; accedere & sitis, & dolor capitis, & frequens singultus, & præcordiorum dextra parte duries et vbi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumq; resolutio, atq; vbi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodâ inalbescit. Primo die abstinere ægrum oportet, secundo ducere aluum, tum si febris est, eam victus genere discutere. Si non est, scamoneam potui dare, vel cum aqua betam albam contritam, vel cum aqua mulsâ nuces amaras, absynethium, anisum, sic, vt pars huius minima sit. Asclepiades aquâ quoq; salsam, & quidem per biduum purgationis

nis causa bibere cogebat, ijs quæ urinam mouent reiectis. Quidam superioribus omiſſis, per hæc & per eos cibos, qui extenuant, idem se conſequi dicunt. Ego ubiq; ſi ſatis virium eſt, validiora, ſi parum, imbecillia auxilia præfero. Si purgatio fuit, poſt eam triduo, primo modicè cibum oportet aſſumere ex media materia, & vinum bibere græcum, ſaluſum, vt reſolutio ventris maneat, tum altero triduo validiores cibos, & carnis quoq; aliquid eſſe, intra aquam manere, deinde ad ſuperius genus victus reuerti, cum eo, vt magis ſatietur, omiſſo græco vino, bibere integrum aſtærum: atq; ita per hæc variare, vt interdum acres quoq; cibos interponat, interdum ad ſaluſum vinum redeat. Per omne verò tempus vt edum eſt exercitatione, frictione, ſi hyems eſt, balneo, ſi æſtas, frigidiſ nationibus, lecto etiam & conclauis cultiore claſſo loco vti, ludis, laſciuiæ, per quæ mens exhilaretur. Ob quæ regius morbus dictus videtur. Malagma quoque quod digerat, ſuper præcordia datum prodeſt, vel arida ibi ficus impoſita, ſi iecur aut lienis affectus eſt.

De Elephantia curatione. C A P. XXV.

I Gnotus autem penè in Italia, frequentiſſimus in quibuſdam regionibus iſ morbus eſt, quem ἐλεφαντίαξ Græci vocant, iſq; longis annumeratur. Totum corpus afficitur, ita vt oſſa quoq; vitari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas, crebroſq; tumores habet. Rubor harum paulatim in atrum colorem conuertitur. Summa

cutis

cutis inæqualiter crassa, tenuis, dura, mollisq;,
 quasi squamis quibusdam exasperatur, corpus
 emacrescit, os, suræ, pedes intumescunt. Vbi ve-
 tus morbus est, digiti in manibus pedibusq; sub
 tumore conduntur, febricula oritur, quæ faciliè
 tot malis obrutum hominem consumit. Protinus
 ergo inter initia sanguis per biduum mitti de-
 bet, aut nigro veratro venter solui, adhibenda
 tum quanta sustineri potest, inedia est, paulum
 deinde vires reficienda, & ducenda aluus: post
 hæc, ubi corpus leuatum est, vtendum est exer-
 citatione, præcipueq; cursu, sudor primum labore
 ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus
 euocandus, frictio adhibenda, moderandumq;
 inter hæc, vt vires conseruentur, balneum ra-
 rum esse debet. Cibus sine pinguibus, sine gluti-
 nosis, sine inflantibus. Vinum præter quàm pri-
 mis diebus, rectè datur. Corpus contrita planta-
 go, & illita, tueri optime videtur.

De Attonitis, & eorū curatione. CAP. XXVI.

Attonitos quoq; raro videmus, quorum &
 corpus & mens stupet. Fit interdum iclu
 fulminis, interdum morbo, ἀποπλεξία hunc
 Græci appellant. His sanguis mittendus est. Ve-
 ratro quoque albo, vel alui ductione vtendum.
 Tum adhibenda frictiones, & ex media mate-
 ria minime pingues cibi, quidam etiam acres,
 & à vino abstinendum.

De resolutione neruorum, quæ Apoplexia vel
 παράλυσις dicitur. CAP. XXVII.

At

AT resolutio neruorum, frequens ubiq; mor-
 bus est. Sed interdum tota corpora, inter-
 dum partes infestat. Veteres autores illud Ἀπο-
 πλεξία, hoc Paralyfin nominauerunt. Nunc
 utrumq; Paralyfin appellari video. Solent autem
 qui per omnia membra vehemēter resoluti sunt,
 celeriter rapi, ac si correcti non sunt, diutius qui-
 dem viuunt, sed rarò tamen ad sanitatem perue-
 niunt, & plerumq; miserum spiritum trahunt,
 memoria quoq; amissa. In partibus verò nunquā
 acutus, saepe longus, ferè sanabilis morbus est. Si
 omnia membra vehemēter resoluta sunt, sangui-
 nis detractio vel occidit, vel liberat. Aliud cu-
 rationis genus, vix vnquam sanitatem restituit,
 saepe mortem tantum differt, vitam interim in-
 festat. Post sanguinis missionē, si non redit, &
 motus & mens, nihil spei superest. Si redit, sa-
 nitas quoque prospicitur. At ubi pars resoluta
 *providet est, *proderit malo corporis, vel sanguis missus,
 vel alius ducta. Cetera eadem in utroq; casu fa-
 cienda sunt. Siquidem vitare præcipue conuenit
 frigus, paulatimq; ad exercitationes reuertendū
 est, sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest. Si
 id crurum imbecillitas prohibet, vel gestetur,
 vel motu lecti concutiatur, tum id membrum,
 quod deficiet, si potest, per se: si minus, per
 alium moueatur, et vi quadam ad consuetudinē
 *torpenti suam redeat. Prodest etiam *torpentis membra
 bus mem summam cutem exasperasse, vel vrticis casam,
 bris vel imposito sinapi, sic ut ubi rubere cæperit
 corpus,

corpus, hæc remoueat. Scilla quoq; contrita, bulbiq; contriti cum thure recte imponuntur. Neq; alienum est, resina cutem tertio quoque die diutius vellere, pluribus etiam locis, aliquando sine ferro cucurbitulis admoere. Vnctioni vero aptissimum est vetus oleum, vel nitrum aceto & oleo mistum. Quinetiam fouere aqua calida marina, vel si ea non est, tamen salsa magnopere necessarium est. At si quo loco vel naturales, vel etiam manu facte tales natationes sunt, ijs potissimum vtendum est, præcipueq; in his agitando membra, que maxime deficiunt. Si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeq; ex venatione: potio sine vino aquæ calidæ. Si tamen vetus morbus est, interponi, quarto vel quinto die purgationis causa vinum Græcū, salsum prodest. Post cænā utilis vomitus est. Interdum verò etiam nervorum dolor oriri solet. In hoc casu non oportet vomere, non medicamentis vrinā mouere, non sine exercitatione sudores, vt quidā præcipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die. In lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est, deinde retento spiritu, ab ipsa exercitatione potius superiores partes mouendæ, balneo raro vtendum, mutandum subinde peregrinationibus cælum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo nitro ex aqua perungenda est, deinde inuoluenda, & subiicienda pruna lenis, & sulphur, atq; ita id suffumigandum, idq; aliquandiu faciendum. Sed ieiuno, cum bene

m

iam


iam concoxerit, cucurbitula quoque sepe dolenti
 parti admouenda sunt, pulsandusq; leuiter infla-
 tis vesicis bubulis is locus est. Vtile est etiam se-
 num miscere cum hyoscyami & vrticæ contri-
 tis seminibus, sic, vt omnium par modus sit, idq;
 imponere, fouere aqua, in qua sulphur decoctum
 sit. Vtriculi quoque rectè imponuntur aqua ca-
 lida repleti, aut bitumen cum hordeacea farina
 mixtum, atque in ipso potissimum dolore uten-
 dum gestatione vehementi est, quod in alijs do-
 loribus pessimum est. Tremor autem neruorum
 æquè vomitu, medicamentisq; vrinam mouen-
 *impedi- tibus *intenditur. Inimica etiam habet balnea,
 tur affusq; sudationes. Bibenda aqua est, acri am-
 bulatione utendum, item vnctionibus, frictioni-
 busq; maxime per seipsum, pila, similibusq; su-
 periores partes dimouenda, cibo quolibet uten-
 dum, dummodo concoctioni vtique studeatur.
 Secundum cibum curis abstinentium. Rarissima
 venere utendum est. Si quando quis in eam pro-
 lapsus est, tum oleo leuiter diuq; in lectulo per-
 fricari manibus puerilibus potius, quàm viri-
 libus debet. Suppurationes autem, quæ in ali-
 qua interiori parte oriuntur, vbi notæ fuerint,
 primum id agere oportet per ea cataplasmata
 quæ reprimunt, ne coitus inutilis materiæ fiat.
 Deinde, si hæc victa sunt, per ea malagmata
 quæ digerunt, dissipentur. Quod si consecuti non
 sumus, sequitur vt euocetur, deinde vt mature-
 scat, omnis tunc vomica finis est, vt rumpatur.
 Indic

Indiciūq; est, pus vel alio, vel ore redditum: sed nihil facere oportet, quominus quicquid est puris excedat. Utendum maxime sorbitionibus est & aqua calida. Vbi pus fieri desit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen validiores et frigidos cibos, frigidamq; aquam, sic ut ab egelidis tamē initium fiat, primoq; cum melle quædam edenda, ut nuclei pinei, vel Græcæ nuces, vel auellane. Postea submouendum idipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamētum eo tempore vlceri est succus assumptus, vel porri, vel marrubij, & omni cibo porrum ipsum adiectum. Oportebit autem uti in his partibus, quæ non afficiuntur, frictionibus, item ambulationibus lenibus. Vitandumq; erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione sanescientia vlcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoq; omnimodo cauendus sanguinis vomitus est.

LIBER IIII.

De humani corporis interioribus sedibus.

CAP. I.



ACTENVS reperiuntur ea genera morborum, quæ in totis corporibus ita sunt, ut ijs certæ sedes assignari non possint. Nunc de his dicam, quæ sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi curationesq; in notiam

m 2

tiam

tiam venient, si prius eorum sedes breuiter ostendero. Caput igitur eaq; quæ in ore sunt, non lingua tantummodo, palatoq; terminantur, sed etiã quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraq; circa guttur venæ grandes, quæ σφαγίτιδες nominantur, itemq; arteriæ (quæ parotidas vocant) sursum procedentes vltra aures feruntur. Atq; in ipsis cervicibus glandulæ posite sunt, quæ interdum cum dolore intumescunt.

Deinde duo itinera incipiunt. Alterum asperã arteriam nominant, alterum stomachum. Arteria exterior ad pulmonem: Stomachus interior ad ventriculũ fertur. Illa spiritum, hic cibum recipit: à quibus cum diuersæ viæ sint, qua coeunt, exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est, quæ cum spiramus attollitur, cum cibum potionemq; assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria, dura, & cartilaginosa in gutture assurgit, cæteris partibus residet. Constat ex circulis quibusdam compositis ad imaginem earum vertebrarũ, quæ in spina sunt: ita tamen, vt ex parte exteriori aspera, ex interiore stomachi modo leuis sit, eaq; descendens ad præcordia cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoq; spiritus capax & à tergo spinæ ipsi iunctus in duas fibras vngulæ bubulæ modo, diuiditur. Huic cor annexum est, natura musculosum in pectore, sub sinistro mamma situm, duosq; quasi ventriculos habet. At sub corde atq; pulmone transversum ex valida membrana septum est, quod à præ

Stomach^o
hic pro i-
psa gula ac-
cipitur, vt
& infra li-
bro 4. cap.
5. quamuis
aliquando
& pro ven-
triculi par-
te inferio-
ri stoma-
chi vocabu-
lo vtatur
Celsus, vt
cũ ait,
Stomach^o
verò inte-
riorũ præ-
cipuũ est.

à præcordijs vterum diducit æquò nervosum,
 multis etiam venis per id discurrentibus à su-
 periore parte, non solum intestina, sed iecur quo-
 que lienemq; discernit. Hæc viscera proxima,
 sed infrà tamen posita dextra sinistraq; sunt. Ie-
 cur à dextra parte sub præcordijs ab ipso septo
 ortum, intrinsecus cauum, extrinsecus gibbum,
 quod prominens leuiter ventriculo insidet, &
 in quatuor fibris diuiditur. Ex inferiore ve-
 ro parte ei fel inheret, at lienis sinistra non ei-
 dem septo, sed intestino innexus est, natura
 mollis & rarus, longitudinis, crassitudinisq;
 modicæ, isq; paulum à costarum regione in vte-
 rum excedens ex maxima parte sub his condi-
 tur, atque hæc quidem iuncta sunt. *Renes verò* Renes.
 diuersi, qui lumbis sub imis coxis inheret à par-
 te earum refimi, ab altera rotundi, qui & venosi
 sunt, & vetriculos habent, & tunicis super con-
 teguntur. Ac viscerum quidem hæc sedes sunt.
 Stomachus verò, qui intestinorum principium Stoma-
chus.
 est, nervosus à septimæ spinæ vertebra incipit,
 ac circa præcordia, cum ventriculo committi-
 tur. Ventriculus autem, qui receptaculum ci- Ventricu-
lus.
 bi est, constat ex duobus tergoribus, isq; inter
 lienem & iecur positus est, vtroque ex his pau-
 lum super eum ingrediente. Suntq; etiam mem-
 branulae tenues, per quas inter se tria ista con-
 nectuntur, iungunturq; ei septo, quod transuersum
 esse suprà posui. Inde ima ventriculi pars pau-
 lum in dexteriore partem conuersa, in summum

intestinum coarctatur. Hanc iuncturam *πυλωγον*
 Græci vocant, quoniam portæ modo in inferio-
 res partes, ea quæ excreturi sumus, emittit. Ab
 Ieiunū in- ea ieiunum intestinum incipit, non ita impli-
 testinum. citum; cui tale vocabulum est, quia nunquam
 quod accipit, continet: sed protinus in inferiores
 partes transmittit. Inde tenue intestinum est, in
 Tenue in- sinus vehementer implicitum. Orbes verò eius
 testinum. per membranulas singuli cum inferioribus con-
 nectuntur, qui in dexteriores partē conuersi, et
 è regione dexteroris coxæ finiti, superiores ta-
 men partes magis complent. Deinde id intesti-
 num cum crassiore altero transuerso cōmittitur,
 quod à dextra parte incipiens, in sinistro
 peruium & longum est, in dexteriores non est,
 Cæcum in- ideoq; cæcum nominatur. Ad id quod peruium
 testinum. est, late fusum atq; sinuatum, minusq; quàm su-
 periora intestina nervosum, ab utraq; parte huc
 atq; illuc volutū, magis tamen sinistrores infe-
 rioresq; partes tenens, contingit iecur atq; ven-
 triculum. Deinde cū quibusdam membranulis à
 sinistro rene venientibus iungitur, atq; hinc de-
 extra recuruatum in imo dirigitur quæ excernit,
 Rectū in- ideoq; id ibi rectum intestini nominatur. Con-
 testinum. tegit verò vniuersa hæc omentum ex *interiore
 Omentū. *inferiore parte leue & strictum, ex superiore mollius. Cui
 adeps quoq; innascitur, quæ sensu, sicut cerebrū
 quoq;, & medulla, caret. At à rebus singulæ
 venæ colore albæ ad vesicam feruntur, *ἡγντῆγες*
 Græci vocant, quod per eas inde descendentes
 urinam

urinam in vesicam destillare concipiunt. Vesica autem in ipso sinu nervosa & duplex, ceruice plena atq; carnosâ, iungitur per venas cum intestino, eoq; osse, quod pubi subest. Ipsa soluta atq; liberior est, aliter in viris atq; in fœminis posita. Nam in viris iuxta rectum intestinum est potius in sinistram partem inclinata. In fœminis super genitale eari posita est, superq; elapsa ab ipsa vulua sustinetur. Tum in masculis iter urine spatiosius, & compressius à ceruice huius descendit ad colem. In fœminis breuius & plenius super vuluæ ceruicem se ostendit. Vulua autem in virginibus quidem admodum exigua est. In mulieribus vero, nisi ubi grauidæ sunt, non multo maior, quàm ut manu comprehendatur. Ea recta continuataq; ceruice (quem canalem vocant) contra mediam aluum orsa, inde paulum ad dexteriores coxam conuertitur, deinde super rectum intestinum progressa illius fœminæ latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas & pubem imo ventre posita sunt, à quibus ac pube abdomen sursum versus ad præcordia peruenit, ab exteriori parte euidenti cute, ab interiori leui membrana inclusum, quæ omento iungitur, περιτόναι. & autem à Græcis nominatur.

Canalis.

De curationibus morborum, qui nascuntur à capite: & primò de eius dolore, deinde de morbo, qui circa faciem nascitur, tum de linguæ resolutione, postremò de destillatione, ac grauedine.

CAP. II.

m 4 His

HIs veluti in conspectum quendam (quatenus scire curanti necessarium est) adductis, remedia singularum laborantium partium exequar, orsus à capite: sub quo nomine nunc significo eam partem, quæ capillo tegitur. Nam oculorum, aurium, dentium dolor, & si quis similis est, aliàs erit explicandus. In capite autem interdum acutus & pestifer morbus est, quem *νεφθαλμία* Greci vocant. Cuius notæ sunt horror calidus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic ut vox supprimatur, vel sanguinis ex naribus cursus, sic ut corpus frigescat, anima deficiat. Præter hæc dolor intolerabilis maximè circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neq; grauis, neq; periculosa, per hominis ætatem est. Interdum grauior dolor, sed brevis, neq; tamen mortiferus, qui vel vino, vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut sole contrahitur. Hiq; omnes dolores modò in febre, modò sine hac sunt, modò in toto capite, modò in parte, interdum sic, ut oris quoq; proximam partem excrucient. Præter hæc etiam unum inuenitur genus, quod potest longum esse, ubi humor cutem inflat, eaq; intumescit, & prementi digito cedit, *ὀδονέφαλον* Græci appellant. Ex his, id quod secundo loco positum est, dum leue est, qua sit ratione curandum dixi, cum persequerer ea, quæ sani homines in imbecillitate partis alicuius facere deberent. Quæ verò auxilia sint capitis, ubi cum febre dolor est, eo loco explici

explicitum est, quo februm curatio exposita est. Nunc de ceteris dicendum: Ex quibus id quod acutum est, & id quod supra consuetudinem intenditur, idq; quod ex subita causa, etsi non pestiferum, tamen vehemens est, primam curationem habet qua sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis est dolor, superuacuum est. Satiusq; est abstinere à cibo, si fieri potest, etiam à potione. Si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor remanet, aluum ducere, sternutamenta euocare, nihil assumere, nisi aquam. Sæpe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit, utiq; si ex vino vel cruditate origo est. Si verò in his auxilij parum est, tonderi oportet ad cutem: deinde considerandum est, quæ causa dolorem excitarit: si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit, spongiam concavam imponere subinde in aqua frigida expressam, ungere rosa & aceto, vel potius his tinctam lanam succidam imponere, aliaq; refrigerantia cataplasmata. Ac si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida maritima, vel certè salsa, aut in qua laurus decocta sit, tum caput vehementer perfricare, deinde calido oleo implere, veste velare. Quidam etiam id deuinciunt. Alij cervicalibus vestimentisq; onerant, & sic leuantur, alios calida cataplasmata adiuuant. Ergo etiam ubi causa incognita est, videre oportet, refrigerantia magis, an calefacientia leniant, & his uti, quæ experimentum approbarit. At si

Aqua frigida.

m s parum

parum caussa discernitur, perfundere caput primum aqua calida, sicut supra præceptum est, vel salsa, vel ex lauro decocta, tñ frigida posca. Illa in omni vetusto capitis dolore communia sunt, sternutamenta excitare, inferiores partes vehementer perfricare, gargarizare his, quæ salinæ mouent, cucurbitulis temporibus & occipitio admouere, sanguinem ex naribus detrahare, resina subinde tempora peruellere, & imposito sinapi exulcerare ea quæ male habent, antè lintheolo subiecto, ne vehementer arrodat: candentibus ferramentis ubi dolor est, vlcera excitare, cibum permodicum cum aqua sumere: ubi leuatus est dolor in balneū ire, ibi multa aqua prius calida, deinde frigida per caput perfundi. Si discussus ex toto dolor est, etiam ad vinum reuerti, sed postea semper antequam quicquam aliud, aquam bibere. Dissimile est id genus quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est. Deinde imponere sinapi, *profluit sic vt exulceret. Si id parum *profluit, scalpello vtendum est. Illa cū hydropicis communia sunt, vt exerceatur, insudet, vehementer perfricetur, cibis, potionibusq; vtatur, vrinam præcipuè mouentibus.

De morbo qui circa faciem nascitur, quem

Græci κνινὸς σπασμὸν vocant.

Circa faciem verò morbus innascitur, quem Græci κνινὸς σπασμὸν nominant. Is cū acuta serè febre oritur. Os cū motu quodam peruertitur,

uertitur, ideoq; nihil aliud est, quam distentio oris. Accedit crebra coloris in facie totoq; corpore mutatio. Somnus in proptu est. In hoc sanguinem mittere, optimum est. Si finitum eo malum non est, ducere aluum: si ne sic quidem discussum est, albo veratro vomitum mouere: præter hæc necessarium est vitare solem, lassitudinem, vinum. Sed si discussum his non est, vtendum est cursu, frictione, in eo quod laesum est, leni & multa, in reliquis partibus breuiore, sed vehementi: prodest etiam mouere sternutamenta, caput radere, idq; perfundere aqua calida, vel marina, vel certè salsa, sic vt ei quoq; sulphur adijciatur. post perfusionem iterum perfricari, sinapi māducare, eodemq; tempore affectis oris partibus ceratum, integris idem sinapi, donec arrodant, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

De resolutione linguæ.

AT si lingua resoluta est, quòd interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic vt sermo hominis non explicetur, oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepeta decocta sit, aquam bibere, caput & os et ea quæ sub mento sunt, & ceruicem vehementer perfricare, lasere linguam ipsam linere, māducare quæ sunt acerrima, id est sinapi, allium, cepam, magna viluclari, vt verba exprimantur, exerceri retento spiritu, caput saepe aqua frigida perfundere, nonnunquam multam esse radiculam,

diculam, deinde vomere.

De Destillatione ac Grauedine.

Destillat autē humor ex capite interdum in nares, quod leue est: interdum in fauces, quod peius est: interdū etiam in pulmonem quod pessimum est. Si in nares destillat, tenuis per h. is pituita profluit, caput leuiter dolet, grauitas eius sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, h. is exasperat, tussiculam mouet. Si in pulmonem, prater sternutamenta & tussim, est etiam capitis grauitas, lassitudo, sitis, aestus, biliosa vrina. Aliud autem (quamuis non multum distans malum) Grauedo est. Hæc nares claudit, vocem obtundit, tussim siccam mouet, sub eadem falsa est salua, sonant aures: venæ mouentur in capite, turbida vrina est. Hæc omnia negotias Hippocrates nominat. Nunc video apud Grecos in grauedine hoc nomen seruari, destillationes *νατασάγυς* appellari. Hæc autem & breuia, & si neglecta sunt, longa esse consueuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod pulmonē exulcerauit. Vbi aliquid eiusmodi sensimus, protinus abstinere à sole, balneo, vino, venere debemus. Inter quæ vniuersæ, & assueto cibo nihilominus vti licet, ambulatione tantum aceri, sed tecta vtendū est, & post eam caput atq; os supra quinquagies perfricandū. Raroq; fit, vt si biduo, vel certe triduo nobis temperauimus, id vitium non leuetur. Quo leuato, si in destillatione crassa facta pituita est, vel in grauedine nares magis

magis patent, balneo vtendum est, multaq; aqua prius calida, post egelida fouendum os, caputq; deinde cū cibo pleniore vinum bibendum. At si aequè tenuis die quarto pituita est, vel nares aequè clausæ videntur, assumendum est, vinum amineum, austerum, deinde rursus biduo aqua, post quæ ad balneum & ad cōsuetudinem reuertendum est. Neq; tamē illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tanquā egros agere, sed cætera omnia quasi sanis facienda sunt, præterquàm si diutius aliquē & vehementius ista sollicitare cōsueuerunt. Huic enim quedā curiosior obseruatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces destillauit, præter ea quæ suprà retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est, perfricanda vehementer inferiores partes, leuior frictio adhibenda thoraci erit, leuior capiti, demēda assueto cibo pars dimidia, sumenda oua, amyllum, similiaq; quæ pituitā faciunt crassiorē. Siti quanta maxime sustineri potest, pugnandū est. Vbi per hæc idoneus aliquis balneo factus, eoq; vsus est, adiiciendus est cibo pisciculus, aut caro, sic tamen ne protinus iustus modus cibi sumatur. Vino meraco copiosius vtendū est. At si in pulmonē quoq; destillat, multoq; magis & ambulatione, & frictione opus est, eademq; adhibita ratione in cibis, si nō satis illi proficiunt, acrioribus vtendum est, magis somno indulgendū, abstinentumq; à negotijs omnibus. aliquādo, sed serius, & balneum tentandum.

dum. In grauedine autem primo die quiescere, neq; esse, neq; bibere, caput velare, fauces lana circumdare, postero die surgere, diu abstinere à potione, aut si res coëgerit, non ultra heminam * tam aque assumere. Tertio die panis non* ita multum ex parte interiore cum pisciculo, vel leni carne sumere, aquam bibere. Si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore victu utatur, vomere. Vbi in balneum ventū est, multa aqua calida caput & os fouere vsq; ad sudorē, tum ad vinū redire: post quæ rix fieri potest, ut idem incōmodum maneat. Sed si manserit, utendū erit cibis frigidis, aridis, leuibus, humore quā minimo, seruatis frictionibus, exercitationibusq; quæ in omni tali genere valetudinis necessarie sunt.

De cernicis morbis, curationibūsq; CAP. III.

A Capite transitus ad ceruicē est, quæ grauius admodum morbis obnoxia est. Neq; tamen alius importunior, acutiorq; morbus est, quā is qui quodam rigore neruorum, modo caput scapulis, modo mentum pectori annectit, modo rectam & immobilem ceruicem intendit. Priorem Greci ὀπίσσω, insequentem ἐμπροσσω, ultimū τέταρον appellant, quamuis minus subtiliter, quidā indiscretis his nominibus utuntur. Ea sæpe intra quartum diem tollunt. Si hunc euaserunt sine periculo sunt. Omnia eadem ratione curantur, idq; conuenit. Sed Asclepiades utiq; mittendum sanguinem credidit. Quod quidam vitandum esse dixerunt, eò quod maxime
tum

tum corpus calore egeret, isq; esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neq; enim natura sanguinis est, ut utiq; caleat, sed ex his, quæ in homine sunt, is celerrime vel calefcit, vel refrigescit. Mitti verò nec'ne debeat, ex his intelligi potest quæ de sanguinis missione præcepta sunt. Vtiq; autē recte datur castoreum, & cum hoc piper vellaser. Deinde opus est fomento humido & calido. Itaq; pleriq; aqua calida multa ceruices subinde persundunt. Id in præsentia leuat, sed opportuniore nervos frigore reddit. Quod utiq; vitandum est. Utilius igitur est cerato liquido primum ceruicem perungere, deinde adnouere vesicas bubulas, vel vtriculos oleo calido repletos, vel ex farina calidum cataplasma, vel piper rotundum cum fico contusum. Utilissimum tamē est humido sale fouere. Quod quomodo fieret, iam ostendi. Vbi eorum aliquid factum est, adnouere ad ignem, vel si æstus est, in sole, ægrum oportet, maximeq; oleo vetere, si id non est, syriaco, si ne id quidem est, adipe quā vetustissima ceruicem, & scapulas, & spinas perfricare. Friclio cum omnibus in homine vertebis utilis sit, tum ijs præcipuē, quæ in collo sunt. Ergo die nocteq; interpositis tamē quibusdam temporibus, hoc remedio vtendum est. Dum id intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cauendū verò præcipuē frigus. Ideoq; in eo conclauī, in quo cubabit æger, ignis continuus esse debebit, maximeq; tempore

tempore antelucano, quo præcipue frigus intenditur. Neq; inutile erit, caput attensum habere, idq; irino vel cyprino calido madefacere, & superimposito pileo velare, nonnunquam etiam in calidum oleum totum descendere, vel in aquam calidam, in qua scænum græcum decoctum sit, et adiecta olei pars tertia. Alius quoq; ducta sepe superiores partes resoluit. Si verò etiam vehementius dolor creuit, admouendæ cervicibus cucurbitulæ sunt, sic, vt cutis incidatur, eadem aut ferramentis, aut sinapi adurendæ. Vbi leuatus est dolor, moueriq; ceruix cæpit, scire licet cedere remedijs morbum. Sed diu vitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus vtendum, itemq; ouis sorbilibus, aut à pullis mollibus ius aliquod assumendum. Id si bene processerit, iamq; ex toto recte se habere ceruices videbuntur, incipiendum erit à pulticula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam panis mandendus, quàm vinum gustandum. Siquidem huius vsus præcipue periculosus, ideoq; in longum tempus differendus est.

De faucium morbis, ac curationibus, & primum de Angina, deinde de Difficultate spirandi, vltimo de Tussi. CAP. IIII.

V hoc autem morbi genus circa totam ceruicem, sic alterũ aequè pestiferũ acutumq; in faucibus esse consuevit. Nostri Anginam vocant, apud Græcos nomen prout species est. Interdum enim neq; rubor, neq; tumor vllus apparet,

ret, sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra solvantur, id $\sigma\omega\alpha\gamma\chi\lambda\omega$ vocant. Interdum lingua faucesq; cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultusq; est, id $\omega\varsigma\sigma\omega\alpha\gamma\chi\chi$ vocatur. Illa communia sunt, eger non cibum deuorare, non potionem potest, spiritus eius includitur. Lenius est, ubi tumor tantummodo, & rubor est, cetera non sequuntur, id $\pi\alpha\rho\alpha\sigma\omega\alpha\gamma\chi\lambda\omega$ appellant. Quicquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est, si non abundat, secundum est ducere aluum. Cucurbitula quoq; recte sub mento, & circa fauces admonetur, ut id quod strangulat, euocet. Opus est deinde fomentis humidis. Nam sicca spiritum elidunt. Ergo admouere spongiis oportet, quæ melius in calidum oleum, quam in calidam aquam subinde demittuntur. Efficacissimusq; est hic quoq; salis calidi succus. Tum commodum est hyssopum, vel nepeta, vel thymum, vel absinthium, vel etiam fursures, aut ficus aridis, aut mulsum aquam decoquere, eaq; gargarizare: post hæc, palatum ungere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est, polline etiam piperis id recte respergitur. Si per hæc parum proficitur, vltimum est incidere satis altis plagis sub ipsis maxillis supra collum, & in palato citra riuam, vel eas venas, quæ sub lingua sunt, ut per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si non fuerit eger adiutus, scire licet, malo victum esse. Si vero his morbus lenatus est, iamq; fauces, &

n cibum

cibum et spiritum capiunt, facilis ad bonam va-
letudinē recursus est. At interdum natura quoq;
adiuuat, si ex angustiore sede vitium transit in
latiorē. Itaq; rubore & tumore in præcordijs or-
to, scire licet fauces liberari. Quicquid autē eas
leuauit, incipiendum est ab humidis, maximeq;
aqua mulsa decocta, deinde assumēdi molles &
non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum
habitum reuertantur. Vulgò audio, si quis pullum
hirundinis ederit, angina toto anno non pericli-
tari, seruatumq; cum ex sale, cum is morbus vr-
get, comburi, carbonemq; eius contritū in aquam
mulsam (que potui datur) infricari, & pro-
desse. Id cum idoneos autores ex populo habeat,
neq; habere quicquam periculi possit, quamuis in
monumentis medicorum non legerim, tamen in-
serendum huic operi meo credidi.

De difficultate spirandi.

Est etiam circa fauces malum, quod apud
Græcos aliud atq; aliud nomē habet, prout
se intendit. Omne in difficultate spirandi con-
sistit. Sed hæc dum modica est, neq; ex toto stran-
gulat, *ἀσπνοια* appellatur. Cum vehementior
est, ut spirare ager sine sono & anhelatione non
possit, *ῥόδια*. Cum accessit id quoq; ne nisi re-
cta ceruice spiritus trahatur, *ὀρθόσπνοια*. Ex qui-
bus id, quod primum est, potest diutius trahi.
Duo insequentia acuta esse consuevit. His com-
munia sunt, quod propter angustias, per quas
spiritus euadit, sibilum elidit, dolor in pectore
præcord

præcordijsq; est, interdum etiam in scapulis, isq;
 modò decidit, modò reuertitur, ad hæc tussicula
 accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet in
 sanguinis detractiōe. Neq; id satis est, sed lacte
 quoq; venter soluendus est. Liquanda alius, in-
 terdum etiam ducenda, quibus extenuatum cor-
 pus incipit spiritum trahere commodius. Caput
 autē etiam in lecto sublime habēdum est, thorax
 fomentis, cataplasmatissq; calidis, aut siccis, aut
 etiam humidis adiuuandus est, et postea vel ma-
 lagma superimponendum, vel certe cceratum ex
 cyprino vel irino vnguento. Sumenda deinde ie-
 iunio potui malsa aqua, cum qua uel hyssopus co-
 cta, vel contrita capparis radix sit. Datur etiam
 vtiliter, aut nitrum, aut nasturtium, allium fri-
 ctum, deinde contritū & cum melle mistum, si-
 mulq; coquantur mel, galbanum, resina terebin-
 thina, & vbi coierunt, ex his quod fabæ magni-
 tudinem habet, quotidie sub lingua liquatur, aut
 sulphuris ignem non experti * pondo et quadrās, * pondo
 abrotani pondo in vini cyatho teruntur, idq; te- denarij &
 pefactum sorbetur. Est etiam non vana opinio quadrans,
 vulpinum iecur, vbi siccum & aridum factum pōdo dena-
 est, contundi oportere, polentamq; ex eo potioni ris in vini.
 aspergi, vel eiusdem pulmonem quā recentissi-
 mum assum, sed sine ferro coctum, edendum esse.
 Præter hæc sorbitionibus, & lenibus cibis vten-
 dum est, interdum vino tenui austero, nonnun-
 quam vomitu. Prosunt etiam quæcunq; vrinam
 augent, sed nihil magis quā ambulatio lenta
 n 2 penò

penè vsq; ad lassitudinem, frictio multa, præcipue inferiorū partium, vel in sole, vel ad ignem, & per seipsum, & per alios, vsq; ad sudorē. In interiore verò faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac plerique extrinsecus cataplasmatis calidis, fomentisq; humidis vtuntur. Volunt etiam vaporem calidum ore recipi, per quem molliores alij partes eius fieri dicunt, opportunioreq; vitio iam herenti. Sed si bene sic vitari morbus potest, tuta illa præsidia. Si metus eius est, superuacua sunt. Vtiq; autē perfricare fauces periculosum est: exulcerat enim, neq; vtilia sunt, quæ vrine mouendæ sunt apta, quia possunt dum transeunt, ibi quoq; pituitam extenuare, quam suppressi melius est. Asclepiades multarum rerū, quas ipsi quoq; secuti sumus, auctor bonus, acetum ait quam acerrimum esse sorbendū: hoc enim sine ulla noxa comprimere ulcera. Sed id suppressere sanguinem potest, ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei lycium est, quod idem quoq; æquè probat, uel porri, uel marubij succus, vel nuces Græcæ cum tragacantho contritæ, & cum passo mistæ, vel lini semē contritum, & cum dulci vino mistum. Exercitatio quoq; ambulandi, currendiq; necessaria est. Frictio à pectore vehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi verò esse debent, neq; nimium acres, neq; asperi, mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis quoq; caro, præcipueq; porrum, & quicquid cum hoc mistum est. Potionis quamminimū

num esse conuenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua mala cydoneum, palmulaeue decoctae sunt. Gargariationes quoque lenes: sin haeparum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neque acutum est, & potest esse non longum, curationem tamen maturam, ne vehementer & diu ledat, desiderat.

De Tussi.

Tussis verò ferè propter faucium exulcerationem molestae est, quae multis modis contrahitur. Itaque illis restitutis ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere, & vix cum vetus facta est eliditur, ac modò arida est, modò pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoque die bibere, spiritu retento currere, sed minime in puluere, ac lectione uti vehementi, quae primo impeditur à tussi, post eam vincit, tum ambulare, deinde per manus quoque exerceri, & pectus diu perfricare. Post haec quàm pinguis-simae ficus vncias tres supra prunas incoctas, esse. Prater haec si humida est, prosunt frictiones validae, cum quibusdam calefacientibus, sic, ut caput quoque siccum vehementer perfricetur. Item cucurbitulae pectori admotae, sinapi ex parte exteriori faucibus impositum, donec leuiter exulceret, potio ex menta, nucibusque; Graecis & amylo, primoque assumptus panis aridus, deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum ea vehementissime vrget, adiuuat vini austeri cyathus assumptus, dum ne amplius id interposito

n 3 temp

tempore aliquo, quàm ter aut quater fiat. Item laseris quàm optimi paulum deuorare opus est, porri vel marrubij succum assumere, scillam delingere, acetum ex ea, vel certe acre sorbere, aut cum spica allij contriti duos vini cyathos. Vtilis etiam in omni tussi est peregrinatio, nauigatio longa, loca maritima, natationes. Cibus interdum mollis, vt malua, vt vrtica: interdum acer, vt lac cum allio coctum, sorbitiones quibus laser sit adiectum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit, ouum sorbile sulphure adiecto, potus primum aqua calida, deinde inuicem alijs diebus hac, alijs vinum. Magis terreri potest aliquis, cum sanguinem expuit. Sed id modò minus, modò plus periculi habet. Exit enim modò ex gingiuis, modò ex ore, & quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine vlcere, sine gingivarum vllo vitio, ita vt nihil excreetur. Verum vt ex naribus, sic ex ore aliquando prorumpit. Atq; interdum sanguis profluit, interdum simile aquæ quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is a summis faucibus fertur, modò exulcerata ea parte, modò non exulcerata, sed aut ore venæ alicuius adaperto, aut tuberculis quibusdam natis, ex his sanguine erumpente. Quod vbi incidit, neque ledit potio aut cibus, neq; quicquam aut ex vlcere excreatur. Aliquando gutture & arterijs exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit. Interdum etiam fieri solet, vt aut ex pulmone, aut

ex

ex pectore, aut ex latere, aut iocinore feratur. Sæpe fœminæ, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc expuunt, autoresq; medici fuerunt, vel exesa parte aliqua sanguinem exire, vel rupta, vel ore alicuius venæ patefacto. Primam *διὰ βρωσίου*, secundam *ἐκ γυμώχασμου*, tertiam *ἀπὸ στόματος* appellant. Ultima minimè nocet, prima grauissimè. Ac sæpe quidem euenit, uti sanguinem pus sequatur: interdum autem qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt, si pus, si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia & periculosa genera morborum sunt. Si verò sanguis tantum fluit, expeditius & remedium & finis est. Neq; ignorari oportet, eis quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxæ'ue, aut post cursum vehementem vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocri profluvium, idq; per urinam redditum, ipsam quoque lassitudinem soluere. Ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit: si tamen in eius urina nihil nouabit. Neq; vomitum huius afferre periculum, etiam cum repetit, si antè confirmare & implere corpus licuit: & ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neque tussim aut calorem mouet. Hæc pertinent ad uniuersum. Nunc ad ea loca quæ proposui veniam. Si ex gingiuis exit, portulacam manducasse satis est: si ex ore, continuasse eo merum vinum: si id parum

proficit, acetum: si inter hæc quoque graui-
ter erumpit (quia consumere hominem potest) com-
modissimum est, impetum eius admota occipi-
tio cucurbitula, sic ut cutis quoque incidatur,
auertere. Si id mulieri, cui menstrua non serun-
tur, euenit, eandem cucurbitulam incisis ingui-
nibus eius admouere. At si ex faucibus, in-
terioribus ue partibus processit, & metus ma-
ior est, & cura maior adhibenda: sanguis mit-
tendus est, & si nihilominus ex ore processit,
iterum tertioq; & quotidie paulum aliquid,
protinus autem debet sorbere vel acetum, vel
etiam cum thure plantaginis aut porri succum,
imponendaq; extrinsecus supra id quod dolet la-
na succida ex aceto est, & id sponsa subinde
refrigerandum. Erasistratus horum crura quo-
que & femora, brachiaq; pluribus locis deliga-
bat. Id Asclepiades adeo non prodesse, ut etiam
inimicum esset, proposuit. Sed id sæpe commode
respondere experimenta testantur. Neque ta-
men pluribus locis deligari necesse est, sed sat est
infra inguina & super talos, summosq; hume-
ros, etiam brachia. Tum si febris urget, danda
est sorbitio, & potui aqua, in qua aliquid ex
his quæ aluum astringunt, decoctum sit: ac si
abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua
frigida, & molle quoque ouum dari potest po-
tui vel idem quod supra scriptum est, vel vinum
dulce, vel aqua frigida, sed sic bibendum erit,
ut sciamus huic morbo sitim prodesse: præter hæc
necessar

necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput huius quoque cubantis sublime esse debet, re-
 eleq; tondetur. Facies sepe aqua frigida fouen-
 da est. At inimica sunt vinum, balneum, ve-
 nus, in cibo oleum, acriora omnia, item calida
 fomenta, conclaue calidum & inclusum, multa
 vestimenta corpori iniecta, etiam fricationes,
 ubi bene etiam sanguis conquieuit. Tum verò in-
 cipiendum est à brachijs, cruribusq; à thorace
 abstinentum. In hoc casu per hyemem locis ma-
 ritimis, per æstatem mediterraneis opus est.

De stomachi morbis, & curationibus.

C A P. V.

Faucibus subest stomachus, in quo plura
 longa vitia incidere consuerunt. Nam mo-
 do ingens calor, modò inflatio hunc, modò in-
 flammatio, modò exulceratio afficit. Interdum
 pituita, interdum bilis oritur, frequentissimumq;
 est eius malum, quo resolvitur, neq; vlla re ma-
 gis aut afficitur, aut corpus afficit. Ut diuersa
 autem vitia eius, sic etiam remedia sunt. Vbi
 exæstuat, aceto cum rosa extrinsecus subinde fo-
 uendus est, imponendusq; pulvis cum oleo, &
 ea cataplasmata, quæ simul & reprimunt, &
 molliunt. Potui (nisi quid obstat) gelida aqua
 præstanda. Si inflatio est, prosunt admotæ cu-
 curbitulæ: neq; incidere cutem necesse est: pro-
 sunt sicca & calida fomenta, sed non vehemen-
 tissima. Interponenda abstinentia est. Vtilis in
 ieiuno potio est absinthij aut hyssopi aut rutæ.

n 5 Exerc

Exercitatio primò lenis, deinde maior adhibenda est, maximeq; quæ superiores partes moveat. Quod genus in omnibus stomachi vitijs aptissimum est. Post exercitationem opus est unctio-
ne, frictione, balneo quoque nonnunquam, sed rarius, interdum alui ductione. Cibis deinde calidis, neque instantibus, eodemq; modo calidis portionibus, primò aquæ, post, ubi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitijs precipiendum est, ut quo modo se quisque ager refecerit, eo ut sanus utatur. Nam redit huic imbecillitas sua, nisi ejusdem defendatur bona valetudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est, quam serè tumor & dolor sequitur, prima sunt quies & abstinencia, lana sulphurata circumdata, in ieiuno absynthium. Si ardor stomachum urget, aceto cum rosa subinde fouendus est, deinde cibus quidem utendum est modicis. Imponenda verò extrinsecus quæ simul & reprimunt & molliunt: deinde his detractis, utendum calidis ex farina cataplasmatibus, quæ reliquias digerant. Interdum alui ducenda. Adhibenda exercitatio, & cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem serè facienda sunt, quæ in faucibus exulceratis præcepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda. Adhibendi leues & glutinosi cibi, sed citra satietatem. Omnia acria atque acida remouenda. Vino, si febris non est, dulci: aut si id inflat, certe leni utendum, sed neq;
præfrig

præfrigido, neque nimis calido. Si verò pituita
 stomachus impletur, necessarius modò in ieiunio,
 modò post cibum vomitus est. Vtilis exercitatio,
 gestatio, nauigatio, frictio. Nihil edendum, bi-
 bendumq; , nisi calidum, vitatis tantum his, qua
 pituitam contrahere consuerunt. Molestius est,
 si stomachus bile vitiosus est. Solent autem hi,
 qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus
 hanc (& quidem quod pessimum est) atram vo-
 mere. His rectè aluus ducitur, potiones ex ab-
 synthio dantur: necessaria gestatio, nauigatio,
 & (si fieri potest) ex nausea vomitus, vi-
 tanda cruditas, sumendi cibi faciles & stoma-
 cho non alieni, vinum austerum. Vulgatissimum
 verò pessimumq; stomachi vitium est resolutio,
 id est cum cibi non tenax est, soletq; desinere ali-
 corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi muti-
 lissimum balneum est. Lectiones exercitatio-
 nesq; superioris partis necessarie. Item vnctio-
 nes, frictionesq; , hinc perfundi frigida, atque in
 eadem natare, canalibus eiusdem subycere etiam
 stomachum ipsum, & magis etiam à scapulis,
 id quod contra stomachum est. Consistere in fri-
 gidis, medicatisq; fontibus, quales cutiliarum
 *subcutiliarumq; sunt, salutare est. Cibi quoque
 assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter
 coquantur, quàm facile vitiantur. Ergo ple-
 rique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubu-
 lam coquant. Ex quo colligi potest, neque auem,
 neq; venationem, neque piscem dari debere, ni-
 si gen

*Symbrii

narumq;

De aquis

cutilijs, Pl

nius lib. 2.

cap. 95. ite

lib. 31. ca. 2.

& 6. de ijs-

dem & Vi-

trum? lib.

8. cap. 1.

si generis durioris. Potui quidem aptissimum est
vinum frigidum, vel certe bene calidum mera-
cam, potissimum rheticum, vel allobrogicum,
aliud'ne, quod & austerum & resina conditum
est: si id non est, quam asperrimum, maximeq;
signinum. Si cibus non continetur, danda aqua,
& eliciendus plenior vomitus est, iterumq;
dandus cibus, & tum admouenda duobus in-
tra stomachum digitis cucurbitula, ibiq; duabus
aut tribus horis continenda sunt. Si simul &
vomitus & dolor est, imponenda supra stoma-
chum est lana succida, vel spongia ex aceto, vel
cataplasma, quod refrigeret. Perfricanda verò
non diu, sed vehementer brachia, & crura, &
calefacienda. Si plus doloris est, infra præcor-
dia quatuor digitis cucurbitula utendum est,
protinus dandus panis ex posca frigida. Si non
continuit, post vomitum lenè aliquid ex his,
quæ non aliena stomacho sint. Si ne id quidē te-
nuit, singuli cyathi vini singulis interpositis ho-
ris, donec stomachus consistat. Valens etiam me-
dicamentum est radiculæ succus, valentius aci-
di punici mali, cum pari modo succi, qui ex dul-
ci punico malo est, adiecto etiam intubi succo &
menta, sed huius minima parte, quibus tantun-
dem, quantum in his omnibus est, aqua frigida
quamoptime miscetur. Id enim plus quam vi-
num ad comprimendum stomachum potest, sup-
primendus autem vomitus est, qui per se venit,
sic, si nausea est. Sed si coacuit intus cibus, aut
comp

computruit, quorum utrumlibet ructus ostendit, eijciendus est, protinusq; cibis assumptis iisdem quos proxime posui, stomachus restituentus. Vbi sublatu est præsens metus, ad ea redeundum est, quæ supra præcepta sunt.

De laterum doloribus.

C A P. VI.

Stomachus lateribus cingitur, atque in his quoq; vehementes dolores esse consuerunt, & initium vel ex frigore, vel ex iclu, vel ex nimio cursu, vel ex morbo est. Sed interdum id malum intra dolorem est, usq; modo tarde, modo celeriter soluitur: interdum ad perniciem quoq; procedit, oriturq; acutus morbus, qui pleuriticus à Grecis nominatur. Huic dolori lateris febris, & tussis accedit, & per hanc excreatur: si tolerabilis morbus est, pituita: si grauis, sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, quæ nihil emollitur. Idq; primo vitio grauius, secundo tolerabilius est. Remedium verò est magni & recentis doloris, sanguis missus. At siue lenior, siue vetustior casus est, vel superuacuum, vel serum id auxilium est, confugiendumq; ad cucurbitulas est, antè summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec vlcera pustulasq; excitet, & tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Præter hæc circumdare primum oportet latus ipsum lana sulphurata: deinde cum paulum, inflammatio se remisit, siccis & calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malagmata est. Si vetustior dolor remanet, nouissimè
resina

resina imposita discutitur. Utendum cibis, potio-
nibusq; calidis, vitandū frigus. Inter hæc tamen
non alienum, & extremas partes oleo & sul-
phure perfricare. Si leuata tussis est, leni lectione
uti, iamq; & acres cibos, & vinum meracius
assumere. Quæ à medicis præcipiuntur, ut tamē
sine his, rusticos nostros epota ex aqua herba tri-
xago satis adiunget. Hæc in omni lateris dolore
communia sunt, plus negotij est, si acutus quo-
que morbus is factus est. In hoc præter ea quæ
suprà posita sunt, hæc animaduertenda sunt, ut
cibus sit quammaxime tenuis & lenis, præci-
pueq; sorbitio, eaq; ex ptisana potissimum, aut
ius in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus
sit. Idq; non nisi tertio quoq; die detur, si tamen
per vires licebit: potio verò aqua mulsa, in qua
hyssopum aut ruta decocta sit. Quæ quibus tem-
poribus danda sint, ex ratione vel adiectæ, vel
leuatiæ febris apparebit, sic, ut in remissione
quàm maxima dent, cum eo tamen, ut sciamus
non esse eius generis tussi aridas fauces commit-
tendas. Sæpe enim, ubi nihil est quod excrea-
tur, cōtinuatur, & strangulat. Ob quam causam
dixi etiam peius id genus esse tussis, quod nihil,
quàm quod pituitam moueret. Sed hic vinum
sorbere, ut suprà præcepimus, morbus ipse non
patitur, in vicem eius cremor ptisanæ sumendus
est. Ut his autē in ipso morbi feruore sustinendus
eger est, sic ubi paulū is se remisit, alimenta ple-
niora & vini quoq; aliquid dari potest, dum
nihil

nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectione quoque manserit tussis, intermittere oportebit vno die, posteroque, cum cibo vini paulo plus assumere. Atque incipiente quoque tussi, tum non erit alienum (ut supra quoque positum est) vini cyathos sorbere. Sed in hoc genere valetudinis dulce, vel certe lene commodius est. Si malum inueterauit, athletico victu corpus firmandum est.

De viscerum morbis, & primo de Pulmone,
deinde de Iocinore, tum de Liene, postremo de Renibus. CAP. VII.

A Compagine verò corporis ad viscera trans-
eundum est, & in primis ad pulmonem
veniendum, ex quo vehemens & acutus mor-
bus oritur, quem peripneumonicon Græci vo-
cant. Eius hæc conditio est. Pulmo totus affici-
tur, hunc eius casum subsequetur tussis, bilem vel
pus trahens, præcordiorum, totiusque pectoris
grauitas, spiritus difficultas, magnæ febres,
continua vigilia, cibi fastidium, tabes. Id ge-
nus morbi plus periculi, quam doloris habet.
Oportet, si satis validæ vires sunt, sanguinem
mittere: si minores, cucurbitulas sine ferro præ-
cordijs admoecre. Tum si satis valet, gessando
egram, digerere: si parum, intra domum ta-
men dimouere. Potionem autem hyssopi dare,
cui ficus arida sit incocta, aut aquam mulsam,
in qua vel hyssopum vel ruta decocta sit. Fri-
ctione uti diutissime in scapulis, proximè ab his
in brach

in brachijs, & pedibus, & cruribus, leuiter contra pulmonem, idq; bis quotidie facere. Quod ad cibum verò pertinet, huic nec salsis opus est, neq; acribus, neq; amaris, neq; alium astringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est sorbitio ptisanæ, vel alicæ, vel oryzæ, cum qua recens adeps cocta sit. Cum hac sorbibile ouum, nuclei pinei ex melle, panis, vel elota alicæ, ex aqua mulsa: potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida: aut si æstas est, etiam frigida, nisi quid obstat. Hæc autem altero quoq; die crescente morbo dare satis est. Vbi in incremento constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, præterquam aqua egelida. Si vires desunt, adiuuandæ sunt aqua mulsa, prosuntq; aduersus dolores imposita calida fomenta, vel quæ simul & reprimunt & emolliunt. Prodest impositus super pectus sal bene contritus, cum cerato mistus, quia leuiter cutem erodit, eoq; impetum materiæ, quo pulmo vexatur, euocat. Vtile etiam aliquod malagma est ex his quæ materiam trahunt. Neque alienum est dum premit morbus, clausis fenestris ægrum continere. Vbi paulum lenatus est, ter aut quater die, fenestris aliquanto apertis, paruum aërem recipere. Deinde in refectiōe pluribus die-
 *uētricu- bus a vino abstinere, gestatione, frictioæ uti,
 lori: uel, sorbitionibus, & prioribus cibis adycere, ex
 tyruncu- oleribus porrum, ex carne ungulas, & sum-
 lorum. ma* trunculorum, atque pisciculos, sic, ut diu
 nihil

nihil molle & lene sumatur.

De iocinoris morbo, & curatione. CAP. VIII.

Alterius quoq; visceris morbus, id est, iocinoris aequè modò longus, modò acutus esse consuevit, ἰππατινὸν Græci vocāt. Dextra parte sub præcordijs vehemens dolor est, idemq; ad latus dextrum, et ad iugulum, humerumq; partibus eiusdem peruenit, nonnunquam manus quoq; dextra torquetur, horror calidus est. Vbi male est, bilis euomitur, interdū singultus propè strangulat. Et hæc quidem acuti morbi signa sunt: longioris verò, vbi suppuratio in iocinore est, dolorq; modo finitur, modò intenditur: dextra parte præcordia dura sunt, & tument, post cibum maior difficultas est, accedit maxillarum quædam resolutio, vbi inueterauit malum, venter & crura pedesq; intumescunt, pectus atque humeri, circaq; iugulum vtrunque extenuatur. Initio sanguinem mittere optimum est, tum venter soluendus est: si non potest aliter, per nigrum veratrum imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quæ reprimant, deinde calida quæ deducant, quibus rectè iris vel absinthium adijcitur, post hæc malagma. Dandæ verò sorbitiones sunt, omnesq; cibi & calidi, & qui non multum alant, & ferè qui pulmonis quoque dolori conueniunt, præterq; eos qui urinam mouent, potionesq; ad id efficaces. Vtilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepeta, amyllum, sisamum, lauri bacca, pini flos, herba
o sanguin

sanguinalis, menta, ex malo cotoneo medium, columbae iecur recens & crudum. Ex quibus quaedam per se esse, quaedam adijcere vel sorbitioni, vel potioni licet, sic tamen ut parca assumantur. Neque alienum est absynthium contritum ex melle, & pipere, eiusque catapotium quotidie deuorare: abstinendum utique est ab omnibus frigidis: neque enim res ulla magis iecur laedit. Frictionibus utendum in extremis partibus, vitandus omnis labor, omnis vehementior motus, ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, ictus, cursus, inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua: si hyems est, calida: si aestus, tepida. Item liberalisunctio, & in balneo sudor. Si uero iecur uomica laborat, eadem facienda sunt, quae in ceteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id scalpello aperiunt, ipsam uomicam adurunt.

De lienis morbo, & curatione. CAP. IX.

AT lienis ubi affectus est, intumescit, simulque cum eo pars sinistra, eaque dura est, & prementi renititur, uenter intentus est, aliquis etiam cruribus est tumor. Ulcera aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem uix recipiunt. In intenta ambulatione, cursuque dolor, & quaedam difficultas est. Hoc uitium quies auget. Itaque exercitatione & labore opus est, habita tamen ratione, ne febre mixta, si nimium processerit, excitetur. Vnctiones, frictionesque, & sudores necessary sunt. Dulcia omnia inimica sunt.

sunt. Item lac & caseus. Acida autem maxime
conueniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, &
magis etiam, quod scilla conditum est, expedit.
Edenda sunt salsamenta: uel olea ex muria dura
tincta in aceto lactuca, intubiq; & beta ex eo-
dem, ex sinapi asparagus, armoracia, pastina-
ca, ungula, rostra, aues macra, eiusdem generis
uenatio. Potui uero ieiuno dari debet absynthii
incoctum, at post cibum aqua à ferrario fabro,
in qua candens ferrum subinde tinctum sit.
Hac enim uel precipue lienem coercet: quod
animaduersum est in his animalibus, quæ apud
hos fabros educata, exiguos lienes habent. Po-
test etiam dari uinum tenue, austerum, omniaq;
in cibis & potionibus quibus urinae mouende
sunt, precipueq; ad id ualet, uel trifolij semen,
uel cumini, uel apium, uel serpillum, uel cythisus
uel portulaca, uel nepeta, uel thymum, uel hys-
sopum, uel satureia. Hac enim inde commodis-
simè uidentur humorem deducere. Lienis quo-
que bubulus utiliter esui datur: precipueq; eru-
ca & nasturtium lienem extenuant. Imponenda
quoq; extrinsecus sunt, quæ leuēt. Fit ex unguen-
to & palmulis, quod *μυγδαλαρεν* Græci uo-
cant. Fit ex lini & nasturtij semine, quo uinum
& oleum adijcitur. Fit ex cupresso uiridi, &
arida ficu. Fit ex sinapi, cui semi hircini à reni-
bus quarta pars ponderis adijcitur, teriturq; in
sale, et protinus imponitur. Multisq; modis huic
rei capparum aptum est. Nam & ipsum cum ci-

bo assumere, & muriam eius cum aceto sorbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem eius cum surfuribus, aut ipsum cappari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

De renum morbis, & curationibus. C A P. X.

ATrenes ubi affecti sunt, diu male habent. Peius est, si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquiescere, cubare molliter, solvere alium, si aliter non respondet, etiam ducere: saepe desiderare in aqua calida, neq; cibum, neque potionem frigidam assumere, abstinere ab omnibus salsis, acerbis, acidis pomis, bibere liberaliter, adijcere modò cibo, modò potioni piper, porrum, ferulam, album papauer. Quae maxime inde urinam mouere consuerunt. Auxilio quoque his exulceratis sunt, si adhuc vlcera purganda sunt, cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex pinu syluestri duodecim, anisi, quod tribus digitis sumi possit, croci paulum, contrita, & in duas mulsi potiones diuisa. Si verò dolor tantum leuandus est, eiusdem cucumeris semina triginta, ijdem nuclei viginti, nuces Graeae quinque, croci paululum, contrita & cum la-
 * at super Ele potui data, * ac insuper quoq; recte quaedam malagmata iniiciuntur, maximeq; ea, quae humori extrahendo sunt.

De intestinorum morbis, & primo de Cholera.

C A P. X I.

A visc

A Visceribus ad intestina veniendum est, quæ sunt & acutis, & longis morbis obnoxia. Primò equè facienda mentio est cholera, quia commune id stomachi, atq; intestinorum vitium videri potest. Nam simul & deiectio, & vomitus est, præterq; hæc inflatio est, intestina torquentur, bilis supra infraq; erumpit, primum aque similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba, nonnunquã nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc *χολέρα* Græci nominarunt. Præter ea verò quæ supra cōprehensa sunt, sæpe etiam crura manusq; contrahuntur, urget sitis, anima deficit: quibus concurrentibus non mirum est, si subito quis moritur. Neq; tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo ubi ista cæperunt, aquæ tepidæ quàm plurimum bibere oportet, & vomere. Vix unquam sine vomitu sequitur, sed etiam si non incidit, miscuisse tamen novam materiam corruptæ prodest, parsq; sanitatis est vomitum esse suppressum: si id incidit, protinus ab omni potione abstinentum est. Si verò tormina sunt, oportet frigidis, & humidis fomentis stomachum fovere: sed si venter dolet, iisdem egelidis, sic ut venter ipse mediocriter calentibus inueitur. Quòd si vehementer & vomitus, & deiectio, & sitis vexant, & adhuc subcruda sunt quæ vomuntur, nondum vno maturum tempus est, aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est, admouendumq; naribus est

pulegium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel menta, si nondum matura est. At cum discussa cruditas est, tum magis verendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad vinum. Id esse oportet tenue, odoratum, cum aqua frigida mistum, vel polenta adiecta, vel melle quoque assumere expedit, quotiesq; aliquid aut stomachus, aut venter effudit, toties per hac vires restituere. Erasistratus primo tribus vini guttis, aut quinis aspergendam potionem esse dixit, deinde paulatim merum adijciendum. Is si & ab initio vinum dedit, & metum cruditatis secutus est, non sine causa fecit. Si vehementem infirmitatem adiuuari posse tribus guttis putavit, erravit. At si inanis est homo, & crura eius contrahuntur, interponenda potio absinthij est. Si extremæ partes corporis frigent, ungenda sunt calido oleo, cui cere paulum sit adiectum, calidisq; somentis nutriendæ. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admouenda est, aut sinapi super imponendum. Vbi his constitit, dormire oportet, postero die utique à potione abstinere, die tertio in balneum ire, paulatim se cibo reficere: somno, quisquis facile acquiescit, itemq; lassitudine, & frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, aluum duci necessarium est, tum cibus, vinoq; utendum est, sed hic quidem morbus & acutus est, & inter intestina, stomachumq;

chumq; versatur, sic ut cuius potissimum partis sit, non facile dici possit.

De Cœliaco ventriculi morbo. CAP. XII.

IN ipsius verò ventriculi porta consistit is, qui & longus esse consuevit, νοιδιανός à Græcis nominatur. Sub hoc venter indurescit, dolorq; eius est. Alius nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit. Extremæ partes frigesunt. Difficulter spiritus redditur. Cōmodissimum est inter initia calida cataplasmata toto ventri imponere, ut dolorem leniant, post cibum vomere, atq; ita ventrē exinanire. Proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro ventri, & coxis ad-mouere. Ventrem ipsum liquare dato lacte, & vino salso frigido. Si tēpus anni patitur, etiam viridibus ficis, sic tamen, ne quis aut cibus aut humor vniuersus detur, sed paulatim. Ergo per interualla temporis sat est cyathos binos ternos'ue sumere, & cibum pro portione huius: commodeq; facit cyatho lactis cyathus aquæ mistus, & sic datus. Cibiq; inflantes, et acres uti-lio- res sunt, adeo ut lacti quoq; recte contritum allium adyiciatur. Procedente verò tempore opus est gestari, maximeq; nauigare, perfricari ter aut quater die, sic ut nitrum oleo misceatur, per-fundi aqua calida post cibum, deinde sinapi im-ponere per omnia membra, excepto capite, donec arrodatur & rubeat, maximeq; si corpus durum & virile est, paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quæ ventrem comprimunt.

Assa caro danda, valens & quæ non facile cor-
rumpatur: potui verò pluuiæ aqua decocta, sed
quæ per binos ternos' ve cyathos bibatur. Si ve-
tus vitium est, oportet laser quàm optimum ad
piperis magnitudinem deuorare, altero quoq; die
vinum, vel aquam bibere, interdum interposito
cibo singulos vini cyathos sorbere, ex inferiori
parte infundere pluuiæ aquam, ma-
ximeq; si dolor in imis partibus remanet.

De tenuioris intestini morbo. CAP. XIII.

INter ipsa verò intestina cōsistunt duo mor-
bi, quorum alter in tenuiore, alter in pleniore
intestino est. Prior acutus est. Insequens esse lon-
gus potest. Diocles Carystius tenuioris intesti-
ni morbum $\chi\omicron\gamma\delta\alpha\psi\omicron\nu$, plenioris $\epsilon\iota\lambda\epsilon\delta\omicron\nu$ nomina-
uit. A plerisq; video nunc illum priorem $\epsilon\iota\lambda\epsilon\delta\omicron\nu$,
hunc $\chi\omicron\gamma\delta\epsilon\omicron\nu$ nominari. Sed prior modò supra
umbilicum, modò sub umbilico dolorem mouet.
Fit ex alterutro loco inflammatio, nec aliud, nec
spiritus infrà transmittitur. Si superior pars af-
fecta est, cibus: si inferior, stercus per os reddi-
tur: si vtrumlibet vetus est, adiicitur periculo
vomitus biliosus, mali odoris, aut varius, aut ni-
ger. Remedium est sanguinem mittere, vel cu-
curbitulas pluribus locis admouere, nō ubiq; cu-
te incisa. Id enim duobus aut tribus locis satis
est. Ex cæteris spiritū euocare, abunde est. Tum
animaduertere oportet, quo loco malum sit. Solet
enim contra id timere. Et si supra umbilicum
est, alui ductio utilis nō est. Si infrà est, aluum
ducere

*κωλι-
νδν

ducere (vt Erasistrato placuit) optimum est, & sepe id auxilij satis est. Ducitur autem percolato ptisanæ cremore cum oleo & melle, sic vt præter ea nihil adiiciatur. Si nihil tumet, diuis manus imponere oportet, supra summum ventrem, paulatimq; deducere. Inuenietur enim mali locus qui necesse est renitatur, & ex eodem deliberari poterit, ducenda nec ne alius sit. Illa communia sunt, calida cataplasmata admouere, eaq; imponere à mammis vsq; ad inguina, & spinam, ac sepe mutare: brachia, cruraq; perfrire, demittere totum hominem in calidum oleum. Si dolor non quiescit, etiam in aluum ex parte inferiore tres, aut quatuor cyathos calidi olei dare. Vbi per hæc consecuti sumus, vt iam ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsum tepidum non multum. Nam antè magna cura vitandum est, ne quid bibat. Si id commodè cessit, adijcere sorbitionem. Vbi dolor & febricula quierunt, tum demum vti cibo pleniore, sed neq; inflante, neq; duro, neq; valido, ne intestina adhuc imbecilla ledantur, potui verò nihil præterquam puram aquam. Nam siue quid vinolentum, siue acidum est, id huic morbo alienum est. Ac postea quoq; vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, cæterosq; corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit, & siue cum frigus subit, siue aliqua iactatio, nisi bene iam confirmatis intestinis, reuertitur.

De morbo intestini plenioris. CAP. XIII.

IS autem morbus, qui in intestino pleniore est, in ea maxime parte est, quam cacam esse proposui. Vehemens inflatio, vehementes dolores dextra magis parte, intestinum quod verti videtur, propè spiritum elidit. In plerisq; post frigora, cruditatesq; oritur, deinde quiescit, & per iracundiam sæpe repetens, sic cruciat, ut vitæ spatio nihil demat. Vbi is dolor cæpit, admoovere sicca & calida fomenta oportet, sed primo lenta, deinde validiora, simulq; frictiones, ad extremas partes, id est, crura, brachiaq; materiam reuocare. Si discussum non est, qua dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum eius rei causa comparatum, quod *κολινδρον* nominatur. Id se reperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest potui datum, sed impositum quoq; extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem leuat. Nisi finito verò tormento, recte neq; cibis neq; potio assumitur. Quo victu sit utendum, qui hoc genere tentantur, iam mihi dictum est. Confectio medicamenti, quod *κολινδρον* nominatur, ex his constat: Costi, anesi, castorei, singulorum P. denariorum III. *. petroselini P. denariorum III. piperis longi, & rotundi, singulorum P. *. II. papaueris lacryma, iunci rotundi, myrrhæ, nardi, singulorum P. VI. *. quæ melle excipiuntur, id autem & deuorari potest, & ex aqua calida sumi.

De

De Torminibus, id est, δυσεντερίæ. CAP. XV.

Proxima his inter intestinorum mala, tormina esse consueverunt, δυσεντερίæ Græce vocatur, intus intestina exulcerantur. Ex his cruor manat. Isq; modò cū stercore aliquo semper liquido, modò cum quibusdam quasi mucosis excernitur, interdum simul quedam carnosæ descendunt. Frequens deijcendi cupiditas, dolorq; in ano est. Cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur. Atq; eo quoq; tormentum intenditur. Idq; post tēpus aliquod leuatur, exiguaq; requies est, somnus interpellatur, febricula oritur, longoq; tempore id malum cum inueterauerit, aut tollit hominem, aut etiam (si finitur) excruciat. Oportet in primis cōquiescere. Siquidem omnis agitatio exulcerat, deinde ieiunium sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquefolij sit adiecta, imponere cataplasmata super ventrem, quæ reprimunt, quod in superioribus ventris morbis nō expedit, quotiesq; desidit, subluere aqua calida, in qua decoctæ verbenæ sint, portulacam vel coctam, vel ex dura muria edisse, cibos, potionesq; eas, quæ astringunt aluum. Si vetustior morbus est, ex inferioribus partibus tepidum infundere, vel ptisinae cremorem, vel lac, vel adipem liquatam, vel medullam ceruinam, vel oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem album crudū ex ouis, vel aquam, in qua lini semen decoctum sit: vel si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in qua rosæ floris folia cocta

cocta sint. Leuant enim dolorem hæc, & mitiora vlcera efficiunt, maximeq; vtilia sunt, si cibi quoq; secutum fastidium est. Themison muria dura quam asperrima sic vtendum memorie prodidit. Cibi verò esse debent, qui leniter ventrem distringant, & ea quæ vrinam moueant. Si ea consecuta sunt, in aliam partem humorem auertendo, prosunt: si non sunt consecuta, noxam augment. Itaq; nisi in quibus promptè id facere consueuerunt, non sunt adhibenda. Potui si febricula est, aqua pura calida, vel ea quæ ipsa quoq; astringat, dari debet: si non est, vinum lene, austereum. Si pluribus diebus nihil remedia alia inuerunt, vetusq; iam vitium est, aquæ bene frigida potio assumpta vlcera astringit, & initium secunde valetudinis facit. Sed vbi venter suppressus est, protinus ad calidam potionem reuertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies pessimiq; odoris descendere, solet purus sanguis profluere. Si superius vitium est, aluus aqua mulsæ duci debet, tunc deinde eodem infundi, quæ supra comprehensa sunt. Valensq; est etiam aduersus vlcera intestinorum minij gleba, cum salis hemina contrita. Si minus, mista his aqua in aluum datur. Ac si sanguis profluit, cibi potionesq; esse debent, quæ astringant.

De læuitate intestinorum.

CAP. XVI.

EX torminibus interdum intestinorum læuitas oritur, quæ continere nihil possunt, et quicquid assumptum est, imperfectum protinus reddunt.

reddunt. Id interdum agros trahit, interdum
 precipitat. In hoc utiq; adhibere oportet com-
 primentia, quò facilius tenendi aliquid intesti-
 nis vis sit. Ergo & super pectus ponetur sinapi,
 exulcerataq; cute, malagma, quod humore euo-
 cet, & ex verbenis decoctis aqua desidat, & Desidat,
 cibos, potionesq; assumat, quæ aluum astringunt, subaudi æ-
 & frigidis utetur perfusionibus. Oportet tamen ger: sic in-
 prospicere, ne simul his omnibus admotis vitium fra cap.
 contrarium per immodicas inflationes oriatur. proxi.
 Paulatim ergo firmari intestina debebunt, ali-
 quibus quotidie adiectis. Et cum in omni fluore
 ventris, tum in hoc præcipue necessarium est, non
 quoties libet desidere, sed quoties necesse est, ut
 hæc ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris
 intestina deducat. Alterum quoq; quod æquè
 ad omnes similes affectus pertinet, in hoc ma-
 xime seruandum est, ut cum pleraq; utilia in-
 suauia sint, qualis est plantago, & rubi, et quic-
 quid mali corio mustum est, ea potissimum ex his
 dentur, quæ maxime ager volet. Deinde si o-
 mnia ista fastidiet, ad excitandam cibi cupidi-
 tatem interponatur aliquid minus utile, sed ma-
 gis gratum. Exercitationes, frictiones huic quoq;
 morbo necessarie sunt, & cum his sol, ignis, bal-
 neum, vomitus (ut Hippocrati visum est) etiam
 albo veratro (sic ætera parum proficient) eno-
 catus.

De Lumbricis aluum occupantibus.

C A P.

XVII.

Nonnum

Nonnunquam autem Lumbrici quoq; occupant alium, hiq; modò ex inferioribus partibus, modò sædius ore redduntur. Atq; interdum latos eos, qui peiores sunt, interdum teretes videmus. Si lati sunt, aqua potui dari debet, in qua lupinum aut cortex mori decoctus sit, aut cui adiectum sit, contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scamoneæ paulum. Veletiam pridie cum multum allium ederit, vomat. Posteroq; die mali punici tenues radículas colligat, quantum manu comprehendet, easq; contusas in aque tribus sextarijs decoquat, donec tertia pars supersit. Huc adiciat nitri paulum, & ieiunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potiones sumat, aut aque, vel murie duræ sic adiectæ, tum desidet subiecta calida aqua in pelue. Si verò teretes sunt, qui pueros maxime exercent, & eadem dari possunt, & quedam leniora, vt contritum semen vrticæ, aut brassicæ, aut cumini cum aqua, vel menta cum eadem, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex aqua mulsæ, vel nasturtij semen cum aceto contritum. Edisse etiam & lupinum, & allium
 in alui prodest, vel maluæ oleum subter dedisse.

De τριχοῦ intestinorum morbo.

CAP. XVIII.

Est autem aliud lenius omnibus proximis, de quibus supra dictum est, quod τριχοῦς Græci vocant, id neq; acutis, neq; longis morbis annumerari debet, cum & facile tollatur, neq;
 vngnam

unquam per se iugulet, in hoc aequè atq; in torminibus frequens desidendi cupiditas est, aequè dolor ubi aliquid excernitur. Descendunt autem pituite, nuciq; similia, interdum etiam leuiter subcruenta: sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoq; recte coacta: desiderare oportet in aqua calida, sæpiusq; ipsum manu nutrire, cui plura medicamenta idonea sunt, butyrum cum rosa, acacia ex aceto liquata, emplastrum id, quod $\tau\epsilon\tau\gamma\alpha\varphi\alpha\pi\mu\alpha\chi\alpha\sigma$ Græci vocant, rosa liquatum, alumen lana circumdatum, & ita appositum, eademq; ex inferiore parte indita, quæ torminum auxilia sunt, eadem verbenæ decoctæ, vbi inferiores partes foueantur, alternis verò diebus aqua, alternis leue & austerum vinum bibendum est. Potio esse debet egelida & frigida: prior ratio victus talis, qualem in tormina supra præcepimus.

De ventris fluxu, & curatione. CAP. XIX.

Leuior etiam dñ recens deiectio est, ubi & liquida aluus, & sæpius quàm ex consuetudine fertur: atque interdum tolerabilis dolor est, interdum grauissimus, idq; peius est: sed vno die fluere aluum sæpe pro valetudine est, atque etiam pluribus, dum febris absit, & intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, et quod intus læsurum erat, utiliter effunditur, verum spatium periculosum est. Interdum enim tormina, ac febriculus excitat, viresq; consumit: primo die quiescere satis est, neq; impetum

impetum ventris prohibere: si per se desit, balneo uti, paulum cibi capere: si mansit, abstinere non solum à cibo, sed etiam à potione. Postero die si nihilominus liquida aluus est, æquè conquiescere, paulum astringentis cibi sumere, tertio die in balneum ire, vehementer omnia præter ventrem perfricare, ad ignem lumbos, scapulisque admouere, cibus uti, sed ventrem contrahentibus, vino non multum meraco. Si postero quoque die fluet, plus edisse, sed vomere etiam ex toto, donec conquiescat. Contra sitim, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, ut post hanc animadversionem aluus non contrahatur. Alia via est ubi velis suppressere, cænare, deinde vomere, postero die in lecto conquiescere, vesperi vngi, sed leniter, deinde panis circa selibram, ex vino amineo mero sumere, tum assumere aliquid, maximeque: auem, et postea vinum idem bibere aqua pluuiali mistum, idque usque ad quintum diem facere, iterumque vomere. Frigidam autem assidue potionem esse debere, contra priores autores Asclepiades affirmavit, et quidem quam frigidissimam. Ego experimentis quæque in se credere debere existimo, calida potius an frigida utatur. Interdum autem euenit, ut id pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere, deinde postero die vesperi, tepido* loco vngi, cibum modicum assumere, vinum meracum quam asperrimum, impositam super ventrem habere cum cerato rutam.

* oleo

tam. In hoc autem affectu corporis neq; ambulatione, neq; frictione opus est, uehiculo sedisse, vel magis etiam equo prodest. Neque enim vlla res magis intestina confirmat. Si verò etiam medicamentis utendum est, aptissimum est id quod ex pomis fit. Vindemiæ tempore in grande vas coniicienda sunt pira, atq; mala syluestria: si ea non sunt, pira tarentina viridia, vel signina, mala scandiana vel amerina, myrrhappia, hisq; adijcienda sunt cotonea, & cum ipsis corticibus suis punica, sorba, & quibus magis utimur, etiam torminalia, sic ut hæc tertiam olæ partem teneant, tum deinde ea musto implenda est, coquendumq; id, donec omnia quæ indita sunt, liquata in unitatem quandam coeant. Id gustui non insuaue est, & quandocunque opus est, assumptum leuiter, sinâ vlla stomachi noxa ventrem tenet: duo aut tria cochlearia vno die sumpsisse, satis est. Alterum valentius genus est, myrti baccas legere, ex his vinum exprimere, id decoquere, ut decima pars remaneat, eiusq; cyathum sorbere. Tertium quod quandoque fieri potest, malum punicum excavare, exemptisq; omnibus seminibus, membranis quæ inter ea fuerunt, iterum coniungere, tum infundere cruda oua, rudiculaq; miscere, deinde malum ipsum super prunam imponere, quod dum humor intus est, non adurit. Vbi siccum esse cœpit, remouere oportet, extra-ctumq; cochleari, quod intus est, edisse. Aliquibus adiectis maius momentum habet. Itaq; etiam

Myrrhappia Plinius ab odore dicta esse dicit, li. 15. cap. 15.

p in

in piperatum coniicitur, misceturq; cum sale, & pipere: est quid ex his edendum, est pulticula etiam, cum qua paulum ex fauo vetere coctum sit, & lenticula cum malo corio cocta, rubiq; cacumina in aqua decocta, & ex oleo atque aceto assumpta, efficacia sunt, atque ea aqua, in qua vel palmula, vel malum cotoneum, uel arida sorba, vel rubi decocti sunt, potata. Quod genus si-
 Potio qua astringat. gnifico, quoties potionem dandam esse dico, quae astringat. Tritici quoque hemina in vino amineo austero decoquitur, idq; triticum ieiuno, ac sitienti datur, superq; id vinum id sorbetur, quod iure valentissimis medicamentis annumerari potest, atque etiam potui datur vinum signinum, vel resinatum austereum, vel quodlibet austereum. Contunditurq; cum corticibus, seminibusq; suis punicum malum, vinoq; tali miscetur, idq; vel merum sorbet aliquis, vel bibit mistum. Sed medicamentis uti, nisi in uehementibus malis superuacuum est.

De vuluæ morbo, & curationibus. CAP. XX.

EX vulua quoque sæminis vehemens malum nascitur, proximeq; ab stomacho vel afficitur hæc, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat, ut tanquam comitali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spume profluunt, nec nervi distenduntur, sopor tantum est, idq; quibusdam sæminis crebro reuertens, perpetuum est. Vbi incidit, si satis virium est, sanguis missus adiunat.

Si

Si parum est, cucurbitula tamen defigenda sunt in inguinibus. Si diutius aut iacet, aut alioqui iacere consuevit, ad mouere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, uel aliud ex his quæ sædioris esse odoris retuli, quod mulierẽ excitet. Idemq; aquæ frigida perfusio efficit, adiuuatq; ruta contrita cum melle, uel ex cyprino ceratum, uel quodlibet calidum, & humidum cataplasma, naturalibus pubetenus impositũ. Intra hæc etiam perfricare coxas, & poplites oportet. Deinde ubi ad se redit, circumcidendum uinum est in totum annum, etiam si casus idem non reuertitur. Frictione quotidie utendum totius quidem corporis, præcipuè uerò uentris & poplitũ. Cibus ex media materia dandus. Sinapi super imum uentrem, tertio quoque, aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire commodè uidetur solanum in lac demissum, deinde contritum, & cera alba, atque medulla ceruina cum irino, aut seuum taurinum, uel caprinum cum rosa mistum. Dandum potui etiam uel castoreum est, uel git, uel anethum. Si parũ pura est, purgatur iunco quadrato: si uerò uulua exulcerata est, ceratum ex rosa fiet, & recens suilla adeps, & ex ouis album misceatur, idq; apponatur, uel album ex ouo cum resâ mistum, adiecto quo facilius consistat, contritæ rosæ puluere. Dolens uerò ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitula cute incisa

p 2 inguin

inguinibus, vel etiam sub mammis adnotæ: si
 *coëuntia maligna purgatio est, subiicienda sunt, *co-
 ercentia. Id faciunt etiam albæ oliuæ, & ni-
 grum papauer cum melle assumptum, & gum-
 mi cum trito semine apij liquatum, & cum cya-
 tho passi datum. Præter hæc in omnibus vesicæ
 doloribus idoneæ potiones sunt, quæ ex odoribus
 fiunt, id est spica nardi, croco, cinnamomo, castia,
 similibusq; Idemq; etiam decocta lentiscus præ-
 stat. Si tamen intolerabilis dolor est, & sanguis
 profluit, etiam sanguinis detractio apta est, aut
 certè coxis adnotæ cucurbitule cute incisa. At
 cum vrina super potionum modum etiam sine
 dolore profluens, maciem, & periculum facit, si
 tenuis est, opus est exercitatione & frictione,
 maximeq; in sole vel ad ignem. Balneum rarum
 esse debet, neque longa in eo mora, cibus compri-
 mens. Vinum austerum meracum, per æstatem
 frigidum, per hyemē egelidum, sed tantū, quan-
 tum minimum sit. Infima aluus quoque vel du-
 cenda, vel lacte purganda est. Si crassa vrina
 est, vehementior esse debet & exercitatio, &
 frictio, longior in balneo mora cibus opus est te-
 neris, vinum idem. In utroq; morbo vitanda o-
 mnia sunt, quæ vrinam mouere consuerunt.

De nimia profusione seminis ex naturalibus.

C A P. X X I.

Est etiam circa naturalia vitium, nimia
 profusio seminis, quod sine venere, sine no-
 cturnis imaginibus sic fertur, ut interposito spa-
 tio

tio tabe hominem consumat. In hoc affectu salu-
tares sunt vehemētes frictiones, perfusiones, na-
tationesq; quā frigidissimæ, neq; cibi, nec po-
tio, nisi frigida assumpta. Vitare autem oportet
cruditates, omnia instantia, nihil ex his assume-
re, quæ contrahere semen videntur, qualia sunt,
siligo, simila, oua, alica, amyllum, omnis caro glu-
tinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neq; alie-
num est fouere inferiores partes, aqua decocta
ex verbenis comprimentibus, ex iisdem aliqua
cataplasmata imo ventri inguinibusq; circun-
dare, præcipueq; ex aceto rutam vitare, etiam
ne supinus obdormiat.

De coxarum morbis, & curationibus.

C A P. XXII.

Superest vt ad extremas partes corporis ue-
niam, quæ articulis inter se conseruntur, ini-
tium à coxis faciam. Harum ingens dolor esse
consuevit. Isq; hominem sæpe debilitat, & quos-
dam non dimittit. Eoq; id genus difficilimè cu-
ratur, quod ferè post longos morbos vis pestife-
ra huc se inclinat, quæ vt illas partes liberat, sic
hanc ipsam quoque affectamprehendit. Fouen-
dum primum aqua calida est, deinde vtendum
calidis cataplasmatibus. Maxime prodesse vide-
tur aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex
aqua decocta mistus capparis cortex concisus,
vel lolij farina ex vino diluto cocta, & mista
cum acida fece: * quæ, quia refrigescunt, impone- * quæq; re
re noctu malagmata commodius est. Inule quoq; frigescent

p 3 radix

radix confusa, & ex vino austero postea co-
cta, & late super coxam imposita, inter valen-
tissima auxilia est. Si ista non soluerunt, sale
calido & humido vtendum est. Si ne sic quidem
finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute
ad mouende sunt cucurbitulae, mouenda vrina.
Aluus si compressa est, ducenda. Vltimum est,
& in veteribus quoque morbis efficacissimum,
tribus aut quatuor locis super coxam, cutem can-
dentibus ferramenti exulcerare. Sed frictione
quoque vtendum est, maximè in sole, & eodem
die saepius: quò facilius ea, quae coeundo nocue-
runt, dirigantur. Eaquae si nulla exulceratio est,
etiam ipsis coxis, sicut & ceteris partibus adhi-
benda est. Cum verò saepe aliquid exulcerandum
candenti ferramento sit, ut materia inutilis euoce-
tur, illud perpetuum est, non ut primum fieri potest,
huius generis ulcera sanare, sed ea trahere, donec
id vitium, cui per hac opitulantur, conquiescat.

De genuum doloribus, & cura. CAP. XXIII.

COxis proxima genua sunt, in quibus ipsis
nonnunquam dolor esse consuevit. In eisdem
autem cataplasmatibus, cucurbitulisque praesidium
est, sicut etiam cum in humeris, alijs'ue commis-
suris dolor aliquis exortus est. Equitare ei cui
genua dolent, inimicissimum omnium est. Omnes
autem eiusmodi dolores, ubi inueterauerunt,
vix citra vitionem finiuntur.

De articulorum doloribus, in manibus,
pedibusque. CAP. XXIII.

In

IN manibus pedibusq; articularum vitia frequentiora, longioraq; sunt, quæ in podagris, chiragris'ue esse consuerunt. Ea rarò vel castratos, vel pueros ante scæminæ coitum, vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentant. Vbi sentiri cœperunt, sanguis mittendus est. Id enim inter initia statim factum, sæpe annuam, nonnunquam perpetuam valetudinē totam præstat. Quidam etiam cum asinino * lotio epoto se * lacte eluissent, in perpetuū hoc malum euaserunt. Quidam cum toto anno à vino, mulso, venere sibi temperassent, securitatem totius vitæ consecuti sunt. Idq; vtiq; post primū dolorem seruandum est, etiam si quieuit. Quòd si iam consuetudo eius facta est, potest quidem aliquis esse securior his temporibus, quibus dolor se remisit. Maiorem verò curam adhibere debent hi, quibus id reuertitur. Quod fere vere, autumno'ue fieri solet. Cum verò dolor non vrget, manu gestari debet, deinde ferri, inambulatione leui se dimouere: & si podagra est, interpositis temporibus exiguis inuicē modò sedere, modò ingredi, tum antequam cibum capiat, sine balneo loco calido leuiter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida, deinde cibum sumere ex media materia interpositis rebus vrinam mouentibus, quotiesq; plenior est, euomere. Vbi dolor vehemens vrget, interest sine tumore i: sit, an tumor cum calore, an tumor iam etiam obcaluerit. Nam si tumor nullus est, calidū fomentis opus est. Aquam marinam, vel mu-


riam durā feruefacere oportet, deinde in peluem
 conijcere, & cum iam homo pati potest, pedes
 demittere, superq; pallam dare, & vestimento
 tegere, paulatim deinde iuxta labrum ipsum ex
 eadem aqua leuiter infundere, ne calor intus
 destituat, ac deinde noctu cataplasmata calefa-
 cientia imponere, maximeq; hibisci radicem ex
 vino coctam. Sin verò tumor calorq; est, vtilio-
 ra sunt refrigerantia, recteq; in aqua quā fri-
 gidissima articuli continentur: sed neque quoti-
 die, neque diu fit, ne nerui*ledantur. Imponen-
 dum verò est cataplasma quod refrigeret. Neque
 *in hoc tamen*in hoc ipso permanendū, sed ad ea trans-
 quotidie eundum, quæ sic reprimunt, vt emolliant. Si
 perm. maior est dolor, papaueris cortices in vino co-
 quendi, miscendiq; cum cerato sunt, quod ex ro-
 sa factum sit. Vel ceræ, & adipis suille tantun-
 dem vnā liquandum, deinde his vinum miscen-
 dum, atque vbi quod ex eo impositum est, inca-
 luit, detrahendum, & subinde imponendū aliud
 est. Si verò tumores etiam obcaluerunt, & do-
 lent, leuat sponsia, quæ imposita subinde ex oleo,
 vel aceto, vel aqua frigida exprimitur, aut pari
 portione inter se mista, pix, cera, alumen. Sunt
 etiam plura idonea manibus, pedibusq; malag-
 mata. Quod si nihil superimponi patitur, id
 quod sine tumore est, fouere oportet sponsia, quæ
 in aquam calidam demittatur, in qua vel papa-
 ueris cortex, vel cucumeris syluestris radix de-
 cocta sit, tum inducere articulis crocum cum suc-

eo papaueris, & ouillo lacte. At si tumor est, fouere quidem debet aqua* calida, in qua lenti- *egelida scus, alia'ue verbenae ex reprimentibus decocta sint: induci uero medicamentum ex nucibus amarum cum aceto tritis, aut ex cerussa, cui contritae herbae muralis succus sit adiectus. Lapis etiam qui carnem exedit, quem σαρκοφαγόν Græci vocant, excisus, sic ut pedes capiat, demissos eos cum dolent, retentosq; ibi leuare consuevit. Ex quo in Asia lapidi* Asio gratia est. Vbi dolor, & inflammatio se remiserunt, quod intra dies quadraginta fit, nisi vitium hominis accessit, modicis exercitationibus, abstinentia, vntionibus lenibus vtendum est: sic, ut etiam acopo, vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est. Quibus vero articulorum dolor certis temporibus reuertitur, hos antè & curioso victu cauere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, & crebriore vomitu, & si quis ex corpore metus est, vel alui ductione vti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit, ne in inferiores partes factus cursus pedes replet, cum euident sit omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri. Ex quocumque autem morbo quis inualefcit, si tardè confirmatur, vigilare prima luce debet, nihilominus in lecto conquiescere, circa tertiam horam leuiter vinctis manibus corpus permulcere. Deinde delectationis causa

P 3 (quant

(quantum iuuat) ambulare, circuncisa omni negotiosa cogitatione uel actione, tum gestari diu, multa fricatione uti, loca, cælum, cibos sæpe mutare. Vbi triduo, quatruiduo uel vinum bibit, uno aut etiam altero die interponere aquam. Per hæc enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, & ut maturè vires suæ recipiat. Cum ex toto verò conualuerit, periculosè vitæ genus subito mutabit, & inordinatè aget. Paulatim ergo debet omiſſis his legibus, eò transire, ut arbitrio suo viuat.

LIBER V.



DIXI de his malis corporis, quibus victus ratio maxime subuenit. Nunc transeundum est ad eam medicine partem, quæ magis medicamentis *purgat. His multum antiqui auctores tribuerunt, & Erasistratus, & hi qui se Empiricos nominauerunt, præcipue tamen Herophilus, deductiq; ab illo viri, adeo ut nullum morbi genus, sine his curarent. Multaq; etiam de facultatibus medicamentorum memoria prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andree, vel Apolloni, qui Mælys cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Asclepiades, non sine causa sustulit: & cum omnia ferè medicamenta stomachum ladan, maliq; succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam tranſt

transtulit. Verum ut illud in plerisq; morbis uti-
lius est, sic multa admodum corporibus nostris in-
cidere consuerunt, quæ sine medicamentis ad sa-
nitatem peruenire non possunt. Illud ante omnia
scire conuenit, quod omnes medicine partes ita
inmixte sunt, ut ex toto separari non possint, sed
ab eo nomen trahant, à quo plurimum petunt.
Ergo ut illa quæ victu curat, aliquando medi-
camentum adhibet, & illa quæ præcipuè medi-
camentis* purgat, adhibere etiam rationem vi-
ctus debet, quæ multum admodum in omnibus ma-
lis corporis proficit. Sed cum omnia medicamen-
ta proprias facultates habeant, ac sæpe simpli-
cia opitulentur, sæpe mixta, non alienum vide-
tur ante proponere & nomina, & vires, &
mixturas eorum, quo minor ipsius curationis ex-
sequentibus mora sit.

De simplicibus facultatibus quarūcūq; rerum,
ex quibus medicamenta fiunt, & primo de
his quæ sanguinem supprimunt. C A P. I.

Sanguinem supprimunt, atramentum suto-
rium, quod Græci χάλκαρυτον appellant,
chalcitis, acacia, & ex aqua lycium, thus, aloë,
gummi, plumbum combustum, porrum, herba
sanguinalis, creta vel cimolia vel figularis, mi-
sy, frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinæ, laria.
squama & ferri, & æris, atq; huius quoq; due
species sunt, alia tantum æris, alia rubri æris.

Quæ vulnus glutient.

C A P. II.
Glutius

Glutinant vulnus, myrrha, thus, gummi,
 præcipueq; acanthinum psilleum, traga-
 cantha, cardamomum, bulbi, lini semen, nastur-
 tium, oui album, gluten, ichthyocolla, vitis alba,
 confusa cum testis suis cochlea, mel coctum, spon-
 gia, vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex
 aceto expressa, ex iisdem lana succida, si levis pla-
 ga est, etiam aranea: reprimunt alumē & scissi-
 le (quod σκιστόν vocatur) & liquidum, meli-
 num, auripigmentum, erugo, chalcitis, atramen-
 tum sutorium.

Quæ concoquant, & moueant pus. C A P. III.

Concoquunt & mouent pus, nardum, myr-
 rha, coctus, balsamum, galbanum, propolis,
 styrax, thuris & fuligo, & cortex, bitumen,
 pix, sulphur, resina, seuum, adeps, oleum.

Quæ aperiant vulnera. C A P. IIII.

Vulnera aperiant tanquam ora in corpori-
 bus, quod σείμα Græce dicitur, cinnamo-
 num, balsamum, parraces, iuncus quadratus, pu-
 *bdella legium, flos albæ violæ, *bdellium, galbanū, re-
 sina terebinthina, & pinea, propolis, oleum ve-
 *aminia tus, piper, pyrethrum, chamæpitys, vua *tami-
 nia, sulphur, alumen, rutæ semen.

Quæ purgant.

C A P. V.

Purgant, erugo, auripigmētum, quod ἀγοε-
 υνδόν à Græcis nominatur. Huic autem et
 sandaracæ in omnia, eadem vis, sed validior est
 squama eris, pumex, iris, balsamū, styrax, thus,
 thuris cortex, resina & pinea, & terebinthina
 liquida

liquida, ænanthe, lacerti stercus, sanguis columbæ, & palumbi, et hirundinis, ammoniacum bdellium, quod in omnia idem quod ammoniacum potest, sed valentius est, abrotanum, ficus arida, coccum gnidium, scobis eboris, omphaciū, radícula, coagulum, sed maxime leporinum, cui eadem quæ cæteris coagulis facultas, sed ubique validior est, fel, vitellus crudus, cornu ceruinum, gluten taurinum, mel crudum, misyos chalcitis, crocum, rûa* taminia, abrotanum, spuma *aminia argenti, galla, squama æris, lapis hæmatites, minium, costum, sulphur, pix cruda, seuum, adeps, oleum, ruta, porrum, lenticula, eruum.

Quæ rodant:

CAP. VI.

ROdunt, alumen, liquidum, sed magis rotundum, ærugo, chalcitis, misy, squama æris, sed magis rubri, æs combustum, sandaraca, minium Synopicum, galla, balsamum, myrrha, thuris cortex, galbanum, resina terebinthina humida, piper utrunque, sed rotundum magis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, & spuma eius, apy semen, narcissi radix, omphacium, alcyonium, oleum ex amaris nucibus, alium, mel crudum, vinum, lentiscus, squama ferri, fel taurinum, scamonea, rûa taminia, cinnamomum, styrax, cicutæ semen, resina, narcissi semen, fel, nuces amaræ, oleumq; earum, at ramentum sutorium, chrysocola, veratrum, cinis.

Quæ excedant corpus.

CAP. VII.

Exed

EXedunt corpus, acacie succus, hebenus, erugo, squama eris, chrysocola, cinis Cyprius, nitrum, cadmia, spuma argenti, hypocistis, diaphryges, sal, auripigmentum, sulphur, cicuta, sandaraca, salamandra, alcyonium, eris flos, chalcitis, atramentum sutorium, ochra, calx, acetum, galla, alumen, lac caprifici, vel lactuce marine, que tithymallos à Græcis nominatur, alcyonium, fel, thuris fuligo, spodium, lenticula, mel, oleæ folia, marrubium, lapis hamatites, & Phrygius, & Asiæ, & scissilis, misy, vinum, acetum.

Quæ adurant.

C A P. VIII.

ADurant, auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, misy, erugo, calx, charta combusta, sal, squama eris, sex combusta, myrrha, stercus & lacerti & columbe, & palumbi, & hirundinis, piper, coccum Guidium, allium, diaphryges, lac utrunque (quod proximo capite supra comprehensum est) veratrum & album & nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, sandaraca, vutaminia, chrysocola, ochra, alumē scissile, onilum sterchus, ænanthe.

Quæ crustas vlceribus inducant. C A P. IX.

EAdem fere crustas vlceribus tanquam igne adustis inducant, sed præcipuè chalcitis, utique si cocta est, flos eris, erugo, auripigmentum, misy, & id, quò magis coctum.

Quæ crustas vlceribus resoluant. C A P. X.

Crust

Crustas verò has, resoluit farina triticea cum ruta, vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid adiectum est.

Quæ discentiant ea, quæ in aliqua parte corporis coierunt.

CAP. XI.

Ad discutienda verò ea, quæ in corporis parte aliqua coierunt, maxime possunt, abrotanum, helenium, amaracus, alba viola, mel, lilium, *sanfucus, cyperus, lac, sertula campana, *sampsu-
serpillum, cupressus, cedrus, iris, viola purpurea, *cus Cy-
narcissus, rosa, crocum, passum, iuncus quadra-
tus, nardum, cinnamomum, casia, ammoniacum, prias
cera, resina, vua taminia, spuma argenti, sty-
rax, ficus arida, tragoriganus, lini & narcissi
semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites la-
pis, aut molaris, crudus vitellus, amare nuce,
sulphur.

Quæ enocent, & educant.

CAP. XII.

Educit & educit, ladanum, alumen rotun-
dum, hebenus, lini semen, omphacium, fel,
chalcitis, bdellium, resina terebinthina & pinea,
propolis, ficus arida decocta, stercus columbe,
pumex, farina loli grossi in aqua cocti, elaterium,
lauri bacca, nitrum, sal.

Quæ exasperata leuent.

CAP. XIII.

Leuat id quod exasperatum est, spodiū, hebe-
nus, gummi, oui album, lac, tragacanthum.

Quæ carnem nutriant, & vlcus impleant.

CAP. XIII.

Carnē alunt, et vlcus implēt, resina pinea, Elica, vel
*ochra, actice, mel, asteriace, carra, butyrū. asterica

Quæ

Quæ molliant.

CAP. XV.

erythria

Molliunt, æs combustū, terra^{*} eretria, nitrum, papaveris lacryma, ammoniacum, bdelliū, cara, seuum, adeps, oleum, ficus arida, sesamū, fertula Campana, narcissi et radix & semen, rosæ folia, coagulū, vitellus crudus, amara nuces, medulla omnis, stibi, pix, cochlea cocta, cicuta semen, plumbi recrementum, οὐγκία π μο- λυβδς Græci vocant, panaces, cardamomū, galbanū, resina, rua taminia, styrax, iris, balsamū, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

Quæ cutem purgent.

CAP. XVI.

Cutem purgat mel, sed magis, si est cum gal- la, vel cruo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel erugine.

De mixturis simplicium rerum, & de ratione ponderum, & quid Malagma, & Emplastrum, & Pastillus inter se differant. CAP. XVII.

Expositis simplicibus facultatibus, dicendum est quemadmodum misceantur, quæ ex his fiant. Miscentur autem varie, neque huius ullus modus est, cum ex simplicibus alia demantur, alia adiiciatur, iisdemq; servatis, ponderum ratio mutetur. Ita cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia mixturarum genera sunt, quæ comprehendi si possent, tamen esset supernacuum. Nam & iisdem effectus inter paucas compositiones sunt, & mutare eas cuilibet (cognitis facultatibus) facile est. Itaque contentus his ero, quæ accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo,

cabo, quæ vel desiderari in prioribus potuerunt, vel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam, sic ut tamen quæ magis communia sunt, simul iungam. Si qua singulis, vel etiam paruis accommodata sunt, in ipsorum locum differam. Sed & antea sciri volo, in vncia pondus denariorum septem esse. Vnius deinde denarij pondus diuidi à me in sex partes, id est sex vncias, ut idem in vncia denarij habeam, quod Græci habent in eo, quem ὀβολὸν appellāt. Id ad nostra pondera relatum, paulo plus dimidio scrupulo facit. Malagmata verò, atq; Emplastra Pastilliq; (quos τριχίονος Græci vocant) cum plurima eadem habeant, differunt eo, quòd Malagmata maximè ex floribus, earumq; etiā surculis: Emplastra Pastilliq; magis ex quibusdam metallicis fiunt: deinde malagmata contusa abunde mollescunt: nam super integram cutem iniiciuntur. Laboriose verò conteruntur ea, ex quibus emplastra pastilliq; fiunt, ne ledant vulnera cum imposita sunt. Inter Emplastrum autem, & Pastillum hoc interest, quòd Emplastrum utiq; liquati aliquid accipit, in Pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore iunguntur. Tum Emplastrum hoc modo fit, arida medicamenta per se teruntur, deinde mistis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est, & ea rursus ex eo teruntur. Ea verò quæ liquari possunt, ad ignem simul liquantur, & si quid olei misceri debet, tum infunditur.

Vncia.
Denarius.

tur. Interdū etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Vbi facta sunt, quæ separatim fieri debuerant, in vnum omnia miscentur. At Pastilli hæc ratio est: Arida medicamenta contrita humore non pingui, aut vino, vel aceto coquuntur, & rursus cocta, inarescunt. Atque vbi vtendum est, eiusdem generis humore diluuntur, tum
 *pastillis Emplastrum imponitur, *pastillus illinitur, aut alicui molliori, aut cerato miscetur.

DE MALAGMATIS.

CAP. XVIII.

Malagma aduersus calidas podagras.

His cognitis, primum malagmata subiiciā, quæ ferè non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen quod refrigerare possit, ad calidas podagras aptum. Habet galle & immaturæ et alterius, coriandri seminis, cicute lacrymæ aridæ, gummi, singulorum plenum acetabulum, cerati eloti, quod πεπλυμένον Græci vocant, selibram. Reliqua fere calefaciunt. Sed quædam digerunt materiam, quædam extrahunt, quæ ἐπισπασινὰ vocatur, pleraque certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

Malagma ad materiam extrahendam.

Si materia extrahenda est, vt in hydropico, Sin lateris dolore, in incipiēte abscessu, in supuratione quoque mediacri, aptum est id, quod habet resinæ aridæ nitri, ammoniaci, galbani, singulorum pondus *. cere pondus *. Aut in quo h. cc sunt, eruginis rasæ, thuris, singulorum P. I I. *. ammoniaci salis P. V I. *. squamæ æris, cere, singulorum

gulorum p. viii. *. resinæ aridæ p. *. xii. *. *. vii.
 aceti cyathus. Idem præstat cumini farina cum
 struthio, & melle p. i. l. *.

Malagma ad iecur dolens.

S Iecur dolet, id in quo est balsami lacrymæ
 p. xii. *. costi, cinamomi, casia, corticis
 myrrhæ, croci, iunci rotundi, balsami semini, iri-
 dis illyricæ, cardamomi, amomi nardi, singulorū
 p. xvi. *. Quibus adiicitur nardinum unguen-
 tum, donec cerati crassitudo sit, & huius qui-
 dem recentis usus est. Si verò seruandum est,
 resinæ terebinthinæ p. xvi. *. cere p. x. *. ex
 vino leni contunduntur, tum eo miscentur.

Malagma ad Tienem.

A T si lienis torquet, glandis (quam ἑλάνχη
 Græci vocant) cortex & nitrum paribus
 portionibus contunduntur, respergunturq; aceto
 quàm acerrimo. Vbi cerati crassitudinem habet,
 linteo antea in aqua frigida madefacto illinitur,
 & sic imponitur, supraq; farina ordeacea inij-
 citur, sed manere ibi non amplius sex horis de-
 bet, ne lienem consumat. Satiusq; est id bis, aut
 ter fieri. Communem autem & iocineri, & lie-
 ni, & abscessibus, & strumæ, parotidibus, ar-
 ticulis, calcibus quoque suppurantibus, aut ali-
 ter dolentibus, etiam concoctioni ventris, Lysias
 composuit ex hyssopi, panacis, styracis, galbani,
 resinæ, singulorum p. i. l. *. ammoniaci, bdellij,
 cere, seu taurini, iridis aridæ p. i. l. l. *. ca-
 chryos acetabulo, piperis granis quadraginta.

q 2

Quæ

Que contrita, irino unguento temperantur.

Malagma ad laterum dolores.

Ad laterum autem dolores compositio est Apollopheanis, in qua sunt resinae terebinthinae, thuris fuliginis, singulorum p. i i i i. *. bdellij, ammoniaci, iridis, seu vitulini, aut caprini à renibus sicci, singulorum p. i i i i. *. Hec autem eadem omnem dolorem leuant, dura emolliunt, mediocriter calefaciunt. Ad idem latus Andrea quoque malagma est, quod etiam resoluit, educit humorem, pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, ad cicatricem perducit, prodest impositum minutis maioribusq; abscessibus, item articulis, ideoq; & coxis, & pedibus dolentibus: item si quid in corpore collisum est, reficit, praecordia quoque dura & inflata emollit, ossa extrahit, ad omnia deniq; valet, quae adiuuare calor potest. Id habet cere p. * x i. *. visci sycamini, quam alias sycamororum vocant, lacrymae, singulorum p. * i. *. piperis & rotundi, & longi, ammoniaci, thymiamatis, bdellij, iridis illyricae, cardamomi, amomi, xylobalсами, thuris masculi, myrrhae, resinae aridae, singulorum p. x. *. pyrethri, cocci Gnidij, spumae nitri, salis ammoniaci, aristolochiae Creticae, radicis ex cucumere agresti, resinae terebinthinae liquida, singulorum p. x x v. *. Quibus adijcitur unguenti irini, quantum satis est ad ea mollienda, atque cogenda.

Malagmata ad resoluenda quae astricta sunt, & mollienda quae dura sunt, & digerenda quae coeunt.

Pracip

PRecipiunt verò est ad resoluenda quæ astringenda sunt, mollienda quæ dura sunt, digerenda quæ coeunt, id quod ad Polyarchum autorem refertur. Habet iunci quadrati, cardamomi, thuris, fuliginis, amomi, cere, resinæ liquidæ, pares portiones.

Aliud malagma ad eadem.

Aliud ad eadē Nilei, crocomagmatis (quod quasi recrementum eius est) P. I I I I. *. ammoniaci, thymiamatis, cere, singulorum P. X X. *. ex quibus duo priora ex aceto teruntur, cera cum rosa liquatur, et tum omnia iunguntur.

Malagma Moschi ad molliendum.

Propriè etiam dura mollit id, quod Moschi esse dicitur. Habet galbani unciam, thuris fuliginis P. *. 3. cere, ammoniaci, thymiamatis trientes, picis aridæ P. I I. *. aceti heminas tres.

Malagma Medi ad digerenda quæ coeunt.

Fertur etiam ad digerenda quæ coeunt sub autore Iohedo, quod habet cere P. *. 3. pannacis P. *. semis, squamæ aris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum P. I. *. plumbi combusti P. I. *. & semis.

Malagma Panthemi ad eadem.

Ad eadē Panthemus utebatur. calcis P. *. semis, sinapis contriti, item fœni Græci, aluminis, singulorum P. I. *. fœni bubali P. I I. *. & semis.

Malagma ad strumas.

Ad strumâ multa malagmata inuenio. Credo autē quo peius id malū est, minusq; facile

cile discutitur, eo plura esse tentata, quæ in per-
sonis varie responderunt. Andreas autor est, vt
hæc misceantur, vrticæ seminis p. i. *. piperis
rotundi, bdellij, galbani, ammoniaci, thymiamati-
tis, resinæ aride, singulorum p. iiii. *. resina li-
quida, cera, pyrethri, piperis longi, lactucæ ma-
rine seminis, sulphuris ignem non experti (quod
ἀπυρον vocatur) fecis aride, aceti, spuma nitri,
salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis ex
*P. v. cucumeris sylvestri, resinæ, singulorum p. *. viii.
*. Quæ ex leni vino contunduntur.

Aliud malagma ad idem valens.

*aliàs: se-
mine, ster-
coris. Legē
dum fortas
sevel capri
ni, vel bo-
uilli ex Ga-
leno de
strumis.

EXpeditius ad idem fit, quod habet visci,
*felini stercori, resinæ, sulphuris ignem non
experti pares portiones. Et in quo est sulphuris.
p. i. *. lapidis, quem pyriten vocant p. iiii. *.
cumini acetabulum. Item in quo est lapidis eius-
dem pars vna, sulphuris due partes, resinæ tere-
binthine partes tres.

Malagma ad strumam, & phymata.

ARabis autem cuiusdam est ad strumam, et
orientia tubercula, quæ φῦμαλα vocan-
tur, quod hæc digerit. Habet myrrhæ, salis ammo-
niaci, thuris, resinæ & liquida & aride, croco-
magnatis, cera, singulorum p. i. *. lapidis eius,
quem πυρίτην vocant, p. iiii. *. quibus quidam
adijciunt, sulphuris p. ii. *.

Malagma ad strumam, & tubera, & carcinodas.

Est etiam proficiens in struma, et in his tu-
beribus, quæ difficiliter concoquuntur, &
in his

in his quæ carcinode vocantur, quod ex his constat: Sulphuris P. II. *. nitri P. IIII. *. myrrhæ P. VI. *. fuliginis, thuris P. *. semis, salis ammoniaci P. *. I I I. cere P. I. *.

Malagina Protarchi ad parotidas, & faunm,
& mala vlcera.

Protarchus autē ad parotidas, eaq; tubercula, quæ meliceriæ, id est, faui, vel phymata nominantur, item mala vlcera, punicis, resina pineæ liquida, thuris, fuliginis, spumæ nitri, iridis, singulorum P. VIII. *. cum cere P. IX. *. miscebat, hisq; olei cyathum, & dimidium adijciebat.

Malagma, aduersus panum & phymata.

Ad aduersus panum, tum primum orientem (quod φύγεδλον Græci vocant) & omne tuberculum, quod phyma nominatur, miscetur ochra, quæ Attice nominatur, cum duabus partibus similæ, hisq; contunditur, subinde mel instillatur, donec malagmatis crassitudo sit.

Malagma aduersus phymata.

Discutit etiam omne tuberculū (quod phyma vocatur) id quod habet calcis, nitri spumæ, piperis rotundi, singulorum P. I. *. galbani P. II. *. salis P. IIII. *. quæ excipiuntur cerato ex rosa facto.

Malagma ad suppressendum omne quod abscedit.

Supprimi q; omne quod abscedit id, in quo est galbani, sabs* fresæ, singulorum P. I. *. *frixæ myrrhæ, thuris, ex radice capparis corticis, singulorum P. IIII. *. Satisq; omnia abscedentia
q 4 digerit,

digerit, murex combustus, & bene contritus,
aceto subinde adiecto.

Malagma ad sanguinem suppressendum,
& phymata.

AT si satis sanguis subit, rectè imponitur
quod aduersus phymata quoq; potest. Con-
stat ex his, bdellij, styracis, ammoniaci, galbani,
resinae & aridae & liquidae pineae. Item ex len-
tisci, thuris, iridis, singulorum P. II. *.

Malagma ad carcinodas, & phyma-
ta lenienda.

Carcinoda verò & phymata commodè his
leniuntur: Galbani, visci, ammoniaci, resi-
nae terebinthinae in singulis P. I. *. seu taurini
P. *. semis, fecis combustae quàm maxima por-
tione, dum id siccius non faciat, quàm esse ma-
lagma oportet.

Malagma ad linorem faciei contusae.

Quod si facie cõtusa liuor subcruentus est,
haec cõpositio nocte & die imposita tol-
lit: Aristolochiae, thapsiae, singulorum P. II. *.
bdellij, styracis, ammoniaci, thymiamatis, galba-
ni, resinae aridae, & ex lentisco liquidae, thuris
masculi, iridis illyricae, cere, singulorum P. IIII.
*. Item faba quoq; imposita proficit.

Malagmata stomachica ad aperiendum.

Sunt etiam quaedam malagmata, quae stom-
achum Graeci vocant, quoniam aperiendi vim
habent. Quale est quod ex his constat, piperis
longi, spumae nitri, singulorum P. II. *. erisimi
P. *. IIII. quae cum melle miscentur. Idonea quoque
etiam

etiam struma aperienda sunt eius generis. Vhe-
mentiusq; ex his est id quod habet calcis p.iiii.
*.piperis grana sex, nitri, cere, singulorum p.
x. *.mellus p. *.3. olei heminam.

Miconis malagma, ad resoluen- dum aperi-
dumq; ac purgandum.

MIconis quoq; est quod resoluit, aperit,
purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitru,
pumicem, paribus portionibus, quibus tantum
picis, & cere adijcitur, ut fiat cerati crassi-
tudo.

Malagma ad ossa, & nervos.

Ad ossa autem Aristogenis, fit ex his, sul-
phuris p. i. *. resina terebinthina, nitri
spuma, & ex seilla partis interioris, plumbi elo-
ti, singulorum p. ii. *. thuris, fuliginis p. vii. *.
ficus arida quam pinguisima, seu taurini, sin-
gulorum p. viii. *. cere p. xi. *. iridis Mace-
donice p. vi. *. sesami fricti acetabulum, ma-
ximeq; nervis, & articulis malagma convenit.

Malagma Euticlei ad articulos, & ad
omnem dolorem.

Igitur Euticlei est, & ad articulos, & ad o-
mnem dolorem, & ad vesica, & ad recenti
cicatrice contractos articulos, quos αγκύλας
Græci nominant, quod habet fuliginis, thuris ace-
tabulum, resina tantundem, galbani sine surculis
fescunciam, ammoniaci, bdellij, singulorum p. *.3.
cere p. *. semis. Aliud item fit, quod habet iri-
dis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum p. xiiii.
*. resina liquida p. vi. *. cere p. xvi. *.

q s Malag

Malagma Sofagoræ ad dolores articulorum.

Ad dolores articulorum Sofagoræ: Plumbi combusti, papaueris lacrymæ, corticis hyoscyami, styracis, peucedani, seui, resinæ, cæræ, partes portiones.

Chrysippi malagma, ad idem valens.

Chrysippi, resinæ liquidæ, sandaracæ, piperris, singulorum P. XII. ✱. quibus cæræ paulum adijcitur.

* Clepsipontis

* Ctesiphontis malagma ad idem valens, & ad parotidas, & phymata, & strumam.

Ctesiphontis, cæræ Creticæ, resinæ terebinthinae, nitri quàm ruberrimi, singulorum P. ✱. semis, olei cyathi tres. Sed id nitrum antè per triduum instillata aqua teritur, et cum sextario eius incoquitur, donec omnis humor consumatur. Potest verò ea compositio etiam ad parotidas, phymata, strumã, omnemq; coitum humoris emolliendum.

Malagma ad articulos.

Ad articulos fici quoq; aridi, partem nepetæ mistam vel vuam taminiam sine seminibus cum pulegio rectè aliquis imponit.

Malagma Aristonis, aduersus podagras, & recentia phymata, & omnes dolores.

Eadem podagra præsidio sunt. Sed ad eam fit Aristonis quoq; quod habet nardi, cinnamomi, castæ, chamæleontis, iunci rotundi, singulorum P. VIII. ✱. seui caprini ex irino liquati P. XX. ✱. iridis P. I. ✱. quæ in aceto quàm acerrimo iacere per XX. dies debet. Idem autem etiam

tiam recētia phymata doloresq; omnes discutit.

*Theofeni malagma, ad pedum dolores.

*Theoni

AT Theofenus ad pedum dolores, seu à renibus partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisq; membranulam illitam imponebat, tum superiniiciebat ammoniacum, thymia-
ma in aceto liquatum.

Numenij malagma, ad podagram, cæte-
rosq; articulos induratos.

AT Numenius podagram, cæterosq; articu-
los induratos hoc molliebat: abrotani, rosæ
aridæ, papaueris lacrymæ, singulorum P. III. *.
resinæ terebinthinæ P. IIII. *. thuris, spumæ ni-
tri, singulorum P. VIII. *. iridis, aristolochiæ, sin-
gulorum P. XII. *. cæræ P. III. *. quibus adijci-
tur cedri cyathus unus, olei laurini cyathi tres,
olei acerbi sextarius.

Dexij malagma, si quando callus in
articulis increuit.

SI quando autem in articulis callus increuit,
Dexius docuit imponere, calcis P. IIII. *.
cerusæ P. VIII. *. resinæ pineæ P. XX. *. piperis
grana P. XX. cæræ P. II. *. Quibus dum contun-
duntur, hemina vini lenis instillatur.

DE EMPLASTRIS.

CAP. XIX.

EXemplastris autem nulla maiorem vsum
præstat, quam quæ cruentis protinus vul-
neribus iniiciuntur, évαιμα Græci vocant. Hæc
enim reprimunt inflammationem (nisi magna
vis eam cogit) atq; illius quoque impetum mi-
nuunt,

nuunt, cum glutinant vulnera, quæ id patiuntur, cicatricem ijsdem inducunt. Constant autem ex *alipara medicamentis non pinguibus, ideoq; *alipena nominantur.

Barbarum emplastrum nigrum, quod cruentis protinus vulneribus iniscitur.

Optimum ex his est, quod Barbarum vocatur. Habet æruginis rasæ p. xii. *. spumæ argenti p. xx. *. aluminis, picis aridæ, resinæ pineæ, aridæ, singulorum p. i. *. quibus adiunguntur olei & aceti singulæ heminæ.

Chœcon emplastrum nigrum, ad idem valens.

Alterum ad idem, quod χόκκον vocant, habet spumæ argenti p. c. *. resinæ aridæ tantundem. Sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est, qui fere talis sit ex pice atq; resina. At ex bitumine nigerrimus: ex ærugine, aut æris squama, viridis: ex minoruber, ex cerussa albus.

Basilicon emplastrum nigrum ad idem.

Paucæ admodum cōpositiones sunt, in quibus aliquid mixturæ varietas nouat. Ergo id quoq; nigrum est, quod Basilicon nominatur. Habet panacis p. i. *. galbani p. ii. *. picis, & resinæ singulorū p. x. *. olei dimidium cyathum.

Smaragdinum emplastrum nigrum ad idem.

At quod peruiride est, smaragdinum appellatur, in quo sunt resinæ pineæ p. iii. *. care p. i. *. æruginis p. *. semis, thuris fuliginis p. ii. *. olei tantundem, & aceti, quo fuligo

go & erugo in vnum cogantur.

Emplastrum rufum ad idem.

Est etiam coloru fere ruffi, quod celeriter ad cicatricem vulnera perducere videtur. Habet thuris P. I. *. resine P. II. *. squame aris P. IIII. *. spume argenti P. XX. *. cere P. C. *. olei heminam.

παγαλλήσιον emplastrum ad idem.

Preterea est, quod παγαλλήσιον glutinando vocant. Constat ex his: Bituminis, aluminis scissilis P. IIII. *. spume argenti * P. * P. XL. IIII. *. & olei reteris hemina.

Cephalicum emplastrum Philotæ capiti conueniens

Preterea sunt quedā generis eiusdem, quæ quia capitibus fractis maxime cōueniunt, Cephalica à Grecis nominantur. Philotæ compositio habet: Terræ * eretrie, chalcitidis, singulo- * Ery- rum P. IIII. *. myrrhæ, aris combusti P. X. *. thrac ichthyocollæ singulorum P. VI. *. eruginis rase, aluminis rotundi, misyos crudi, aristolochiæ, singulorum P. VIII. *. squame aris P. XX. *. thuris masculi P. II. *. cere P. I. *. rosa, & olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur.

Emplastrum viride ad idem valens,

Aliud ad idem viride, aris combusti, squame aris, myrrhæ, ichthyochollæ, singulorum P. VI. *. misyos crudi, eruginis rase, aristolochiæ, aluminis rotundi, singulorum P. VIII. *, cere * P. VII. *. olei hemina, aceti quod satis sit. * P. I.

Tetra

Tetrapharmacum emplastrum, ad pus mouendum.

Puri autē mouendo non aliud melius, quā
quod expeditissimum est, Tetrapharmacum
à Græcis nominatur. Habet pares portiones cera,
pici, resine, seui taurini, si id non est, vitulini.

Enneapharmacum emplastrum ad pus mo-
uendum, & ad purgandum valens.

Alium ad idem Enneapharmacum no-
minatur, quod magis purgat. Constat ex
nouem rebus, cera, melle, seuo, resina, myrrha,
rosa, medulla vel ceruina, vel vitulina, vel bu-
bula, hyssopo, butyro. Quorū ipsorum quoq; pon-
dera paria miscentur. Sunt autem quedam em-
plastra, quibus vtriusq; rei facultas est, quæ si
singula habenda sunt, meliora sunt. Sed in copia
reicienda sunt, his potius adhibitis, quæ proprie
id, quod eo tempore opus est, consequuntur. E-
xempli causa duo proponam.

Attalum emplastrum ad vulnera.

Est igitur ad vulnera Attalum, quod habet
* P. VI. squamæ aris * P. xvi. * fuliginis P. xv. *.
ammoniæ tantundem, resine terebinthinæ li-
quidæ P. xxv. *. seui taurini tantundem, aceti
heminis tres, olei sextarium.

Iudæi emplastrum, fracto capiti accommodatum.

At inter ea quæ fracto capiti accommo-
dantur, habent quidam id quod ad au-
torem Iudæum refertur. Constat ex his, salis
P. *. iiii. squamæ aris rubri, aris combusti, sin-
gulorum P. xii. *. ammoniæ, thymiamatis,
thuris, fuliginis, resine aridæ, singulorum P. vi.
*. res

*.resine.Colophoniace,cera,seui vitulini cura-
ti,singulorum p.xx.*.aceti sesquicyathum, olei
minus cyathum, τελεγαπιδυμείν Graci appel-
lant, quæ curata vocant, cum ex seuo, puta o- Curata.
mnes membranule diligenter exemptæ sunt aut
ex alio medicamento.

Dia daphnidon emplastrum, ad extrahendum.

Sunt etiam quedam emplastra nobilia ad
extrahendum. Quæ ipsa quoq; ἐπισπαστικά
nominantur. Quale est, quod quia lauri baccas
habet, dia daphnidon appellatur. In eo est, resi-
ne terebinthine p.x.*. nitri, cera, picis aride,
baccarum lauri, singulorum p.xx.*. olei paulum.
Quoties aut baccam, aut nucem, aut simile ali-
quid posuero, scire oportebit, antequam expen-
datur, ei summam pelliculam esse demendam.

Aliud dia daphnidon ad extrahendum,
& pus mouendum.

Aliud eo nomine, quod puri quoq; mouen-
do est: Seui vitulini, ammoniaci, thymia-
matis, picis, cera, nitri, baccarum lauri, resine
aride, aristolochie, pyrethri, pares portiones.

Philocratis emplastrum ad extrahendum,
& pus mouendum.

Preter has, est Philocratis, quod habet sa-
lis ammoniaci p. vii. *. aristolochie p.
viii. *. cera, resine terebinthine, fuliginis, thu-
ris, singulorum p. xv. *. spume argenti. *p. l. ii. *p. xxxii.
*. Quibus ut pus quoq; moueant, iridis p. iiii.
*. & galbani p. vi. *. adijciuntur.

Rhypodes emplastrum, ad extrahendum.

Optimum

Optimum tamen ad extrahendum est id quod à similitudine sordium ῥηπῶδες Græci appellant. Habet myrrhæ, croci, iridis, propolis, bdellij, capitulorum punici mali, aluminis & scissilis & rotundi, misyos, chalcitis, atramenti sutorij cocti, panacis, salis ammoniaci, visci, singulorum p. iiii. *. aristolochiæ p. viii. *. squamæ æris p. xvi. *. resinæ terebinthinæ p. lxxv. *. ceræ, & seui vel taurini, vel hircini p. c. *.

Emplastrum Hecatæi, ad extrahendum.

Hecatæo quoq; autore emplastrum generis eiusdem fit ex his, galbani p. ii. *. fuliginis thuris p. iiii. *. picis p. vi. *. ceræ, & resinæ terebinthinæ, singulorum p. viii. *. quibus paulum irini unguenti miscetur.

Alexandrinum emplastrum viride, ad extrahendum.

Valensq; ad idem emplastrum viride Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis p. viii. *. salis ammoniaci p. *. viii. 3. squamæ æris p. xvi. *. myrrhæ, thuris, singul. p. xviii. *. ceræ p. cl. *. resinæ Colophoniacæ, aut pineæ

* p. c. c. *. p. cxc. *. olei heminam, aceti sextarium.

De emplastris exedentibus.

Quedam autem sunt emplastra exedentia, quæ ῥηπῶδες Græci vocant, quale est id quod habet resinæ terebinthinæ, fuliginis thuris, singulorum p. *. 3. squamæ æris p. i. *. ladani p. ii. *. aluminis tantundem, spumæ argenti p. iiii. *.

Emplastrum quod exest corpus, & ossa resoluit, & supercrecentem carnem coercet.

Exest

Exest etiam vehementer corpus, atque ossa quoque resoluit, & supercrescentem carnem coërcet, id quod habet spumæ argenti, squamæ aris, uncias singulas, nitri ignem non experti, lapidis Asij, aristolochia ꝑ. sextantes, cera, resina terebinthinæ, thuris, olei veteris, atramenti sutorij, salis ammoniaci ꝑ. semis, æruginis rasæ ꝑ. bessem, aceti stillitici heminam, uini aminei tantundem.

Emplastra aduersus morsus, & alia recentiora vulnera.

Sunt etiam aduersus morbus quedam accommodata, quale est Diogenis nigrum, quod habet bituminis, cera, resina pineæ aridæ singulorum ꝑ. xx. *. spumæ argenti ꝑ. c. *. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ aris ꝑ. iiii. *. cerussæ, & æruginis rasæ, singulorum ꝑ. viii. *. passæ *. ammoniaci ꝑ. xii. *. cera, resina pineæ, singulorum, ꝑ. xxv. *. spumæ argenti ꝑ. c. *. olei sextarium. Aut in quo sunt squamæ aris ꝑ. xiiii. *. galbani ꝑ. v. *. cerussæ, & æruginis rasæ, singulorum ꝑ. viii. *. ammoniaci ꝑ. xii. *. cera, resina pineæ, singulorum *. ꝑ. l. v. *. *. ꝑ. xlv. ex quibus spuma argenti concoquitur.

Ephesium emplastrum rubrum, ad idem valens.

Rubrum quoque emplastrum quod * Ephes- * Ethesium vocatur huc aptum est. Habet resina terebinthinæ ꝑ. ii. *. galbani ꝑ. *. iiii. minij sinopici ꝑ. vi. *. thuris fuliginis ꝑ. vi. *. cera ꝑ. viii. *. spumæ argenti ꝑ. l. vi. *. olei veteris heminam.

r Aliud

Aliud emplastrum ad idem valens.

Item id quod ex his constat, squamæ aris, thuris fuliginis, singulorum p. i i i i. *. galbani p. vi. *. salis ammoniaci p. *. x i i. .3 cere p. x x v. *. olei tribus heminis. Hæc autem alijs quoq; recetioribus vulneribus recte imponitur.

Λουνα̃ emplastra non grauib; vulneribus accommodata, & maxime senilibus.

Sunt enim alba lenia, λουνα̃ Greci vocant, serè non grauib; vulneribus accommodata, præcipueq; senilibus. Quale est quod habet cerussæ * p. l i i. *. seu vitulini curati, & cere, singulorum p. l v i i i. *. olei heminas tres, ex quibus ea cerussa coquitur.

Elephantinum emplastrum.

Aliud quod habet cerussæ p. x x. *. cere * p. x x x v. *. olei heminam, aque sextarium. Quæ quoties adijciuntur cerussæ, vel spumæ argenti, scire licet illa ex his coquenda esse. Est autem ea percandida compositio, quæ supra posita est, ideoq; elephantina nominatur.

Lenia emplastra.

Lenia quoq; quedam emplastra sunt, quæ λιπαράς serè Greci nominant, ut id quod habet minij p. i i i i. *. spumæ argenti p. x x v. *. cere, & adipis suille, singulorum p. x x v i i. vitellos quatuor.

Emplastrum lenæ.

Alia compositio generis eiusdem, cere, resinæ terebinthinæ, singulorum p. v i. *. cerussæ * p. v i. *. spumæ argenti, plumbi recrementi,

menti, scoriam molybdi Græci vocant, singulorū
P. XX. cicini olei, & myrti, singulorum hemina.

Archaghati emplastrum lene.

Tertia quæ ad autorem Archaghatum re-
fertur, Misysos cocti, aeris combusti, sin-
gulorum, P. IIII. *. cerussæ coctæ P. VIIII. *.
resinæ terebinth. P. X. *. spumæ argenti P. V. I. *.

Emplastra eiusdem generis ad lenien-
dum apta.

Etiamnum generis eiusdem, spumæ argen-
ti, cere, adipis suillæ, singulorū P. XXVII.
*. vitelli cocti, rosæ hemina. Aut cerati ex oleo
myrteo facti partes tres, adipis suillæ pars quar-
ta, paulum ex plumbi recremento. Aut spumæ
argenti selibra, ex olei hemina, & aque marinæ
altera coctæ donec bullire desierit, cui paulum
cere sit adiectum, aut pares portiones cere, se-
ui, sibi, spumæ argenti, cerussæ.

De pastillis, & primo de his qui ad recētia vulnera
glutinanda, sanandāq; apti sunt. CAP. XX.

Pastilli quoq; facultates diuersas habent.
Sunt enim ad recentia vulnera glutinan-
da, sanandāq; apti. Qualis est qui habet chalcitis,
misysos, spumæ nitri, floris aeris, gallæ, aluminis
scissilis modice cocti, sing. P. I. *. aeris combusti,
capitulum mali punici, singulorum P. IIII. *.
Hunc oportet diluere aceto, sic ubi vulnus glu-
tinandus est, illinere. At si neruosus aut muscu-
losus is locus est, commodius est cerato miscere,
sic ut illius octo partes, nona huius sit.

Alius pastillus ad glutinanda vulnera.

r 2

Alius

Alius ad idem constat ex his, bituminis, aluminis scissilis, singulorum p. i. *. aris combusti p. i i i i. *. spuma argenti p. x i. *. olei sextario.

De sphragide pastillo, quem Polybus confecit ad glutinandum vulnus.

Sed longe Polybi celeberrimus est, Sphragidis autem nominatur, qui habet aluminis scissilis p. *. i. 3. atramenti sutorij p. i i. *. myrrhae p. v. *. aloës tantundem, capitulorū punici mali, fellis taurini, singulorum p. v i. *. Quae contrita vino austerio excipiuntur.

Pastillus ad ulcera sordida, & nigritiem in aribus, naribus, & in obscenis partibus, inflammationesq; eorum.

Ad ulcera sordida, & nigritiem in aribus, naribus, obscenis partibus, inflammationesq; eorū: Chrysocolle p. i. *. atramenti sutorij, aluminis scissilis, sing. p. i i. *. halicacabi corticis p. i i i i. *. minij p. v i. *. spuma argenti p. x i i. *. cerussae p. x v i. *. Quae ex aceto & coguntur, & ubi utendum est, diluuntur.

Pastillus Andronis ad ruam inflammata, ad naturalia sordida, etiam cancro laborantia.

Andronis verò est ad ruam inflammata, ad naturalia sordida etiam cancro laborantia: Gallae atramenti sutorij, myrrhae, singulorum * p. i i. *. aristolochiae, aluminis scissilis, singulorum p. i i. *. capitulorū punici mali p. x x v. *. ex passo coactorum, & (cum usus exigit) aceto vel vino dilutorum, prout valentius aut lenius

lenius vitium est, cui medendum est.

Pastillus ad fissa ani, vel ora venarum funden-
tia sanguinem vel cancrum.

Propriè autem ad ani fissa, vel ora venarum
fundentia sanguinè, vel cancrum: Aeru-
ginis p. i i. *. myrrhæ p. x i i. *. stibis, lacrymæ
papaueris, acacie singulorum. p. x v i. *. Quæ ex
vino & teruntur, & in ipso vsu deliquantur.

Pastillus ad expellendum calculum
cum vrina.

Expellere autem ex vesica cum vrina cal-
culum videtur hæc compositio: Casie, cro-
ci, myrrhæ, costi, nardi, cinnamomi, dulcis radi-
cis, balsami, hyperici pares portiones conterun-
tur, deinde vinum lene instillatur, & pastilli
fiunt, qui singuli habeant p. *. 3. hiq; singuli
quotidie mane ieiuno dantur.

De pelsis.

C A P. XXI.

Hæc tria compositionum genera, id est,
quæ in malagmatis, pastillis, emplastrisq;
sunt, maximum, præcipueq; varium vsum præ-
stant. Sed alia quoq; vtilia sunt, vt ea quæ fæmi-
nis subiiciuntur (πείρας Greci vocant.) Eorū hæc
proprietas est: Medicamenta cōposita molli lana
excipiuntur, eaq; lana naturalibus conditur.

Ad sanguinem euocandum.

Ad sanguinem autem euocandum, cauceis
duabus adiicitur nitri* p. i. *. aut alij se- * p. i i.
men conteritur, adiicitur myrrhæ paululum, &
vnguento susino miscetur, aut cucumeris sylue-
stris pars interior, ex lacte muliebri diluitur.

r 3 Ad

Ad vuluam molliendam.

AD vuluam molliendam, oui vitellus, & fœnum Græcum, & rosa & crocum temperantur. Aut elaterij p. x. 3. salis tantundem vna taminie p. v. i. x. melle excipiuntur.

Alia pessi compositio ad idem valens.

AU^t Boetho autore, croci, resinæ terebinthinae, singulorum p. x. i. i. i. i. myrrhæ p. x. 3. rosæ 8. i. x. seu vitulini p. x. 3. ceræ p. i. i. x. miscentur.

Ad inflammationes vuluæ Numenij pessus.

OPTIMA autem aduersus inflammationes vuluæ, Numenij compositio est, quæ habet croci p. x. 3. ceræ p. i. x. butyri p. v. i. i. i. x. adipis anserini p. x. i. i. x. vitellos coctos duos, rosæ minus cyatho.

Ad eijciendum è vulua infantem mortuum.

SI verò infans intus decessit, quo facilius eijciatur, malicorium ex aqua terendum, eoq; vtendum est.

Si mulier vitio locorum concidit, qua curatione vtendum sit.

SI concidere vitio locorum mulier solet, cochleæ cum testis suis comburendæ, conterendæq; deinde his mel adijciendum est. Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa mollienda est.

De medicamentis quibus aridis vtimur.

C A P. XXII.

Ad carnem supercrecentem exedendam.

QUEDAM autem misturæ medicamentorum sunt, quibus aridis neq; coactis vtimur, sic vt inspergamus, aut cum aliquo liquido mista

mixta illinamus, quale est ad carnem supercre-
scentem exedendam, quod habet squama, fuligi-
nis thuris, singulorum p. i. *. eruginis p. i. i. *.
Hæc autē eadem cum melle purgant vlcera, cum
cera implēt. Misy quoq; et galla, si paribus por-
tionib. misceatur, corpus consumūt, eaq; vel ari-
da inspergere licet, uel excepta cadmia, illinire.

Ad putrem carnem continendam, ne vltra serpat,
eāq; leniter exedendam plures compositiones.

Putrem vero carnē continet, neq; vltra ser-
pere patitur, & leniter exest, mel, vel cum
lenticula, vel cum marrubio, vel cum olea folijs,
antē ex vino decoctis. Item sertula campana in
mulso cocta, deinde contrita, aut calx cum cera-
to, aut amara nuces cum allio, sic vt huius pars
tertia sit, paulumq; his croci adiiciatur. Aut
quod habet spuma argenti p. v. i. *. cornu bubuli
combusti p. x. i. i. *. olei myrtei, & vini cyathos
ternos. Aut quod ex his constat: Floris punici
mali, atramenti sutorij, aloës, singulorū p. i. i. *.
aluminis scissilis, thuris singul. p. i. i. i. i. *. gallæ
p. v. i. i. i. *. aristolochiæ p. x. *. Vehementius
idem facit etiam adurendo auripigmentum cum
chalcitide, & aut nitro, aut calce, aut charta
combusta. Item sal cum aceto. Vel ea compositio
quæ habet chalcitidis, capitulorum punici mali,
aloës, singulorum p. i. i. *. aluminis scissilis, thi-
ris, singulorū p. i. i. i. i. *. gallæ p. v. i. i. i. *. ari-
stolochiæ p. x. *. mellis quantum satis sit ad ea co-
genda. Vel cantharides p. i. *. sulphuri p. i. *.
v 4 lolij

lolij p. i i i. *. Quibus adijcitur picis liquida quantum satis est, adiungendum mel, chalcitis quoq; cum resina & ruta mista, aut cum eadem resina diphryges, aut vua taminia, cum pice liquida. Idem verò possunt feces vini combustæ, & calcis, & nitri pares portiones, vel aluminis scissilis p. *. 3. 3. thuris, sandaracæ, nitri, singulorum p. *. i. gallæ p. v i i i. *. aristolochiæ p. x. *. mellis quantum satis est.

Hieræ compositio.

Est etiam Hieræ compositio quæ habet myrrha, chalcitidis, singulorum p. i i. *. aloës, thuris, aluminis scissilis, singulorum p. i i i i. *. aristolochiæ, gallæ immaturæ, singul. p. v i i i. *.
* p. x. mali corij contriti * p. x x. *.

Iudei compositio.

Est & Iudei, in qua sunt calcis partes due, nitri quàm ruberrimi pars tertia, quæ urina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

Iollæ compositio.

At Iollæ, chartæ combustæ, sandaracæ, singulorum p. i. *. calcis p. i i. *. auripigmenti tantundem miscebat.

Ad sanguinis profuua vel ex mēbrana cerebri, vel alijs locis, & ad cancerū, & ad inducendam cicatricē, & ad coërcendam carnē crescentem.

Si verò ex membrana, quæ super cerebrū est, profluit sanguis, vitellus combustus & contritus inspergi debet, si alio loco sanguinis profluuium

fluuium est, auripigmenti, squamæ æris, singulorum p. i. *. sandaracæ p. ii. *. marmoris cocti p. i i i i. *. inspergi debet. Eadem cancro quoq; obfistunt. Ad inducendam cicatricem, squamæ æris, thuris fuliginis, sing p. i i. *. calcis p. i i i i. *. Eadem incrementem quoq; carnem coërcent.

Timæi compositio ad ignem sacrum
vel cancrum.

TImæus autem ad ignem sacrum, vel ad cancrum his utebatur, myrrhæ p. i i. *. thuris, atramenti sutorij, singulorum p. i i i. *. sandaracæ, auripigmenti, squamæ æris, singulorum p. i i i i. *. gallæ p. v i. *. cerussæ combustæ p. v i i i. *. Eadē vel arida inspersa, vel melle excepta idem præstant.

Ad sternutamenta excitanda.

Sternutamenta verò vel albo veratro, vel struthio coniecto in nares excitantur, vel his mistis, piperis, veratri albi, singulorum p. *. 3. castorei pondo i. *. spumæ, nitri p. i i. *. struthij p. i i i. *.

Gargarizationes quibus fieri
debeant.

Gargarizationes autem aut leuandi causa fiunt, aut reprimendi, aut euocandi. Leuant lac, cremor, vel ptisane, vel fursurum. Reprimit aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum, vel palmule decoctæ sunt. Euocant, sinapi, piper.

r 5 De

De antidotis, & quibus malis opitulentur.

C A P. XXIII.

Antidota raro, sed precipue interdum necessaria sunt, quia gravissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum, laterum, faucium, interiorumque partium doloribus. Maxime autem desideranda sunt aduersus uenena, uel per morsus, vel per cibos, aut potiones nostris corporibus inserta.

Compositio antidoti.

VNum est quod habet lacrymæ papaueris p. *. 3. acori malobatri p. v. *. iridis illyricæ, gummi, singulorum p. i i. *. anisi p. i i. *. nardi gallici, foliorum rosæ aridorum, cardamomi, singulorum p. i i i. *. petroselini p. *. i i i. 3. trifolij p. v. *. casia nigra, silis, bdellij, balsami, seminis piperis albi, sing. p. *. 3. styracis p. *. v. 3. myrrhæ, opoponacis, nardi syri, thuris masculi, hypocistidis succi, sing. p. v i. *. castorei p. v i. *. costi, piperis albi, galbani, resine terebinthinae, croci, floris iunci rotundi, singulorum p. *. v i. 3. dulcis radicis p. v i i i. *. 3. Quæ vel melle vel passo excipiuntur.

Aliud antidotum Ambrosia nominatū, quod Zopyrus Ptolemæo regi composuit.

Alterum quod Zopyrus regi Ptolemæo dicitur composuisse, atque Ambrosiam nominasse, ex his constat: Costi, thuris masculi, singulorum p. v. *. piperis albi p. *. 3. floris iunci rotundi p. i i. *. cinamomi p. i i i. *. casia nigra p.

P. I I I I. *. croci Cilicij P. *. I I I I. 3. myrrhe
quam staeten nominat P. v. *. nardi indici P. *.
v. 3. Quae singula cōtrita melle cocto excipiuntur.
Deinde ubi utendū est, id quod Aegyptiae fabae
magnitudinē impleat in potione vini diluitur.

Antidotum Mithridatis.

Nobilissimum autem est Mithridatis, quod
quotidie sumendo rex ille dicitur aduer-
sus uenenum pericula tutum corpus suum red-
didisse. In quo haec sunt, costū P. *. s. 3. acori
P. v. *. hyperici, cumini, sagapeni, acaciae succi,
iridis Illyricae, cardamomi, singulorum P. I I *.
anisi P. I I I *. nardi gallici, gentiane, radi-
cis, aridorum rose foliorum, singulorum P. I I I I.
*. papaveris lacrymae, petroselini, singulorum
P. *. I I I I. 3. casiae, filis, lolij, piperis longi, sin-
gulorum P. v I. *. styracis P. *. v. 3. castorei,
thuris, hypocistidis succi, myrrhae, opopanax,
singulorum P. v I. *. malobathri folij P. v I. *.
floris iunci rotundi, resinae terebinthinae, gal-
bani, dauci cretici seminis, singulorum * P. *. v. * P. *. v I.
3. nardi, opobalsamum, singulorum P. *. v I. 3.
thlaspi P. *. v. 33. radice pontica P. v I I. *.
croci, Zingiberis, cinnamomi, singulorum P.
*. v I I I. 3. Haec contrita melle excipiuntur,
& aduersus venenum, quod magnitudinem nu-
cis Graecae impleat, ex vino datur. In ceteris au-
tem affectibus corporis pro modo eorum, vel
quod Aegyptiae fabae, vel quod erui magnitu-
dinem impleat, satis est.

DE

DE ACOPIS.

Acopum neruis vtile. CAP. XXIIII.

Acopa quoque vtilia neruis sunt. Quale est quod habet floris iunci rotundi p. *. i. i. 33. costi, iunci quadrati, lauri baccarū, ammoniaci, cardamomi, sing. p. *. i. i. i. 3. myrrhæ, aris combusti, singulorum p. *. v. i. i. iridis illyricæ, cere, singulorum p. i. i. i. *. alexandri calami, iunci rotundi, aspalathi, xylobalсами singulorum p. xv. i. i. *. seui p. i. *. vnguenti irini cyathum.

Acopum Euodes neruis vtile.

* ἐλαϊώ-
δες

Alterū quod * οὐώδες vocāt, hoc modo fit, cere p. *. 3. olei tantūdem, resina terebinthina ad nucis iuglandis magnitudinē simul incoquuntur, deinde infusa in mortario teruntur, instillaturq; subinde quā optimi mellis acetabulum, tum irini vnguenti, & rosæ terni cyathi.

Enchrasta ad vlcera purganda & implenda.

Eρχγίσα autem Græci vocant liquida quæ illinuntur. Quale est quod fit, ad vlcera purganda, & implenda maxime inter neruos, paribus portionibus inter se mistis, butyri, medulle vitulina, seui vitulini, adipis anserina, cere, * cilini mellis, resina terebinthina, rosæ, olei * cicini. Quæ separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, & tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat: magis verò emollit, si pro rosâ cyprus infunditur.

Ad sacrum ignem.

Ad sacrum ignem spuma argenti p. v. i. *. cornu bubuli combusti p. i. i. *. conteruntur,

tur, adijciturq; inuicem vinum, & id quod specialiter sil vocatur, & myrteum, donec vtriusq; terni cyathi conficiantur.

De Catapotis.

C A P. XXV.

Catapodium ad somnum accersendum, & leuationem doloris, & simul ad coquendum.

Catapodia quoque multa sunt, varijsq; de causis fiunt. Anodyna vocant, quæ somno dolorem leuant. Quibus vti, nisi nimia necessitas vrget, alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, & stomacho alienis. Potest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaueris lacryma, galbani, singulorum p. i. *. myrrha, castorei, piperis p. i i. *. Ex quibus quod erui magnitudinem habet, satis est deuorasse.

Catapodium valentius ad somnum.

Alium stomacho peius, ad somnum valentius ex his fit, mandragora p. *. 3. apij seminis, item hyoscyami seminis, singulorum p. i i i i. *. Quæ ex vino teruntur. Vnum autem eiusdem magnitudinis, quæ supra posita est, abunde est sumpsisse.

Catapodium ad plurimos dolores per somnum leniendos.

Sive autem capitis dolores, siue vlcera, siue slippitudo, siue dentes, siue spiritus difficultas, siue intestinorum tormenta, siue inflammatio vuluæ est, siue coxa, siue iecur, aut lienis, aut latus torquet, siue vitio locorum aliqua prolabitur, & obmutescit, occurrit dolori per quietem eiusmodi catapodium: Silis, acori, ruta syluestris seminis,

nis, singulorum p. i. ✱. castorei, cinnamomi, singulorum p. i. i. ✱. papaveris lacryma, panacea, radicis mandragora, malorum aridorum, iunci rotundi floris, singulorum p. i. i. ✱. piperis grana l. v. i. Hac per se cōtrita, rursus instillato subinde passo, simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut deuoratur, aut aqua diluitur, & potui datur.

Catapotium aliud ad multa valens.

Quin etiam syluestris papaveris cum iam ad excipiendam lacrymam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in vas demittitur, & superinfunditur aqua, quae id contegat, atq; ita coquitur. Vbi iam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus proicitur, & cum eo humore, passi pari mēsurā miscetur, inferuetq; donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapotia ex eo fiunt, ad nostrae fabae magnitudinem, habentq; vsum multiplicē. Nam & somnū faciunt, vel per se assumpta, vel ex aqua data, & aurium dolores leuāt, adiectis exiguo modo rutae succo, ac passi. Et tormina supprimunt ex vino liquata, & inflammationē vuluae coërcent, mista cerato ex rosa facto, cum paulum his croci quoq; accessit, & ex aqua fronti inducta, pituitam in oculos decurrentē tenent.

Catapotium ad inducendum somnum, quod vulua dolens prohibuit.

Item si vulua dolens somnum prohibuit, croci p. i. i. ✱. anisi, myrrhae, singulorum p. i. ✱. papaueris

paueriſ lacryma ꝑ. iiii. *. cicutæ ſeminis ꝑ. viii. *. miſcentur, excipiunturq; vino vete-
re, & quod lupini magnitudinem habet in tri-
bus cyathis aque diluitur. Id tamen in febre pe-
riculoſe datur.

Ad iecur ſanandum.

Ad ſanandū iecur nitri ꝑ. *. 3. croci, myr-
rhæ, nardi Gallici, ſingulorum ꝑ. i. *. mel-
le excipiuntur, daturq; quod Aegyptiæ fabæ
magnitudinem habeat.

Ad finiendos dolores lateris.

Ad lateris dolores finiendos, piperis, ari-
ſtolochiæ, nardi, myrrhæ pares portiones.

Ad thoracis dolores finiendos.

Ad thoracis, nardi ꝑ. i. *. thuris, caſiæ, ſin-
gulorum ꝑ. iiii. *. myrrhæ, cinamomi ſin-
gul. ꝑ. vi. *. croci ꝑ. v. i. *. reſinæ terebin-
thinæ quadrans, mellis hemina tres.

Catapodium Athenionis ad tuſſim.

Ad tuſſim Athenionis, myrrhæ, piperis,
ſingulorum ꝑ. i. *. caſtorei, papaueris la-
crymæ, ſingulorum ꝑ. i. *. Quæ ſeparatim con-
tuſa, poſtea iunguntur, & ad magnitudinem
fabæ noſtræ, bina catapodia mane, bina nocte
dormituro dantur.

Catapodium Heraclidis Tarentini, ad
tuſſim, & ſomnum.

Si tuſſis ſomniſ prohibet, ad utrūq; Heracli-
dis Tarētini, croci ꝑ. i. *. cinamomi, caſtorei,
papaueris lacryma, ſingulorum ꝑ. i. *. myrrhæ, pi-
peris longi, coſti, galbani, ſingulorum ꝑ. *. 3.

Catap

Catapodium ad purganda vlcera in
faucibus tussientibus.

Quod si purgata sunt vlcera in faucibus
tussientibus, panacis, myrrhæ, resinæ te-
rebinthinæ, singulorum P. V. ✱. galbani P. ✱. 3.
hyssopi P. ✱. 3. conterenda sunt, hisq; hemina
mellis adijcienda, & quod digito excipi potest,
deuorandum est.

Colicę Celsii medici.

Colicę verò Celsij ex his constat, croci, ani-
si, castorei, singulorum P. I I I. ✱. petrose-
lini P. I I I. ✱. piperis et longi, & rotundi, sin-
gulorum P. V. ✱. papaueris lacrymæ, iunci rotun-
di, myrrhæ, nardi, singulorum P. V I. ✱. Quæ
melle excipiuntur. Id autem & deuorari potest,
& ex aqua calida sumi.

Ad infantem mortuum aut secundas impellendas.

Infantem verò mortuum, aut secundas expel-
lit aque potio, cui salis ammoniaci P. I. ✱. aut
cui dictami Cretici P. I. ✱. adiectum est.

Laborantibus ex partu quid dari debeat.

Ex partu laborantibus erisimum, ex vino
tepidio ieiunæ dari debet.

Ad adiuuandum vocem.

Vocem adiuuat thuris P. I. ✱. in duobus
cyathis vini datum.

Aduersus difficultatem vrinę.

Adversus vrinæ difficultatem, piperis lon-
gi, castorei, myrrhæ, galbani, papaueris la-
crymæ, croci, costi vnciæ singule, styracis, resinæ
terebinthinæ pondo sextantes, mel, absinthij cya-
thus.

thus. Ex quibus ad magnitudinem fabæ Aegyptiæ, & manè, & cœnato dari debet.

Arteriace compositio quomodo fiat.

Arteriace verò hoc modo fit, casia, iridis, cinamomi, nardi, myrrhae, thuris singulorum P. I. *. croci P. I. *. piperis grana XXX. ex passi tribus sextarijs decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat. Aut croci, myrrhae, thuris, singulorum P. I. *. coniunguntur in passi eundem modum, eodemq; modo decoquuntur. Aut eiusdem passi hemine tres vsque eò coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat, & adijcitur triæ casia P. I. *.

De quinque generibus noxarum corporis, & primo de vulneribus, quæ maxime per tela inferuntur.

CAP. XXVI.

Cum facultates medicamentorū proposuerim, genera in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt. Cum quid extrinsecus læsit, ut in vulneribus. Cum quid intra se ipsum corruptum est, ut in cancro. Cum quid innatum est, ut in vesica calculus. Cum quid increuit, ut vena, quæ intumescens, in varicem conuertitur. Cum quid deest, ut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus plus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ergo dilatis his, quæ præcipue scalpellum & manum postulant, nunc de his dicam, quæ maxime medicamentis egent. Diuidam autem hanc quoque curandi partem sicut priorem. Et antè dicam de his, quæ in quamlibet partem corporis incidunt.

s Tum

Tum de his, quæ certas partes infestant. Incipiã
 à vulneribus. In his autem ante omnia scire me-
 dicus debet, quæ insanabilia sint, quæ difficilem
 curationem habeant, quæ promptiorem. Est enim
 prudentis hominis, primum eum qui seruari non
 spem potest, non attingere, nec subire speciem eius, vt
 occisi, quem sors ipsius peremit. Deinde vbi gra-
 uis metus, sine certa tamen desperatione est, in-
 spem dicare necessarijs periclitantis in difficili rem
 esse, ne si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel
 fefellisse videatur. Sed vt hæc prudenti viro con-
 ueniunt, sic rursus histrionis est, paruam rem at-
 tollere, quò plus præstitisse videatur. Obligariq;
 æquum est, cõfessione promptæ rei, quò curiosius
 etiam circumspiciat, ne quod per se exiguum est
 malum, maioris curantis negligentia fiat.

Quæ vulnera insanabilia sunt.

Seruari non potest, cui basis cerebri, cui cor,
 cui stomachus, cui iocinoris portæ, cui in spi-
 na medulla percussa est, cuiq; aut pulmo medius,
 aut ieiunum, aut tenuis intestinum, aut ventricu-
 lus, aut renes vulnerati sunt, cui'ue circa fan-
 glandes, ces grandes venæ, vel arteriæ præcisæ sunt.
 venæ vel
 arteriæ,
 etc.

Quæ vulnera difficilem curationem habeant.
Vix autem ad sanitatē perueniunt, quibus
 vlla parte pulmo, aut iocinoris crassum,
 aut membrana quæ continet cerebrum, aut lie-
 nis, aut vulua, aut vesica, aut vllum intestinum,
 aut ceptum trāsuersum vulneratum est. Hi quo-
 que in præcipiti sunt, in quibus usque ad gran-
 des

des, intusq; conditas venas, in alis vel poplitibus mucro *desedit. Periculosa etiam vulnera *descēdit sunt, ubicunq; venae maiores sunt, quoniam exhaurire hominem, profusione sanguinis possunt. Idq; euenit non in alis tantum, atq; poplitibus, sed etiam in his venis, quae ad anum, testiculosq; perueniunt. Præter hæc malum vulnus est, quodcunque in alis, vel feminibus, vel inanibus locis, vel in articulis, vel inter digitos est. Item quodcunque musculum, aut neruum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem lesit.

Quæ vulnera tutiorem curationem habeant.

Tutissimū omnium, quod in carne est, & hæc quidem loco, vel peiora, vel meliora sunt. Modò verò periculū facit, quodcūq; magnū est.

Observationes quædam, & ætatis, & corporis & vitæ, & temporis in vulneribus.

Aliquid etiam in vulneris genere, figuraq; est. Nam peius est quod etiam collisum, quàm quod tantum discissum est, adeo ut acuto quoq; , quàm retuso telo vulnerari cōmodius sit. Peius etiā vulnus est, ex quo aliquid excisum est, ex quo'ue caro alia parte abscissa, alia dependet. Pessimaq; plaga in orbem est. tutissima, quæ lineæ modo recta est. Quò deinde propius huic, illi'ue figuræ vulnus est, eò vel deterius, vel tolerabilius est. Quin etiam confert aliquid ætatis, & corpus, & vitæ propositū, et anni tempus: quia facilius sanescit puer, vel adolescens, quàm senior, valēs, quàm infirmus: neq; nimis

tenuis, neq; nimis plenus, quàm si alterum ex his est. Integri habitus, quàm corrupti: exercitatus, quàm iners: sobrius, & temperans, quàm vino, veneriq; deditus. Opportunissimumq; curationi tempus vernum est, aut certè neq; feruens, neq; frigidum. Siquidē vulnera & nimius calor, & nimium frigus infestant: maximè tamen horum varietas, ideoq; perniciosissimus autumnus est. Sed pleraq; ex vulneribus oculis subiecta sunt, quorundam ipsæ sedes indices sunt, quas alio loco demonstrauimus, cū positis interiorum partium ostendimus. Veruntamen quia quedam vicina sunt, interest quoque vulnus in summa parte sit, an penitus penetrauerit: necessarium est notas subijcere, per quas quid intus actum sit, scire possimus, & ex quibus vel spes, vel desperatio oritur.

Signa percussæ cordis.

Igitur corde percussio, sanguis multus effertur, venæ languescunt, color pallidissimus, sudores frigidi, maliq; odoris, tanquam in rotato corpore oriuntur, extremisq; partibus frigidis, matura mors sequitur.

Signa pulmonis icti.

Pulmone uerò icto, spirandi difficultas est, sanguis ex ore spumans, ex plaga rubens, simulq; etiam spiritus cum sono fertur: in vulnus inclinari iuuat, quidam sine ratione consurgunt. Multi si in ipsum vulnus inclinati sunt, loquuntur: si in aliam partem, obmutescunt.

Signa

Signa iocinoris vulnerati.

Iocinoris autem vulnerati notæ sunt, multus sub dextra parte præcordium profusus sanguis, ad spinam reducta præcordia, in ventrem cubandi dulcedo, punctiones, doloresq; vsque ad iugulum, iunctumq; ei latus scapularum, os intentum. Quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit.

Signa percussorum renum.

Renibus verò percussis, dolor ad inguina, testiculosq; descendit, difficulter vrina redditur, eaq; aut est cruenta, aut cruor fertur.

Signa vulnerati lienis.

Al liene ictō, sanguis niger à sinistra parte prorumpit, præcordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt, sitis ingens oritur, dolor ad iugulum, sicut iocinore vulnerato venit.

Signa percussæ vuluæ.

At cum vulua percussa est, dolor inguinibus, & coxis, & femoribus est. Sanguinis pars per vulnus, pars per naturale descendit, vomitus bilis insequitur. Quædam obtumescunt, quædam mente labuntur, quædam sui compotes, nervorum, oculorumq; dolore vrgeri se confitentur, morientesq; tandem, eadem quæ corde vulnerato patiuntur.

Signa percussi cerebri, vel membranæ eius.

Sin cerebrum, membrana'ue eius vulnus accepit, sanguis per nares, quibusdā etiam per aures exit, fereq; bilis vomitus insequitur. Quorundam sensus obtunduntur, appellati'que

s 3

ignor.

ignorant. Quorundam trux vultus est, quorundam oculi quasi resoluti, huc atq; illuc mouentur. Fereq; tertio vel quinto die delirium accedit. Multorum etiā nerui distenduntur. Ante mortem autē pleriq; fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori obiciunt.

Signa percussi stomachi.

Vbi stomachus autem percussus est, singultus, & bilis vomitus insequitur. Si quid cibi vel potionis assumptum est, id redditur cito. Venarum motus elanguescunt, sudores tenues oriuntur, per quos extremae partes frigescent.

Signa ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati, & aliorum intestinorum.

Communes verò ieiuni intestini, & ventriculi vulnerati notae sunt. Nam cibus, & potio per vulnus exeunt, praecordia indurescunt, nunquam bilis per os redditur. Intestino tantum sedes inferior est. Cetera intestina icla vel stercus, vel odorem eius exhibent.

Signa percussae medullae, quae in spina est.

Medulla verò quae in spina est discussa, nerui resoluuntur, aut distenduntur, sensus intercidit: interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt.

Signa septi transversi percussi.

At si septum transversum percussum est, praecordia sursum contrahuntur, spina dolet, spiritus rarus est, sanguis spumans fertur.

Signa

Signa vesicę vulneratę.

Vesica verò vulnerata, dolēt inguina. Quod super pubē est, intenditur, pro vrina sanguis, aut ex ipso vulnere vrina descendit, stomachus afficitur. Itaq; aut bilem vomunt, aut singultiant, frigus, & ex eo mors sequitur.

De sanguine, & sanie, & pure, & eorum speciebus, quando meliora, deterioraue sint.

His cognitis, etiam nunc quedam alia noscenda sunt, ad omnia vulnera vlceraq; de quibus dicturi sumus, pertinētia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est. Sanies est tenuior hoc, varie crassa, et glutinosa, & colorata. Pus crassissimum, albidissimumq; glutinosius & sanguine et sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut iam sanescente. Sanies est inter vtrunq; tempus: Pus ex vlcere iam ad sanitatē spectante. Rursus & sanies, & pus quasdam species Gręcis nominibus distinctas habent. Est enim quędā sanies, quę vel ἰχὼρ, vel meliceria nominatur. Est pus, *μελίκερ- quod ἐλαϊώδες appellatur. ἰχὼρ tenuis, subalbidus ex malo vlcere exit, maximeq; vbi neruo leso inflammatio secuta est. Meliceria crassior, & glutinosior, subalbida melliq; albo subsimilis fertur. Hęc quoq; ex malis vlceribus, vbi nerui circa articulos lesi sunt, & inter hęc loca, maxime ex genibus. Ελαϊώδες tenue, subalbidum, quasi unctum colore atq; pinguitudine, oleo albonon dissimile, adparet in magnis vlceribus

s 4 sanescen

sanefcentibus. Malus autē est sanguis nimium aut tenuis, aut crassus, colore vel liuidus, vel niger, aut pituita mistus, aut varius. Optimus calidus, rubēs, modice crassus, nō glutinosus. Itaq; protinus eius vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit. Itēq; postea spes in his maior est, ex quib⁹ melioris generis quæq; proueniunt. Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis, liuida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quæ & ipsum vlcus, & iunctā ei cutē erodit. Melior non multa, modice crassa, subrubicūda, aut subalbida. Iχθὺς autem peior est multus, crassus, subliuidus, aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris. Tolerabilior est subalbidus, qui cetera omnia contraria prioribus habet. Meliceria autem mala est multa, & percrassa, melior quæ & tenuior, & minus copiosa est. Pus inter hæc optimum est. Sed id quoq; peius est multum, tenue, dilutum, magisq; si ab initio tale est. Itemq; si colore sero simile, si pallidum, si liuidum, si feculentum est. Præter hæc, si male olet, nisi tamen locus hunc odorem excitat. Melius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius. Itemq; si leue est, si nihil olet, si æquale est, modo tamen conuenire, & magnitudini vulneris & tēpori debet. Nam plus ex maiore, plus nondum salutis inflammationibus naturaliter fertur. Elaodes quoq; peius est multum, & parum pingue, quo minus etiam, quoq; id ipsum pinguius, eo melius est.

Curatio

Curatio aduersus profusionem sanguinis in vulneribus.

Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui seruari potest, protinus prospicienda duo sunt, ne sanguinis sit profusio, ne' ve inflammatio interimat. Si profusionem timeamus, quod ex sede vulneris, & magnitudine eius, & ex impetu ruentis sanguinis intelligi potest, siccis linamentis vulnus implendū est, supraq; imponenda spongia, ex aqua frigida expressa, ac manus super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, sepius linamenta mutanda sunt. Et si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem supprimendū est. Ideoq; quidam id vulnere infundunt. Sed alius rursus metus subest, ne nimis valenter ibi retenta materia magnam inflammationem postea moueat. Quæ res efficit, ut neq; rodentibus medicamentis, neq; adurentibus, & ob id ipsum inducentibus crustam, sit vtendum, quamuis pleraq; ex his sanguinem supprimunt. Sed si semel ad ea decurritur, potius quæ mitius idem efficiunt. Quod si illa quoq; profluvio vincuntur, venæ quæ sanguinem fundunt apprehedendæ, circaq; id quod ictum est, duobus locis deligandæ, intercidedæq; sunt, ut & in se ipsæ coeant, & nihilominus ora præclusa habeant. Vbi ne id quidem res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque neruus, neq; musculus est, vt puta in fronte, vel

s s superio

superiore capitis parte, commodissimum tamen est, cucurbitulam admouere à diuersa parte, vt illuc sanguinis cursus reuocetur.

Curationes aduersus vulnorum inflammationem.

ET aduersus profusionem quidem in his auxilium est. Aduersus inflammationem autem in ipso sanguinis cursu, ea timeri possunt, vbi lesum est vel os, vel neruus, vel cartilago, vel musculus: aut vbi parus sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem maturè suppressere non oportebit, sed pati fluere, dum tutum erit, adeo vt si parum fluxisse videbitur, mitti quoq; ex brachio debeat, vtiq; si corpus iuuenile, & robustum, & exercitatum est: multoq; magis, si id vulnus ebrietas praecessit. Quod si musculus latus videbitur, praecidendus erit. Nam percussus mortiferus est: praecisus sanitatem recipit.

De glutinatione vulnerum.

Sanguine autem vel suppresso, si nimius erumpit: vel exhausto, si per se parum fluxit, longè optimum est vulnus glutinari. Potest autem id vel quod in cute vel etiam in carne est, si nihil ei praeterea mali accedit. Potest caro alia parte dependens, alia inherens, si tamē etiam nūc integra est, & coniunctione corporis fouetur. In his verò quae glutinantur duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte, sui debet, maximeq; si discissa auris ima est, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur

guttur cutis vel venter. Si verò in carne vulnus est, hiatq; neq; in unum ora facile attrahuntur, sutura quidē aliena est. Imponendæ verò fibulae sunt (ἀνίστασθαι Græci nominant) quæ oras, paulum tamē, contrahunt, quo minus lata postea cicatrix sit. Ex his autem colligi potest, id quoq; quod alia parte dependens, alia inhaerebit, si alienatum adhuc nō est, suturam, an fibulā postulet. Ex quibus neutra antè debet imponi, quàm intus vulnus purgatum est, ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim & in pus vertitur, & inflammationē movet, & glutinari vulnus prohibet. Ne linamentū quidem, quod supprimendi sanguinis causa inditū est, inibi relinquendum est. Nam id quoq; inflamat. Comprehendi vero sutura vel fibula non cutem tantum, sed aliquid etiā ex carne, ubi suberit hæc, oportebit, quò valentius hereat, neq; cutem abrumpat. Utraq; optima est ex *acia molli non nimis *acia torta, quò mitius corpori insidat. Utraq; neq; nimis rara, neq; nimis crebra iniicienda est. Si nimis rara est, non continet. Si nimis crebra est, vehementer afficit, quia quò sæpius acus corpus *transiit, quoq; plura loca iniectum vinculum *transiit mordet, eo maiores inflammationes oriuntur, magisq; æstare. Neutra etiam vim illam desiderat: sed eatenus utilis est, quā cutis ducentem, quasi sua sponte subsequitur. Ferè tamen fibula latius vulnus esse patiuntur. Sutura oras iungit, quæ ne ipse quidem inter se contingere ex toto debent

bent, ut si quid intus humoris cōcreuerit, sit quā
emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit,
id tamē purgari debet, deinde omni vulnere pri-
mo imponenda est spongia ex aceto expressa: si
sustinere aliquis aceti vim non potest, vinum ten-
dum est. Levis plaga iuuatur etiam, si ex aqua
frigida expressa spongia imponitur. Sed ea quo-
cunq; modo imposita est, dū manet, prodest. Itaq;
ut inarescat, non est committendum. Licet q; si-
ne peregrinis, & conquisitis, & compositis me-
dicamentis vulnus curare. Sed si quis huic pa-
rum confidit, imponere medicamentum debet,
quod sine seuo compositum sit ex his, quæ cruen-
tis vulneribus apta esse proposui. Maxime q; si
caro est, barbarum: si nerui, vel cartilago, vel
aliquid ex eminentibus, quales aures, vel labra
sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoq;
viride neruis idōneum est, eminentibus q; parti-
bus ea, quam Græci πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις vocant. Solet e-
tiā colliso corpore exigua parte findi cutis. Quod
ubi incidit, non alienum est scalpello latius ape-
rire, nisi muscoli, neruiq; iuxta sint, quos incidi
non expedit. Vbi satis deductum est, medica-
mentum imponendum est. At si id quod collisum
est, quamuis parum deductum est, latius tamen
aperiri propter nervos, aut musculos non licet,
adhibenda sunt ea, quæ humorem leniter extra-
hant, præcipue q; ex his, id quod rhypodes voca-
ri proposui. Non alienum est, etiam ubicunque
vulnus graue est, impositum, quo id iuuetur,
insuper

insuper circumdare lanam succidam ex aceto,
& oleo. Vel cataplasma, si mollis is locus est,
quod leniter reprimat, si nervosus aut masculo-
sus, quod emolliat.

Quomodo vulnus ligari conveniat.

Fascia verò ad vulnus deligandum, lintea
aptissima est, eaq; lata esse debet, ut semel
injecta non vulnus tantum, sed paulum utrinq;
etiam oras eius comprehendat. Si ab altera par-
te caro magis recessit, ab ea melius attrahitur.
Si aequè ab utraq; transverse cōprehendere oras
debet: aut si id vulneris ratio non patitur, media
primū mīcienda est, ut tum in utranq; par-
tem ducatur. Si autem deliganda est, ut & con-
tineat, neq; astringat. Quod non continetur, ela-
bitur: Quod nimis astrictum est, cancro pericli-
tatur. Hyeme sepius fascia circuire debet, æstate
quoties necesse est, tum extrema pars eius in-
ferioribus acu assuenda est. Nam nodus *vulnus *vulnus
lædit, nisi tamen longè est. Illo neminem decipi
debet, ut propriam viscerum curationem requi-
rat, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa cu-
randa extrinsecus, vel sutura, vel alio medicine
genere est. In visceribus nihil movendum est,
nisi aut si quid ex iocinore, aut liene, aut pulmo-
ne duntaxat extremo dependat, præcidatur. A-
lioquin vulnus interius, ea victus ratio, eaq;
medicamenta sanabunt, quæ cuiq; visceri con-
venire superiore libro proposui.

De ratione victus, & notis vulnerum cu-
rationibusq; eorum.

His ita

His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est, isq; si graue vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem a cibo debet: bibere donec sitim finiat aquam calidam: vel si aestus est, neq; febris, neq; dolor est, etiam frigidā. Adeo tamen nihil perpetuum est. Sed semper pro viribus corporis aestimandum, ut imbecillitas etiā cibum protinus facere necessarium possit, tenuem scilicet et exiguum, qui tantum sustineat. Multiq; etiam ex profluvio sanguinis intermorientes, ante ullam curationē vino reficiendi sunt, quod alioqui micissimum vulnere est. Nimis verò intumescere vulnus, periculosum: nihil intumescere, periculosissimum est. Illud indicium est magnae inflammationis, hoc emortui corporis. Protinusq; si mens homini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, maturē vulnus sanum fore. Ac ne febris quidē terrere debet, si in magno vulnere, dum
 * inflam- * inflatio est, permanet. Illa perniciosa est, quae
 matio vel leui vulnere supervenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium movet, vel si nervorum rigor, aut distentio, quae ex vulnere orta est, eam non finit. Vomitus quoq; biliosus non voluntarius, vel protinus ut percussus est aliquis, vel dum inflammatio manet, malum signum est in his duntaxat, quorum vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere non alienum est, praecipue his, quibus in consuetudine fuit: sed neq; protinus post cibum, neq;
 iam

iam inflammatione orta, neq; cū in superioribus partibus plaga est. Biduo sic vulnere habito, tertio die aperiendū, detergendāq; sanies ex aqua frigida est, eadēq; rursus injicienda sunt. Quinto iam die quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo die rursus detecto vulnere cōsiderandus color est. Quod si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est, scire licet malum vulnus esse: idq; quādo cūq; animaduersum est, terrere nos potest. Album, aut rubicundum esse vlcus, commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit. Bona signa sunt, ubi haec sine dolore tenuis, et mollis est. Sed si glutinatur vulnus, aut leuiter intumuit, eadē sunt imponenda, quae primò fuerunt. Si grauis inflāmatio est, neq; glutinandi spes est, eaq; pus moueat, aquae quoq; calidae necessarius vsus est, vt & materiā digerat & duritiā emolliat, & pus citet. Ea sic tēperanda est, vt & manu contingēti iocunda, sit, vsq; eò adhibenda donec aliquid ex tumore minuisse, coloremq; vlceri magis naturalē reddidisse videatur: maximeq; si grande vulnus est, tetrapharmacum: si in articulis, digitis, locis cartilaginosis, rhypodes. Post id fomentum, si lata plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet, & si latus hiat, illud emplastrum liquari ex irino vnguento oportet: eoq; illata linamenta disponi per plagam, deinde emplastrum suprà dari, & super illa succidam lanā, minusq; etiam, quā primò, fasciae astringendae sunt.

Curatio

Curaciones proprię articulorum.

Proprię quedam in articulis visenda sunt, in quibus si præcisi nerui sunt, qui continebant, debilitas eius partis sequitur. Si id dubium est, & ex acuto telo plaga est, ea transversa commodior est. Si retuso & graui est, nullum in figura discrimen est. At visendum est pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albuq; & crassum diu fertur, neruum præcisum esse credibile est. Magis quoq; maiores dolores inflammationesq; quò maturius excitare sunt. Quamuis autem non abscissus neruus est, tamen si circà tumor durus diu permanet, necesse est & diuturnum vlcus esse, & sano quoq; eo tumorem permanere, futurūq; est, vt tardè membrum id extendatur vel contrahatur. Maior tamen in extendendo mora est, vbi recuruato articulo curatio adhibita est, quàm in recuruando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoq; membrum quod iectum est ratione certa debet. Si glutinandum est, vt superius sit, si in inflammatione est, vt in neutram partem inclinatum sit. Si iam pus profluit, vt deuexum sit. Optimum etiam medicamentum quies est: moueri & ambulare, nisi sauis, alienum est. Minus tamen his est periculosum, qui in capite vel brachijs, quàm qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minimeq; ambulatio conuenit, femine, aut crure, aut pede laborante. Locus in quo cubabit, tepidus esse debet. Balneum quoque dum parum
vulnus

vulnus purum est, inter res infestissimas est. Nam id & humidum, & sordidum reddit, ex quibus ad cancrum transitus esse consuevit. Lenis frictio rectè adhibetur, sed his partibus, quæ longius absunt à vulnere.

Vulnus quomodo purgandum est.

INflammatione finita, vulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta, supraq; id, emplastrum, vel enneapharmacum dandum est. Tum demum verò purum vlcus est, cum rubet, ac nimium neque siccum, neq; humidum est. Ac quodcunq; sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum, aut humidum est: quod aut pallidum, aut albidum, aut liuidum, aut nigrum est, id purum non est.

Quomodo vulnus implendum est

Purgato, sequitur vt impleatur, iamq; calida aqua eatenus necessaria est, vt sanies remoueat. Lanæ succidæ supernacius vsus est. Lota melius circumdatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua. Itaq; ea adhiberi non alienum est, vt butyrum cum rosa, exigua mellis parte, aut cum eadem parte, aut cum eadem rosa tetrapharmacum, aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum. Cibi boni succi, vitatis omnibus acribus, sed iam plenioribus. Nam & auis, & venatio, & suilla elixa dari potest. Vnum omnibus dum febris, dum inflammatio est, alienum est. Itemq; vsque ad cicatricem, si nervi, musculi ue

vulner

vulnerati sunt, etiam si alta caro, aut si plaga in summa cute generis tutioris est, potest non perue-
tus, modice tamen datum, ad implendum quoque
proficere. Si quid mollicendum est, quod in ner-
uosis locis, musculisq; necessarium est, cerato
quoque super vulnus vtendum est. At si caro su-
percreuit, modice reprimat siccum linamentum,
vehementius squama aris. Si plus est, quod tol-
li opus est, adhibenda sunt etiamnum vehemen-
tiora, quæ corpus exedant. Cicatricem post o-
mnia hæc commodè inducit, lycium ex passo, aut
lacte dilutum, vel etiam per se impositum sic-
cum linamentum.

De vlceribus, quæ extrinsecus per vulnera in-
cidunt, curationibusq; eorum.

Hic ordo felicitis curationis est. Sed quedam
tamen periculosa incidere consueverunt. In-
terdum enim uetustas vlcus occupat, induciturq;
ei callus, & circum ora crassæ liuent, post quæ
quicquid medicamentorum ingeritur, parum pro-
ficit, quod fere negligenter curato vlcere super-
uenit. Interdum vel ex nimia inflammatione,
vel ob æstus immodicos, vel ob nimia frigora,
vel quia nimis vulnus æstrictum est, vel quia
corpus aut senile, aut mali habitus est, cancer
occupat. Id genus à Græcis diductum in species
est, nostris vocabulis non est. Omnis autem can-
cer non solum id corrumpit, quod occupauit, sed
etiam serpit, deinde alijs alijsq; signis determi-
tur. Nam mox super inflammationem rubor
vlcus

vlcus ambit, isq; cum dolore procedit, ὀδυνώ-
 δας Græci nominant. Modò vlcus nigrum est,
 quia caro eius corrupta est. Idq; vehementius
 etiam putrescendo intenditur. Vbi vulnus hu-
 midum est, & ex nigro vlcere humor pallidus
 fertur, maliq; odoris est, caruncula corruptæ.
 Interdum etiam nerui ac membranae resoluun-
 tur, specillumq; demissum descendit aut in latus,
 aut deorsum, eoq; vitio nonnunquam os quoque
 afficitur. Modò oritur ea, quàm Græci γὰρφα-
 νον appellant. Priores in qualibet parte corpo-
 ris fiunt. Hæc in prominentibus membris, id est
 inter ungues, & alas vel inguina, fereq; in se-
 nibus, vel his quorum corpus mali habitus est.
 Caro in vlcere vel nigra, vel liuida est, sed sicca
 & arida, proximaq; cutis plerūq; subnigris* pu- * pusulis
 stulis impletur, deinde ei proxima vel pallida,
 vel liuida, fereq; rugosa sine sensu est. Vltior in
 inflammatione est, omniaq; ea simul serpunt.
 Vlcus in locum pustulosum: Pustula, in eum qui
 pallet aut liuet: Pallor aut liuor, in id quod in-
 flammatum est: Inflammatio, in id quod inte-
 grum est, transit. Inter hæc deinde febris acuta
 oritur, ingensq; sitis, quibusdam etiam delirium
 accedit, alij quamuis mentis suæ compotes sunt,
 balbutiendo tamen vix sensus suos ore expli-
 cant. Incipit affici stomachus. Fit sædi spiritus
 ipse odoris. Atq; initium eius quidem mali reci-
 pit curationem. Vbi verò penitus insedit, insana-
 bile est, plurimiq; sub frigido sudore moriuntur.

*conci-
dum

AC pericula quidem vulnerum hæc sunt. Vetus autem vlcus scalpello *incidendum est, excidenda q̄; eius ora, & quicquid super eas liuet, æquè incidendum. Si varicula intus est, quæ his sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde, vbi sanguis emissus, nouatumq̄; vulnus est, eadem curatio adhibenda, quæ in recentibus vulneribus exposita est. Si scalpello aliquis vi non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex ladano fit, & cum vlcus sub eo exesum est, id quo cicatrix inducitur.

Curatio Erysipelarum.

ID autem quod Erysipelas vocari dixi, non solum vulnere superuenire, sed sine hoc quoq; oriri consuevit, atque interdum periculum maius affert, vtique si circa ceruices aut caput constitit. Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mittere, deinde imponere simul reprimentia & refrigerantia, maximeq̄; cerussam solani succo, aut cimoliam cretam aqua pluuiali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam cupresso adiecta, aut si tenerius corpus est, lenticulam. Quicquid impositum est, betæ folio contegendum est, & super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo, sulphuris P. I. *

* P. X I I. cerussæ & croci, singulorum * P. X X. *. eaq̄; cum vino conterenda sunt, & id his illinendum:
aut.

aut si durior locus est, solani folia contrita, suillæ adipi miscenda sunt, & illita linteolo superinijcienda. At si nigrities est, neque dum serpit, imponenda sunt, quæ carnem putrem lenius exedant, repurgatumq; vlcus sic vt cetera nutriendum est. Si magis putre est, iamq; procedit ac serpit, opus est vehementius erodentibus. Si ne hæc quidem euincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanū est, siccum est cum aduritur, post vstionem putris vlceris superponenda sunt quæ crustas à vino resoluant, eas ἐσχαρὰς Græci vocant. Vbi exciderunt, purgandum vlcus maxime melle & *resina est, sed alijs quoque purgari potest, qui- *resina bus purulenta curantur, eodemq; modo ad sani- vsta- tatem perducendum est.

Curatio Gangrænæ.

GAngranam verò, si nondum planè tenet, sed adhuc incipit curare non difficilimum est, vtiq; in corpore iuuenili, & magis etiam si muscoli integri sunt, si nerui vel læsi non sunt, vel leuiter affecti sunt, neque vlus magnus articulus nudatus est, aut carnis in eo loco paulum est, ideoq; non multū, quod putresceret, fuit, consistitq; eo loco vitium: quod maxime fieri in digito potest. In eiusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere. Deinde quicquid aridum est, & intentione quadam proximum quoque locum male habet, *vsq; ad sanum *vsq; eo corpus concidere. Medicamenta verò, dum ma-
sa.

t 3 lum

lum serpit, adhibenda nulla sunt, quæ pus mouere consuerit, ideoq; ne aqua quidem calida. Gravia quoq; quamuis reprimantia, aliena sunt. Sed his quàm leuissimis opus est, superq; ea quæ inflammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, vri id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet. Præcipueq; in hoc casu petendum, non à medicamentis solum, sed etiam à victus ratione præsidium est. Neque enim id malum nisi corrupti vitiosiq; corporis est. Ergo, primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia utendum. Deinde danda quæ per cibum potionemq; aluum, ideoq; etiam corpus, astringant, sed ea leuia. Postea si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quæ in putri ulcere præscripta sunt. Ac tum quoq; plenioribus cibis uti licebit ex media materia, sic tamen non nisi aluum, corpusq; siccantibus: aqua verò pluuiali frigida balneum (nisi iam certa fiducia reddita sanitatis est) alienum est, siquidem emollitum in eo vulnus, cito rursus eodem malo afficitur. Solent verò nonnunquam nihil omnia auxilia proficere, ac nihilominus serpere his cancer. Inter quæ miserum, sed vnicum, auxilium est, ut cætera pars corporis tuta sit, membrum quod paulatim emoritur, abscindere. Ha grauißimorum vulnèrũ curationes sunt. Sed ne illa quidem negligenda, vbi integra cute interior pars collisa est, aut vbi deraßum, attritum, ne aliquid est, aut vbi surculus corpori infixus est, aut vbi te-

me,

ue, sed altum vulnus inſedit. In primo caſu
 commodiſſimum eſt malicorium ex vino coque-
 re, interioremq; eius partem conterere, & cera-
 to miſcere ex roſa faſcio, idq; ſupponere: deinde
 ubi cutis ipſa exaſperata eſt, inducere lene me-
 dicamentum, quale λιπαρά eſt. Deraſo verò,
 detrictoq; imponendum eſt emplaſtrum tetraphar-
 macum, minuendusq; cibus, & vinum ſubtra-
 hendū. Neq; id quia non habebit altiores ictus,
 contemnendum erit. Siquidem ex eiufmodi ca-
 ſibus ſape cancri fiunt. Quòd ſi leuius id erit, &
 in parte exigua, contenti eſſe poterimus eodem
 leni medicamento. Surculum verò (ſi fieri po-
 teſt) oportet vel manu, vel etiam ferramento eij-
 cere. Si vel praefractus eſt, vel altius deſcendit,
 quàm vt ita fieri poſſit, medicamento euocandus
 eſt. Optime autē educit ſuperimpoſita arundinis
 radix, ſi tenera eſt protinus contrita: ſi iam du-
 rior, antè in mulſo decocta. Cui ſemper mel adij-
 ciendum eſt, aut ariſtolochia cum eodem melle.
 Peſſima ex ſurculis arundo eſt, quia aſpera eſt.
 Eademq; offenſa, etiam in filice eſt. Sed uſu co- * filicis ha
 gnitū eſt, utraq; aduerſus alteram medicamen- ſtula
 tum eſſe, ſi contrita ſuperimpoſita eſt. Facit au-
 tem idem in omnibus ſurculis, quodcūq; medica-
 mentū extrahendi vim habet. Idem altis tenui-
 busq; vulneribus aptiſſimū eſt. Priori rei Philo-
 crati, huic Helicæ emplaſtrum maxime cōuenit.

Quomodo cicatrix vulneri inducenda,
 purgandaq; ſit.

§ 4

Vbi

Vbi vero in quolibet vulnere ventū ad inducendum cicatricem est, quod per purgatis iam repletisq; vlceribus necessarium est: primum ex aqua frigida linamentū, dum caro alitur: deinde cum iam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur. Tum deligari super album plumbum oportet, quo & reprimatur cicatrix, & colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix sylvestris cucumeris præstat. Idem compositio, quæ habet elaterij p.i. ✱. spuma argenti p.ii. ✱. vnguenti pondo iiii. ✱. Quæ excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. Ac nigras quoque cicatrices leniter purgant paribus portionibus mixta, ærugo, plumbum elotum, eademq; rosa cocta, siue vngitur cicatrix, quod in facie fieri potest: siue id vt emplastrum imponitur, quod in alijs partibus commodius est. At si vel excreuit cicatrix, vel concaua est, stultum est decoris causa rursus, & dolore & medicinam sustinere. Alioqui res utriq; succurri patitur. Siquidem utraq; cicatrix exulcerari scalpello potest. Si medicamentum aliquis mauult, idem efficiunt compositiones hæ, quæ corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnē exedentia medicamenta coniicienda sunt: super concauam implentia, donec utrunq; vlcus sanæ cuti æquetur, & tum cicatrix inducatur.

De vulneribus quæ per morsus inferuntur, eorūq; curationibus. CAP. XXVII.

Dixi

DIxi de his vulneribus, quæ maxime per tela inferuntur. Sequitur, ut de his dicam, quæ morſu fiunt, interdum hominis, interdum ſimiae, ſepe canis, nonnunquam ſerorū animalium, aut ſerpentium. Omnis autem feræ morſus habet quoddam virus. Itaq; ſi vehemens vulnus eſt, cucurbitula admouenda eſt. Si leuius, protinus emplaſtrū iniiciendum, præcipueq; * Diogeſi. Si * Diogeſi id non eſt, quodlibet ex his, quæ aduerſus morſus niſ propoſui. Si ea non ſunt, viride Alexandrinum. Si ne id quidem eſt, quodlibet non pingue ex his quæ recentibus vulneribus accommodantur. Sal quoq; his, præcipueq; ei, quod canis fecit, medicamentū eſt, ſi manus uulneri imponitur, ſuperq; id duobus digitis verberatur: Exaniat enim: ac ſaſamentū quoq; recte ſuper id vulnus deligatur.

Curatio aduerſus rabioſi canis morſum.

VTiq; autem ſi rabioſus canis fuit, cucurbitula virus eius extrahendum eſt. Deinde ſi locus neque neruoſus neq; muſculoſus eſt, vulnus id adurendum eſt. Si vri non poteſt, ſanguinem homini mitti non alienū eſt. Tum vſto quidem vulnere ſuperimponenda, quæ cæteris vſtis, ſunt. Ei verò quod expertum ignem non eſt, ea medicamenta, quæ vehementer exedunt. Poſtq; nullo nouo magiſterio, ſed iam ſuprapoſito vlcus erit implendum, & ad ſanitatē perducendum. Quidam poſt rabioſi canis morſum protinus in balneum mittunt; biq; patiuntur deſidare, dum vires corporis ſumunt, vlcere ad aperto, quo magis

t s gis

Timor aquæ. *ἡ δὲ φοβία* Timor nasci, *ἡ δὲ φοβία* Græci appellant. Mili-
 ferrimū genus morbi, in quo simul eger & siti,
 & aqua metu cruciatur. Quo oppressus in angu-
 sto spes est. Sed vnicum tamen remedium est, nec
 opinantē in piscinam non antē ei prouisam pro-
 iicere. Et si natandi scientiam non habet, modō
 mersum bibere pati, modō attollere. Si habet, in-
 terdum deprimere, ut inuitus quoq; aqua satie-
 tur. Sic enim simul & sitis, & aquæ metus tol-
 litur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum
 corpus in aqua frigida vexatu, nervorū disten-
 tio absumat. Id ne incidat, à piscina protinus in
 oleum calidum demittēdus est. Antidotum au-
 tem, præcipuè id, quod primo loco posui: ubi id
 non est, aliud, si nondum eger aquam horret, po-
 tui ex aqua dandū est, & si amaritudine offen-
 ditur, mel adijciendum est. Et si iam is morbus
 occupauit, per catapotia sumi potest.

Curationes communes, ad uel sus omnes
 mor sus serpentium.

Serpentium quoque morsus non nimium di-
 stantem curationē desiderant, quamuis in ea
 multum antiqui variarunt, ut in singula genera
 anguium singula medendi genera præciperent,
 atq; alijs alia. Sed in omnibus eadem maxime
 profic

proficiunt. Igitur in primis super vulnus id membrum diligendum est, non tamen nimium vehementer, ne torpeat. Dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula optime facit. Neque alienum est, antè scalpello circa vulnus incidere, quo plus vitiatum iam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est, quod tamen uix incidere potest, tum quodlibet simile vas, quod idem possit. Si ne id quidem est, homo adhibendus est, qui vulnus exugat. Neque Hercules scientiam precipuam habent hi qui Psylli nominantur, sed audaciam usu ipso Psylli. confirmatam. Nam venenum serpentis, ut quedam etiam venatoria venena, quibus Galli precipue utuntur non gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque colubra ipsa tuto est, ictus eius occidit, & si stupente ea (quod per quedam medicamenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, neque percussus est, nulla in ea salina noxa est. Ergo quisquis exemplis Psylli secutus, id vulnus exugerit, & ipse tutus erit, & tutum hominem prestabit. Illud ne intereat, antè debet attendere, ne quod in gingivis, palato'ne, alia'ne parte oris vlcus habeat. Post hac is homo loco calido collocandus est, sic ut id, quod percussum erit, in inferiorem partem inclinetur. Si neque qui exugat, neque cucurbitula est, sorbere oportet ius anserinum, vel ouillum, vel vitulinum, & vomere. Vinum autem gallinaceum pullum per medium diuidere, & protinus calidum super vulnus imponere, sic ut pars interior corpori iungatur. Facit id

id etiam hœdus, agnus'ue discissus, & calida eius caro statim super vulnus imposita. Emplastrum quoque, quæ supra comprehensa sunt. Aptissimumque est, vel Ephesium, vel id quod ei subiectum est. Præsensque in aliquo antidoto præsidium est. Sin id non est, necessarium est exorbere portionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud, quo calor mouendus est, ne humorem intus coire patiatur. Nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam mouentia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

Speciales curationes aduersus ictus serpentium,
& primo aduersus ictum aspidis.

HAec aduersus omnes ictus communia sunt. Vnus tamen ipse docuit, eum quem aspis percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cuiusdam pueri, qui cum ab hac ictus esset, & partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos aestus siti premeretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acetum quod forte secum habebat, ebibit, & liberatus est. Credo quoniam id, quamuis refrigerandi vim habet, tamen habet etiam dissipandi. Quò fit, ut terra respersa eo, spumet. Eadem ergo vi verisimile est, spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, & sic dari sanitatem.

Aceti vis
& natura.

Aduersus ictum scorpionis.

IN quibusdam etiam alijs serpentibus, certa quedam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio sibi ipse pulcherrimum medicamentum est. Quidam

dam contritum cum vino bibunt, quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt, quidam super prunam eo imposito, vulnus suffumigant, undique veste circumdata, ne is fumus dilabatur, tum carbonem eius super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris, quam *ἡλιότροπον* Græci vocant, semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam fursures ex aceto, vel ruta syluatica recte imponitur, vel cum melle saltoctus. Cognoui tamen medicos, qui ab scorpione ictis, nihil aliud quam ex brachio sanguinem miserunt.

Heliotropium herba solaris.

Aduersus aranei, & scorpionis ictum.

ET ad scorpionis autem, & ad aranei ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoq; contritum semper imponitur.

Aduersus cerasitis, & dipsas, & hæmorrhoidis ictum.

AT si cerasites, aut dipsas, aut hæmorrhoidis percussit* asphodeli, quod Aegyptiae fabae* catapotium magnitudinē aequet, arefactum, in duas portiones diuidendum est, sicut ei rutæ paulum adijciatur. Trifolium quoq; & mentastrum, & cum aceto panaces aequè proficiunt. Costumq; & casia, & cinamomum recte per portione[m] assumuntur.

Aduersus chersydri ictum, & cerasitis.

ADuersus chersydri verò ictum, panaces, aut laser, quod sit scrupulorum* *p. i. i.* vel * *i. i. i.* porri succus cum hemina vini sumendus est, & * *i.* edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum, aut
ex.

ex eodem ordeacea farina, aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita melle adiecto. Quod in eo quoque vulnere, quod ceras tes fecit, æquè valet.

Aduersus phalangii ictum.

Vbi verò phalangium nocuit, præter eam curationem quæ manu redditur, sæpe homo demittendus in solium est, dandusq; ei myrrha, & rosæ taminæ par modus ex passî hemina, vel radiculæ semen, aut lolij radix ex vino, & super vulnus fursures ex aceto coctæ, imperandumq; ut is conquiescat.

Aduersus ictus Italorum anguium, qui minus terribiles peregrinis sunt.

Verum hæc genera serpentium & peregrina, & aliquâto magis pestifera sunt, maximeq; æstuosus loci gignuntur. Italia, frigidioresq; regiones hac quoq; parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Aduersus quos satis proficit herba betonica, vel cantabrica, vel cætaurion, vel agrimonia, vel trixago, vel personna, vel marinæ pastinacæ, singulæ binæue tritæ, & cum vino potui datæ, & super vulnus impositæ. Illud ignorari non oportet, omnis serpētis ictum & ieiuni, & ieiuno magis nocere. Ideoq; perniciosissimi sunt cum incubāt. Vtilissimumq; est, ubi ex anguib; metus est, non antè progredi, quàm quis aliquid assumpsit.

Remedium generale aduersus omnia venena, vel in cibo, vel in potione assumpta.

Non tam facile his opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potione sumpserunt.

runt. Primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti, ita ne succurrere quidem statim sibi possunt. Deinde, quia noxa non à cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, & bi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto vomere. Deinde, ubi precordia exhaust, bibere antidotum. Si id non est, vel merum vinum.

Specialia remedia aduersus quædam venena,
& primo aduersus cantharidas.

Sunt tamē quædam remedia propria aduersus quædam venena, maximeq; leniora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacto contusa, vel galbano, vino adiecto dari, vel lac per se debet.

Aduersus cicutam

Si cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est, deinde is vomere cogendus. Posteaq; laser ex vino dandum. Isq; si febre vacat, in calidum balneum mittendus. Si non vacat, vngendus ex calefacientibus est. Post que quies ei necessaria est.

Aduersus hyoscyamum

Si hyoscyamum, feruens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen asininum.

Aduersus cerussam.

Si cerussam, ius malue, vel ius glandis ex vino contrite, maxime profunt.

Aduersus sanguisugam si epota est, &

lac quod intus coit.

Si sanguisuga epota est, acetum cum sale bibendum est. Si lac intus coit, aut passum,

aut coagulum, aut cum aceto laser.

Aduersus fungos inutiles.

SI fungos inutiles quis assumpserit, radícula aut epota, aut cum sale & aceto edenda est. Ipsi verò hi & specie quidem discerni possunt * fieri ab vtilibus, & cocturae genere idonei * sunt. Nam siue ex oleo inferbuerint, siue piri surculus cum his inferbuit, omni noxa vacant.

De adustis corporis locis, & quomodo curari debent.

ADustis quoq; locis extrinsecus vis inferitur, itaq; sequi videtur, ut de his dicam. Hæc autem optime curantur folijs aut lilij, aut lingua canina, aut betæ in vetere vino oleoq; decoctis. Quorum quodlibet protinus impositum, ad sanitatem perducit. Sed diuidi quoq; curatio potest in ea, quæ mediocriter exedentia reprimentiaq; primò & pustulis prohibeant, & summâ pelliculam exasperent. Deinde ea quæ lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticula cum melle, farina, vel myrrha, vel vino, creta cimolia cum thuris cortice contrita, & aqua cocta, atque vbi vsus necessitas incidit, aceto diluta. Ex insequentibus qualibet lipara. Sed idonea maxime est, quæ vel plumbi recrementum, vel vitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatiō est, impositam habere cum melle lenticulam. Vbi ea declinauit farina cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crusta cadant. Tum erium cum melle, aut irim, aut resinā tereb

terebinthinam, donec vlcus purum sit. Nouissime siccum linamentum.

De interioribus vlcibus, quæ aliqua corporū parte corrupta nascuntur CAP. XXVIII.
De carbunculo, & eius curatione.

A his quæ extrinsecus incidunt, ad ea veniendum est quæ interius corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo peius. Eius hæc notæ sunt: Rubor est, superq; eum non nimium pustula eminent, maxime nigra, interdum subliuida, aut pallida. In his sanies esse videtur, infra color niger est. Ipsum corpus aridū, & durius quàm naturaliter oportet. Circa quæ quasi crusta est, eaq; inflammatione cingitur, neq; in eo loco leuari cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Somnus vrget, nonnunquam horror, aut febris oritur, aut vtrunq;. Idq; vitium subteractis quasi quibusdā radicibus serpit, interdum celerius, interdū tardius, supra quoq; procedens inalbescit, dein liuidum fit, circumq; exigue pustula oriuntur. Et si circa stomachum fauces'ue incidit, subito spiritū sæpe elidit. Nihil melius est, quàm protinus adurere. Neque id graue est. Nam non sentit, quoniam ea caro mortua est. Finisq; adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta vndique à viua carne diducta, quæ trahit secum quicquid corruptum erat, purusq; iam si-

v nus

nus curari potest implentibus. At si in summa cute vitium est, possunt succurrere quedam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia. Vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcūq; verò medicamentum positum est, si satis proficiet, protinus a viua corruptam partem resoluit. Certa q; esse fiducia potest, ferè ut vndiq; vitiosa caro excedat, qua huiusce rei medicamen exest. Si id non fit, medicamentum q; malo vincitur, utique ad vstionem properandum est. Sed in eiusmodi casu abstinentum à cibo, à vino est. Aquam liberaliter bibere expedit. Magis q; ea seruanda sunt, si febricula quoque accessit.

De Carcinomate, & eius curatione.

Non idem periculum *καρκίνωμα* affert, nisi imprudentia curantis agitata est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciē, nares, aures, labra, mammæ sœminariū. Et in iecore autem, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur, is q; immobilis, inæqualis tumet, interdum etiam torpet. Circa eum inflatæ venæ quasi recurvantur, hæq; palent, aut liuent, nonnunquā etiam in quibusdam delitescunt. Tactus q; is locus, alijs dolorē affert, in alijs eum non habet. Et nonnunquā siue vlcere durior aut mollior est, quā esse naturaliter debet, nonnunquam iisdem omnibus vlcus accedit. Interdum q; nullam habet proprietatē, interdum simile his est, quæ vocant Græci *κονδυλώματα*, spredine quadam & magnitudine sua. Color q;

Colorq; eius ruber est, aut lenticula similis, neq;
tuto fertur. Nam protinus aut resolutio nervorū,
aut distentio insequitur. Sæpe homo ictus obmu-
tescit, atq; eius anima deficit. Quibusdā etiam si
id ipsum pressum est, quæ circa sunt, intēduntur
& intumescūt. Nanq; pessimū id genus est, fe-
req; primū id sit, quod κακονδες à Grecis nomi-
natur. Deinde ex eo id κακινωµα, quod sine
ulcere est. Deinde vlcus ex eo thymiū. Tolle ni-
hil nisi κακονδες potest, reliqua curationibus ir-
ritantur. Et quo maior vis adhibita est, eo magis
quidā vfi sunt medicamētis adurentibus. Quidā
ferro adusserunt. Quidā scalpello exciderūt. Neq;
vlli vnquā medicina proficit. Sed adusta proti-
nus concitata sunt, & increuerunt, donec occide-
rent. Excisa etiā post inductam cicatricē, tamen
reuerterunt, & causam mortis attulerunt. Cum
interim pleriq; nulla vim adhibendo, qua tollere
id malum tentent, sed imponendo tantum lenia
medicamēta, quæ quasi blandiantur, quo minus
ad vltimam senectutē perueniant, non prohiben-
tur. Discernere autem cacoethes, quod curationē
recipit, à carcinomate, quod non recipit, nemo
scire potest, nisi tempore & experimento. Ergo
vbi primum id vitium notatum est, imponi de-
bent medicamēta adurentia. Si leuatur malum,
minuunturq; eius indicia, procedere curatio po-
test, & ad scalpellum, & ad vstionē. Si proti-
nus irritatum est, scire licet iam carcinoma esse,
remouēdaq; sunt omnia acria, omnia vehemen-
tia.

tia. Sed si sine ulcere is locus durus est, imponi-
ficum quam pinguis simam, aut rhympodes empla-
strum satis est. Si ulcus aequale est, ceratum ex
rosa inijciendum est, adijciendusq; ei pulvis ex
cōtrita testa, ex qua faber ferrarius tingere can-
dens ferrum solitus est. Sed si id nimium super-
creuit, tentanda squama aeris est, qua lenissima
ex adurentibus est, eatenus ne quid eminere pa-
tiatur, sed ita, si nihil exacerbat. Si minus, eo-
dem cerato contenti esse debebamus.

De Theriomate, & eius curatione.

Est etiā ulcus, quod θύγιμα Græci vocāt.
Id ē per se nascitur, et interdū ulceri ex
alia caussa facto supervenit. Color est vel livi-
dus, vel niger, odor fœdus, multus, & mucco si-
milis humor. Id ipsum ulcus neq; tactū, neq; me-
dicamentū sentit, prurigne tantū movetur. At
circa dolor est, & inflammatio. Interdum etiam
febris oritur. Nonnunquam ex ulcere sanguis
erumpit. Ad id quoq; malum serpit. Quæ omnia
sæpe intenduntur. Fitq; ex his ulcus, quod ἔγγρα-
τα ἐσθίου μύρου Græci vocant, quia celeriter ser-
pendo, penetrandoq; vsq; ossa corpus vorat. Id
ulcus inæquale est, cæno simile, inestq; multus
humor glutinosus, odor intolerabilis, maiorq;
quàm pro modo ulceris inflāmatio. Vtrūq; sicut
omnis cācer, fit maxime in senibus, vel his, quo-
rum corpora mali habitus sunt. Curatio utriusq;
eadem est, sed in maiore malo magis necessaria.
Ac primum à vitio ratione ordināndus est, ut
quiescat

quiescat in lectulo, ut primis diebus à cibo absti-
neat, aquam quamplurimam assumat. Alius
quoque ei ducatur. Dem post inflammationē ci-
bum boni succi capiat, vitatis omnibus acribus,
portionis quantum volet, sic, ut interdum quidem
aqua contentus sit. In cœna etiā vini austeri ali-
quid bibat. Non aequè tamen fame in his quos
herpes urget, atque in his qui therioma adhuc
habebunt, utendum erit. Et victus quidē talis ne-
cessarius est. Super vlcus verò inspergenda est
arida aloë, ænanthe, & si parū proficiet, chalcit-
is. Ac si quis nervus exesa carne natus est, con-
tegendus antè linteolo est, ne sub eo medicamēto
aduratur. Si validioribus etiam remedijs opus
est, ad eas compositiones veniendū est, quæ ve-
hementius adurant. Quicquid autem inspergi-
tur, auerso specillo infundi debet. Superdanda
cum melle sunt vel linamenta, vel oleæ folia ex
vino decocta, vel marrubium, eaquē linteolo conte-
genda in aqua frigida madefacta, deinde bene ex-
presso. Circaquē quā tumor ex inflammatione est,
imponenda, quæ reprimant, cataplasmata. Si sub
his nihil proficitur, ferro locus aduri debet, dili-
genter nervus, si qui adparent, antè contectis.
Adustum vel medicamentū, vel ferro corpus,
primum purgandum, deinde implendum esse,
adparare cuilibet ex prioribus potest.

De sacro igne, & eiusuratione.

Sacer quoque ignis, malis vlceribus annume-
rari debet. Eius duæ species sunt: Alterum
v 3 est

est subrubicundū, aut mistum rubore atq; pallore, exasperatumq; per pustulas continuas, quarum nulla altera maior est, sed plurimæ perexiguae. In his semper ferè pus, & saepe rubor cum calore est, serpitq; id nonnunquam sanescente eo, quod primum vitiatum est, nonnunquam etiam exulcerato, ubi ruptis pustulis vlcus continuatur, humorq; exit, qui esse inter sanism, & pus videri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, præcipueq; in plantis. Alterū autem est in summæ cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, subliuidū, inæqualiter tamen, mediumq; sanescit, extremis procedentibus, ac saepe id, quod iam sanum videbitur, iterum exulceratur. At circa proxima cutis quæ vitium receptura est, tumidior & durior est, coloremq; habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo ferè corpora seniores tentantur, aut quæ mali habitus sunt, sed in cruribus maxime. Omnis autem sacer ignis, ut minimum periculum habet ex his quæ serpunt, sic propè difficilimè tollitur. Medicamentum eius

* fortissimum

*fortuitum est, vno die febris, quæ humorem noxium absumat. Cuius quo crassius & albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra os vlcerū ladi, quo plus puris exeat, & id quod ibi corruptum corpus est, extrahat: sed tamen si febricula accessit, abstinentia, lectulo, alui ductione opus est. In omni verò sacro igni neq; lenibus, & glutinosis cibis, neq; salsis & acribus

bus utendum est, sed his que inter utrunq; sunt, qualis est panis sine fermento, piscis, hœdus, aues, exceptoq; apro omnis ferè venatio. Si nō est febricula, & gestatio utilis est, & ambulatio, & vinum austerr, & balneum. Atq; in hoc quoq; genere potio magis liberalis esse, quàm cibus debet. Ipsa autē vlcera si mediocriter serpunt, aqua calida: si vehementius, vino calido fouenda sunt. Deinde acu pusule quæcunq; sunt aperiendæ. Tum imponenda ea, que putrem carnē exedant. Vbi inflammatio sublata, vlcusq; purgatiū est, imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere possunt proficere mala cotonea in vino cocta, atq; contrita. Potest emplastrum vel Hiera, vel tetrastapharmacū, cui quinta pars thuris adiecta sit. Potest nigra hederæ ex vino austero cocta. Ac si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato vlcere, quod in summa cute esse proposui, satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficient.

De chironio vlcere, & eius curatione.

Chironium autem vlcus appellatur, quod & magnum est, & habet oras duras, callosas, tumentes. Exit sanies non multa, sed tenuis. Odor malus neq; in vlcere, neq; in eius ^{*tu-} ^{*humore} more est. Nulla inflammatio, dolor modicus est, nihil serpit, ideoq; nullum periculum adfert, sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, vlcusq; renouatur. Fit maxime in pedibus & cruribus. Su-

v 4

per id

per id imponi debet, quod & lene aliquid, & vehemens, & reprimens habeat. Quale eius rei causa fit ex his, Squamae aris, plumbi eloti combusti, singulorum p. iiii. *. cadmia, cara, singulorum p. viii. *. rose quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

De ulceribus quæ ex frigore in pedibus, & manibus oriuntur, & eorum curationibus.

χιμεῖλον
hoc genus
ulceris dicitur à Græcis, à Latinis Pernio.

Flunt etiam ex frigore hyberno ulcera, maxime in pueris, & præcipuè pedibus, digitisq; eorum, nonnunquam etiã in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est. Interdum pustulae oriuntur, deinde exulceratio. Dolor autem modicus. Prurigo maior est, nonnunquam humor exit, sed non multus, qui referre vel pus, vel sanie videtur. In primis multa calida aqua fouendū est, in qua rapa decocta, aut si ea non sunt, aliqua verberæ ex reprimētibus. Si nondum ad apertum ulcus, æs quàm maxime calidū quis pati potest, admouendū est. Si iam exulceratio est, imponi debet alumen, æqua portione cum thure contritū, cū vino adiecto, aut malicoriū in aqua coctū, deinde contritū. Si summa detracta pellicula est, hic quoq; melius lenia medicamēta proficiunt.

De struma, & eius curatione.

Struma quoq; est tumor, in quo subter concreta quedam ex pure & sanguine, quasi glandule oriuntur. Quæ vel præcipuè fatigare medicos solent, quoniam & febres mouent, nec unquam facile maturescunt, & sine ferro, siue medica

medicamentis curantur. Plerumq; iterum iuxta cicatrices ipsas resurgunt, multoq; post medicamento est opus. Quibus id quoq; accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime in ceruice, sed etiam in alis & inguinibus, & in lateribus. In mammis quoq; fœminarum se reperisse, Chirurgicus Megetes auctor est. Propter hæc & album veratrum recte datur, atq; etiam sapius, donec ea digerantur. Et medicamenta imponuntur, quæ humorem vel educant, vel dissipent, quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoq; quidam utuntur, quæ exedunt, crustaq; eum locum astringunt: tunc verò ut vlcus conterant. Quæcunq; autem ratio curandi est, corpus puro vlcere exercendum, atq; alendum est, donec ad cicatricem perueniat. Quæ cū medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum: quem struma male habet, eum, si anguem edit, liberari.

De Furunculo, & eius curatione.

Furunculus verò est tuberculū acutum cum inflammatione, & dolore, maximeq; ubi ^{*inflatioe} iam in pus vertitur. Qui ubi ad apertus est, & exit, super adparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra, quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiam si nulla curatio adhibeatur. Maturescit enim per se, atq; erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quæ maturius liberet. Proprium eius medicamentum galbanum
v s est.

est. Sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cetera desunt, imponi debet primum non pingue emplastrum, ut id reprimat: deinde si non repres- sit, quodlibet puri mouendo accommodatum. Si ne id quidam est, vel resina, vel fermentum. Ex- presso pure, nulla ultra curatio necessaria est.

De Phymate, & eius curatione.

Phyma verò nominatur tuberculum furun- culo simile, sed rotundius & planius, saepe etiam maius. Nam furunculus oui dimidij ma- gnitudinem raro explet, nunquam excedit. Phy- ma etiam latius patere consuevit, sed inflamma- tio dolorque sub eo minores sunt. Vbi euulsum est pus, eodem modo adparet ventriculus, quod in furunculo non inuenitur. Verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris & se- pius nascitur, & facilius tollitur: in iuuenibus rarius oritur, et difficilius curatur. Vbi et is in- durauit, ne nascitur quidem. Quibus verò medi- camentis discuteretur, supra propositum est.

De Phygethlo, & eius curatione.

Phygethlon autem est tumor, non altus, sed latus, in quo quiddam pustulae simile est. Do- lor distentioque vehemens est, & maior quam pro magnitudine tumoris: interdum etiam febricu- la, idque tarde maturescit, neque magnopere in pus conuertitur. Fit maxime aut in vertice, aut in alis, aut in inguinibus. Panem, ad similitudinem figuræ, nostri vocant. Atque id ipsum quo medi- camento tolleretur, supra demonstravi. Sed cum

Panis. omnes

omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium ad suppurationem spectans. Idque ferè fit aut post febres, aut post dolores partis alicuius, maximeque eos, qui ventrem infestarunt. Sæpiusque oculis expositum est, siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem eius, quod phyma vocari proposui, rubetque cum calore, et paulò post etiam cum duritia, magisque innocenter indolescit, et sitim vigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest, maximeque ubi altius pus movetur. Sed cum siti vigiliaque sentiuntur intus aliquæ punctiones, et quod de subito durius non est, melius est: et quamvis non rubet, coloris tamen aliter mutatus est. Quæ signa iam pure oriente nascuntur. Tumor ruborque multo antè incipiunt. Sed si locus mollis est, auertendus is materia additus est per cataplasmata, quæ simul et reprimunt, et refrigerant, qualia et aliàs et paulò antè in Erysipelate proposui. Si iam durior est, ad ea veniendum est, quæ digerant, et resoluant: qualis est ficus arida, contusa: aut sex mista cum cerato: quod ex adipe suilla coactum sit, aut cucumeris radix, cui ex farina due partes adiectæ sint, antè ex mulso decoctæ. Licet etiam miscere æquis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum, pondusque adycere myrrhæ dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque et malagmata idem efficiunt, quæ supra explicui. Quod per hæc discussum

cussum non est, necesse est, maturescat. Idq; quo
 celerius fiat, imponenda est farina ordeacea, ex
 qua cocta rectè miscetur. Eadem autem hæc in
 minoribus quoq; abscessibus, quorum nomina
 proprietatesq; supra reddidi, rectè fiunt. Eadēq;
 omnium curatio, tantummodo distat. Crudum est
 autem, in quo magis quasi venarum motus est,
 & grauitas, & ardor, & distentio, & dolor,
 & rubor, & durties. Et si maior abscessus est,
 horror aut etiam febricula permanet, penitusq;
 condita suppuratio. Si pro his quæ alibi cutis o-
 stendit, punctiones sunt, vbi ista se remiserunt,
 * iamq; is * iamq; cutis prurit, & aut subliuidus, aut sub-
 locus pruritus
 albidus est, matura suppuratio est, eaq; vbi vel
 per ipsa medicamenta, vel etiam ferro aperta
 est, pus debet emitti. Tum si qua in aliis, vel in-
 guinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In
 ceteris quoq; partibus, si vna plaga exigua est,
 si mediocris suppuratio fuit, si non altè penetra-
 uit, si febris non est, si valet corpus, æquè lina-
 menta superuacua sunt. In reliquis, parce tamen,
 nec nisi plaga est, imponi debent. Commodè ve-
 rò vel super linamenta, vel sine his imponitur
 lenticula ex melle, aut malicorium ex vino co-
 ctum. Quæ & per se, & mista idonea sunt. Si
 qua circa duriora sunt, ad ea molliēda, vel mal-
 ua cōtrita, vel fœni græci, lini' ve semen ex pas-
 so coctum superdādum est. Quicquid deinde im-
 positum est, non astringi, sed modicè deligari
 debet. Illo neminem decipi decet, vt in hoc gene-
 re ce

re cerato vtatur. Cetera quæ pertinent ad purgandum vlcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conueniuntq; in vulneribus, exposita sunt.

De Fistulis, & earum generibus, & curationibus.

Nonnunquam autẽ ex eiusmodi abscessibus, & ex alijs vlcerum generibus *Fistula* oriuntur. Id nomen est vlceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis, habetq; quædam in singulis locis propria. prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt. Siquidem aliæ breues sunt, aliæ altius penetrant, aliæ rectè intus feruntur, aliæ multoq; plures transversæ, aliæ simplices sunt, aliæ duplices, triplices' ve ab vno ore intus orsæ, quæ tres fiunt, aut etiam in plures sinus diuiduntur, aliæ rectæ, aliæ flexæ, et tortuosæ sunt. Aliæ intra carnem desinunt. Aliæ ad ossa, aut cartilaginem penetrant, aut vbi neutrum horum subest, ad interiora perueniunt. Aliæ deinde facile, aliæ cum difficultate curantur. Atq; etiam quædam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici recenti intra carnem, adiuuatq; ipsum corpus, si iuuenile, si firmum est. Inimica, contraria his sunt. Itemq; si fistula os, vel cartilaginem, vel neruum, vel musculos læsit, si articulum occupauit, si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vuluam, vel ad grandes venas arterias' ve, vel ad inania, vt guttur, stomachum, thoracẽ penetrauit. Ad intestina quoq;
ea ten

ea tendere semper periculosum, sæpe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel ægrum, vel senile, vel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam conuenit, ut quò tendat, & quàm alte perueniat, scire possimus. Simul etiam protinus humida, an siccior sit: quod extracto specillo patet. Si rerò os in vicino est, id quod disci potest, si iam nec ne, eò fistula penetrant, quatenus nocuerit. Nam si molle est, quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est. Si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si elabitur specillum, nondum caries est: si non labitur, sed æquali inmititur, caries quidē, verum adhuc leuis est. Si inæquale quoq; & asperum subest, vehementius os exesum est. At cartilago ubi subla sit, ipsa sedes docet, perueniūq; esse ad eam ex renixu potest. Sed ex his quidem colliguntur fistularum sedes, spatia, noxæ. Simples verò hæc sunt, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris, cuius si plus fertur, quàm quod simplici spatio conuenit, plures sinus esse manifestum est. Cumq; fere iuxta sint caro, & nervus, & aliqua nervosa, quales ferè tunica, membranaq; sunt: genus quoq; puris docebit, num plures sinus intus diuersa corporis genera perferant. Siquidem ex carne pus leue, album copiosius fertur. At ex nervoso loco coloris quidem eiusdem, sed tenuius & minus. Ex nervo pingue, & oleo non dissimile. Deniq; etiam cor-
poris

poris inclinatio docet, num in plures partes fistula penetrarint, quia saepe cum quis aliter decubuit, aliterq; membrum collocavit, prius ferri, quod iam desierat, incipit, testaturq; non solum aliud sinum esse ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. Sed si & in carne, & recens, & simplex est, ac neq; rugosa, neq; caua sede, neq; in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore mouetur, satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam aris, vel æruginem, ex metallicis aliquid. Ex q; eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius. Idq; ea parte qua tenuius est, altera antecedente demitti oportet in fistulam, donec sanguis purus se ostendat. Quæ in omnibus fistularum collyrijs perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo super imponendum, supraq; inijcienda spongia, in acetum ante demissa, solui quinto die satis est. Genusq; victus adhibendum est, quo carnem ali docui. Ac si longius à præcordijs fistula est, ex intervallo ieiunium radicularis edisse, deinde vomere, necessarium est. Vetustate callosa sit fistula. Callus autem neminem fallit, quia durus est, & aut albus, aut pallidus. Sed tum validioribus medicamentis opus est. Quale est, quod habet papaveris lacrymæ p. i. *. gummi p. i i i. *. cadmiæ p. i i i i. *. atramenti sutorij p. v i i i. *. Ex quibus aqua coactis collyrium

Callus

* P. I. lyrium fit. Aut in quo sunt galle * P. X. eruginis, sandarace, aluminis Aegyptij, singulorum P. I. * atramenti sutorij combusti P. I I. *. Aut quod constat ex chalcitide, & saxo calcis, quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est, adijcitur, eaq; melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex praecepto Megetis, eruginis rasae P. I I. *. conterere, deinde ammoniaci, thymiamatis P. I I. *. aceto liquare, eoq; infuso ex erugine colligere. Idq; ex primis medicamentis est. Sed ut haec maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est cal- lum quibuscumlibet adurentibus medicamentis pro- dere, aut quibus haec maxime in effectu sunt erodere. Satiusq; est vel papyrus intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrij astric- tum eo illinere. Scilla quoq; cocta & mista cum cal- ce, callum exest. Si quando vero longior & trans- versa fistula est, demisso specillo contra princi- pium huius incidi, commodissimum est, & col- lyrium * utrinq; demitti. At si duplicem esse fi- stulam, aut multiplicem existimamus, sic tamen ut brevis, intraq; carnem sit, collyrio uti non de- bemus, quod unam partem curet, reliquas omit- tat: sed eadem medicamenta arida in calamus scriptorium coniicienda sunt, utq; ori fistulae ap- tandus, inspirandumq; ut ea medicamenta in- tus compellantur. Aut eadem ex vino liquan- da. Vel si sordidior fistula est, ex mulso: si callo- sior, ex aceto sunt, atq; intus infundendum, quic- quid

quid inditum est. Superponenda sunt quæ refrigerent & reprimant. Nam ferè quæ circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque alienum est ubi quis resolverit, antequàm rursus alia medicamenta coniiciat, per oricularium clysterem fistulam eluere. Si plus puris fertur, vino: si callus durior est, aceto: si iam purgatur, mulso, vel aqua, in qua eruum coctum sit, sic ut huic quoque mellis paulum adijciatur. Fere verò fit, ut ea tunica quæ inter* ferramentum et integram* foramen carnem est, victa medicamentis tota exeat, infraque; vlcus purum sit. Quod ubi contigit, imponenda glutinantia sunt, precipueque; sponsia melle cocto illita. Neque ignoro multis placuisse, linamentum in modum collyrij compositum, tinctum melle demitti. Sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori iunctum, non coeat, adiectis quoque medicamentis ad id efficacibus, cum sæpe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in vnum eos iungat.

De Meliceria.

Est etiam vlcus genus, quod & à saui similitudine μελιγκρία à Græcis nominatur, idque; duæ species habet. Alterum subalbidum furunculo simile, sed maius, & cum dolore maiore. Quod ubi maturescit, habet foramina per quæ fertur humor glutinosus, & purulentus, nec tamen ad iustam maturitatem peruenit. Si diuisum est, multo plus intus corrupti quam in

x

furunc

furunculo apparet, altiusq; descendit. Rarò fit, nisi in scapulis. Alterum est minus super corpus eminens, durum, latum, subviride, subpallidum, magis exulceratum. Siquidem ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quæ fertur humor glutinosus subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci referens, interdum olei. Si inciditur, viridis intrà caro apparet. Dolor autem, & inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem mouere consuerit. Super id quod minus crebris foraminibus exasperatum est, rectè imponi-
 quod in tur & ficus arida, & lini semen in mulso co-
 vino co- Etum, & emplastra ac malagmata materiam
 Etum educunt, aut quæ propriè huic pertinentia, supra posui. Super alterum, & ea medicamenta, & farina ex mulso cocta, sit ut ei dimidium resinæ terebinthinæ misceatur, & ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adiectum, & rue taminie pars quarta fico adiecta. Quòd si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum vlcus vsq; ad sanam carnem excidi oportet, & vlcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt, primum quæ pus citent, deinde quæ purgent, tum quæ impleant.

De Acrochordon, & Thymio, & Myrmecis,
 & Clauo, curationibusq; eorum.

Sunt quædam verò verrucis similia, quorum diuersa nomina, ut vitia sunt. Acrochordona Græci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius

rius, & interdum paulo asperius, coloris eiusdem, infra tenue, ad cutem latius, idq; modicum est, quia raro fabæ magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur, sed ferè plura, maximeq; in pueris, eaq; nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant. Sunt quæ etiam in pus conuertuntur. At Thymion nominatur, quod super corpus quasi verrucula eminet, ad cutem tenue, supra latius, subdurius, & in summo perasperum. Idq; summum colorem floris thymi representat, unde ei nomen est, ibiq; facile finditur, & cruentatur, nonnunquam aliquantulum sanguinis fundit, fereq; circa magnitudinem fabæ Aegyptiæ est, raro maius, interdum perexiguum, modò unum, modò autem plura nascuntur, vel in talis, vel palmis, vel inferioribus pedum partibus. Pessima tamen in obscænis sunt, maximeq; ibi sanguinem fundunt. Myrmecia autem vocantur, humiliora thymio, durioraq; quæ radices altius exigunt, maioremq; dolorem mouent, infra lata, super autem tenuia, minus sanguinis mittunt, magnitudine vix nunquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoq; aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clauus autem nonnunquam quidem etiam alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, precipuè tamen ex contuso, quamuis interdum aliter, doloremq; etiam, si non aliàs, tamè ingredienti mouet. Ex his Acrochordon, siue Thymium sepe

x 2 etiam

etiam per se finiuntur : & quo minora sunt, eò
 magis. Myrmecia & clauī sine curatione vix
 ἀνποχρη- vnquam desinunt. Acrochordon si excisa est,
 δώρ. nullam radiculam relinquit, ideoq; ne renascitur
 θυμίου. quidem. Thymio clauoq; excisis subter rotunda
 radícula nascitur, quæ penitus descendit ad car-
 *exit nem, eaq; relicta idem rursus*exigit. Myrme-
 μυρμη- cia latissimis radicibus inhaerent, ideoq; ne ex-
 νία. cidi quidem sine exulceratione magna possunt.
 Clauum subinde deradere commodissimum est.
 Nam sine vlla vi sic emollescit, ac si sanguinis
 quoque aliquid emissum est, sepe emoritur. Tol-
 litur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde im-
 ponit resinam, cui miscuit pulueris paulum, quem
 ex lapide molari contrito fecit. Cetera verò ge-
 nera medicamentis adurenda sunt. Alijsq; id
 quod ex fece vini : myrmecijs id, quod ex alu-
 mine, & sandaraca fit, aptissimum. Sed ea, quæ
 circa sunt, folijs contegi debent, ne ipsa quoque
 exulcerentur. Deinde postea lenticula imponi
 solet. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

De pustularum generibus, & earum
 curationibus.

AT pustulae maximè vernis temporibus o-
 riuntur. Earum plura genera sunt. nam
 modò circa totū corpus partemue aspreto quæ-
 dam fit, similis his pustulis, quæ ex urtica, vel
 ex sudore nascuntur, ἐξερθήματα Græci vocant,
 eaq; modò rubent, modò colorem cutis non exe-
 dunt.

dunt. Nonnunquam plures similes varis oriuntur, nonnunquam maiores pustula liuida, aut pallida, aut nigra, aut aliter naturali colore mutato, subestq; humor. Vbi hæ ruptæ sunt, infra quasi exulcerata caro adparet, * ἐλκῶδες Græcè * φλυκτα nominatur. Fiunt vel ex frigore, vel ex igni, vel vā ex medicamentis. Psyracion autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta, ex qua ipsa quod exprimitur humidum est. Ex pustulis uerò nonnunquam etiam vlcuscula sunt, aut aridiora, aut humidiora: & modò tantū cum prurigine, modò etiam cum inflammatione aut dolore. Exitq; aut pus, aut sanies, aut vtrunque. Maximeq; id euenit in ætate puerili, rarò in medio corpore, sæpe in eminentibus partibus. Pessima pustula est, quæ ἐπινυκτὶς vocatur. Ea colore vel subliuida, vel subnigra, vel alba esse consuevit. Circa hanc autem vehemens inflammatio est, & cum adaperata est, reperitur intus exulceratio mucosa. Color est humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem eius est, neq; enim ea faba maior est. Atque hæc quoque oritur in eminentibus partibus, & ferè noctu. Unde nomen quoque à Græcis ei Epinyctis impostum est. In omni verò pustularum curatione primum est, multum ambulare, atque exerceri. Si quid ista prohibet, gestari. Secundum est, cibum minuere, abstinere ab omnibus acribus, & extenuantibus, eademq; nutrices facere oportet, si lactens puer ita affectus est. Præter hæc is qui

x 3 iam

iam robustus est, si pustula minutæ sunt, desudare in balneo debet, simulq; super eas nitrum inspergere, oleoq; vinum miscere, & sic ungi. Tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si maius pustularum genus occupauit, imponenda lenticula est, detractaq; summa pellicula ad medicamenta lenia transeundum. Epinyctis post lenticulam rectè herba quoque sanguinali, vel viridi coriandro curatur. Ulcera ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine fæni græci mixta, sic, ut his inuicem rosa, atq; intubi succus adijciatur, donec mellis crassitudo fiat. Propriè ad eas pustulas, quæ infantes male habent, lapidis, quem pyriten uocant P. V I I I. X. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adijciunturq; olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustula debent, tum hoc illini.

De Scabie, & eius curatione.

^{* alias, hu} ^{mor cutis} ^{rubicun-} ^{du} **S**cabies uerò est, ^{* durior cutis rubicundior, ex} qua pustule oriuntur, quedam humidiores, quedam sicciore. Exit ex quibusdam sanies, fitq; ex his continuata exulceratio pruriens, serpitq; in quibusdam citò. Atque in alijs quidem ex toto desinit, in alijs uerò certo tempore anni reuertitur. Quo asperior est, quoque prurit magis, eò difficilius tollitur. Itaque eam, quæ talis est, ἀγρία (id est feram) Græci appellant. In hac quoque uictus ratio eadem quæ suprâ necessaria est. Medicamentum autem ad incipientem hanc idoneum est, quod fit ex spodij, croci, æruginis,

nis, singulorū p. i. ✱. piperis albi, omphacij, singulorum p. i. ✱. cadmiæ p. v i i i. ✱. Aut ubi iam exulceratio est, id quod fit ex sulphuris p. i. ✱. ceræ p. i i i i. ✱. picis liquidæ hemina, olei sextarijs duobus. Quæ simul incoquantur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam quod ad Protarchum autorem refertur. Habet hoc farinæ lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidæ heminam, resinæ humidæ selibram, aceti cyathos tres. Crocum quoq; lycium, erugo, myrrha, cinis, aquis portionibus recte miscentur, & ex passo coquantur. Idq; omnem pituitam ubiq; sustinet. At si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, uel sulphur pice liquidâ mistum, sicut in pecoribus proposui, hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur.

De Impetiginis speciebus, & curationibus.

Impetiginis uero species sunt quatuor. Minime mala est, quæ similitudine scabiem representat. Nam & rubet, & durior est, & exulcerata est, & roditur. Distat autem ea, quia magis exulcerata est, & uariis similes pustulas habet, uidenturq; esse in ea quasi bullulæ quedam, ex quibus interposito tempore squamule resoluntur, certioribusq; hoc temporibus reuertitur. Alterum genus peius est, simile papulæ ferè, sed asperius, rubicundiusq; figuræ uarias habens: squamula ex summa cute descendunt, rosio maior est, celerius & latius procedit, certioribusq;

*discedit

✱ 4 etiam

etiam nonnunquam prior temporibus & fit, & desinit, Rubrica cognominatur. Tertia etiamnum deterior est: nam & crassior est, & durior, & magis tumet, in summa cute finditur, & vehementius rodit. Ipsa quoque squamosa, sed nigra procedit, & latè, & tardè eminus serpit. In temporibus aut oritur, aut desinit, neque ex toto tollitur, Nigra cognomen est. Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore: Nam subalbidum est, & recenti cicatrici simile, squamulasq; habet pallidas, quasdam subalbias, quasdam lenticulae similes, quibus demptis, nonnunquam profluit sanguis. Alioqui verò humor eius albidus est, cutis dura, atq; fissæ est, proceditq; latius. Hæc verò omnia maximè genera oriuntur in pedibus, & manibus, atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quàm quod ad scabiem quoque pertinere sub autore Protarcho retuli. Serapion autem nitri $\text{P. I I.} \times$. sulphuris $\text{P. I I I I.} \times$. excipiebat resina copiosa, eoq; utebatur.

De Papulis, & eius curatione.

Papularum verò duo genera sunt. Altera est in qua per minimas pustulas cutis exasperatur, & rubet, leuiterq; roditur: medium habet pauxillo leuius, tarde serpit: idq; vitium maximè rotundum incipit, eademq; ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam $\alpha\gamma\pi\acute{\alpha}\nu$, id est, feram Græci appellant. In qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturq;

turq; ac vehementius & roditur, & rubet, interdum etiam pilos remittit. Quæ minus rotunda est, difficilius sanescit: nisi sublata est, in impetiginem vertitur: sed levis papula, etiam si ieiuna salina quotidie defricatur, sanescit. Maior commodissimè murali herba tollitur, si sub ea detrita est. Ut verò ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi tanto valentius in his est, quanto minus in his vitij est: alterum ad idem Myronis, nitri rubri, thuris, singulorum P. I. *. cantharidum purgatarum P. I. I. *. sulphuris ignem non experti tantundem, resinæ terebinthine liquidæ P. X. X. *. farine * loliij semis, githi cyathos tres, picis crudæ * vnum.

De Vitiliginis speciebus, id est, de Alpho, & Melane, & Leuce, & earum curatione.

Vitiligo quoque, quamvis per se nullum periculum adfert, tamen fœda est, & ex malo corporis habitu fit. Eius tres species sunt. Ἀλφῶ vocatur, vbi color albus est, ferè subasper, & non continuus, vt quedam quasi guttæ dispersæ esse videantur. Interdum etiam latius, & cum quibusdam intermissionibus serpit. Μέλαις colore ab hoc differt, quia niger est, & umbræ similis. Cætera eadem sunt. Λευκὴ habet quiddam simile alphi, sed magis albida est, altius descendit, in eaq; albi pili sunt, & lanugini similes. Omnia hæc serpunt, sed in alijs celerius, in alijs tardius. Alphos & Melas in quibusdam varijs temporibus & oriuntur, &

* loliij
sext.

III.
* sext.

x 5 desin


desinunt. Leuce quem occupavit, non facile dimittit. Priora curationem non difficilimam recipiunt, ultimum vix unquam sanescit, ac si quid ei vitio demptum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Vtrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facili colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pun- gi. Si sanguis exit, quod ferè fit in duobus prio- ribus, remedio locus est: si humor albidus, sana- ri non potest: itaque ab hoc quidem abstin- dum est. Super id verò, quod curationem reci- pit, imponenda lenticula mista cum sulphure & thure, sic ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem, quod ad Hirenæum autorem refertur, Al- cyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida pari- bus portionibus contunduntur, adiecto aceto. His in sole vitiligo perungitur, deinde non ita multo post, ne nimis erodatur, cluitur. Propriè quidem Istyrone autore eos, quos Alphos vocari dixi,

* P. * 3. a- hoc medicamento perungunt, sulphuris * P. I I. *.
laminis scilicet nitri P. I I I I. *. myrrhæ aridæ contritæ aceta-
bilis P. * 3. bulum miscent, deinde in balneo super vitiligi-
nitri P. *. nem inspergunt farinam ex faba, tum hæc in-
I I I I. myr nem inspergunt farinam ex faba, tum hæc in-
ti radice co ducunt. Hi verò quos Melanas vocari dixi, cu-
trita acc- rantur, cum simul contrita sunt alcyonium,
tab. thus, hordeum, faba sine oleo, in balneo
ante sudorem insperguntur,
tum genus id vitili-
ginis defrica-
tur.

LIB

LIBER VI.

De vitiiis singularū corporis partium. CAP. I.
De capillis fluentibus.



DIXI de his vitiiis, quæ per totum corpus orientia, medicamentorū auxilia desiderant. Nunc ad ea veniā, quæ non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus à capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem sæpe radendo succurritur. Adijcit enim vim quandam ad continendum, ladanum cum oleo mustum. Nunc de his capillis loquor, qui post morbis fere fluunt. Nam quo minus caput quibusdam ætate nudetur, succurri nullo modo potest.

De Porrigine, & eius curatione. CAP. II.

Porrigo autem est, ubi inter pilos quedam quasi squamule surgunt, eæq; acute resoluntur, et interdum madent, multo sæpius sicca sunt. Idq; euenit modo sine vlcere, modo ex ulcerato loco: huic quoq; modo malo odore, modo nullo accidente, fereq; id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio. Ac neque sine aliquo corporis vitio nascitur, neq; ex toto inutile est. Nam bene integro capite, nō exit. Vbi aliquod in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi, quàm id quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti. Commodius est ergo subinde peccando repurgare, quàm id ex toto prohibere. Si ta-

men

men ea res nimium offendit, quod humore sequente fieri potest, magisque si id etiam mali odoris est, caput saepe radendum est, dein id super adiuuandum aliquibus ex leuiter reprimentibus, quale est nitrum cum aceto, vel ladanum cum myrteo vino, vel myrobalanum cum vino. Si parum per haec proficitur, vehementioribus uti licet, cum eo, ut sciamus, utique in recenti vitio id inutile esse.

De Sycofi, & eius curatione. CAP. III.

Est etiam vlcus, quod à fici similitudine oriens à Graecis nominatur. Caro excrescit, & id quidem generale est. Sub eo verò duae species sunt. Alterum vlcus durum, & rotundum est, alterum humidum, & inaequale. Ex duro exiguum quiddam, & glutinosum exit: ex humido plus: & mali odoris. Fit verò utriusque in his partibus, quae pilis conteguntur. Sed id quidem quod callosum, & rotundum est, maximè in barba. Id verò quod humidum, praecipue est in capillo. Super utrumque oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum, & aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum, terra quoque cretria ex aceto liquata rectè illinitur.

De Areis, & earum curationibus. CAP. IIII.

Arearum quoque duo genera sunt. Commune utriusque est, quod emortua summa pellicula pili primum extenuantur, deinde excidunt: ac si ictus is locus est, sanguis exit liquidus, & mali odoris,

odori, increfcitq; vtrunque in alijs celeriter, in alijs tarde. Peius eſt, quod denſam cutem, & ſubpinguē, & ex toto glabram fecit: ſed ea quæ ἀνοπεξία nominatur, ſub qualibet figura dilatatur, fit et in capillo, & in barba. Id verò quod à ſerpentis ſimilitudine ὀφίῃς adpellatur, incipit ab occipitio, duorum digitorum latitudinē non excedit, ad aures duobus capitibus ſerpit, quibuſdam etiam ad frontem, donec ſe duo capita in priorem partem committant. Illud vitium in qualibet ætate eſt, hoc fere infantibus. Illud vix vnquam ſine curatione, hoc per ſe ſæpe finitur. Quidam hæc genera arearū ſcalpello exaſperant. Quidam illinunt adurentia ex oleo, maximeq; chartam combuſtam. Quidam reſinā terebinthinam cum thapſia inducunt. Sed nihil melius eſt, quàm nouacula quotidie radere, quæ cum paulatim ſumma pellicula exciſa eſt, adaperiuntur pilorum radiculæ. Neq; ante oportet deſiſtere, quàm frequentem pilum naſci adparuerit. Id autem, quod ſubinde raditur, illini atramento ſcriptorio ſatis eſt.

De Varis, & Lenticulis, & Ephelide, & eorum curationibus.

C A P. V.

PEnè ineptiæ ſunt, curare Varos, & Lenticulas, & Ephelidas. Sed eripi tamē ſæminis cura cultus ſui non poteſt. Ex his autē quas ſuprà poſui, Vari, Lenticulæq; vulgo notæ ſunt, quamvis rarior ea ſpecies eſt, quàm ξένοι Græci vocant, cū ſit ea Lenticula rubicundior, & inæqua

inequalior. Ἐφελὶς verò à plerisque ignoratur, quæ nihil est, nisi asperitas quedam, & durities mali coloris. Cætera non nisi in facie, Lenticule etiam in alia parte nonnunquam nasci solent. De qua per se scribere alio loco, visum operæpretium non est. Sed Vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus quàm ipsa est, aluminis scissilis, & paulum mellis adiectum est. Lenticulam tollunt galbanum & nitrum, cum pares portiones habent, contritaq; ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum, & interpositis pluribus horis mane eluendum est, oleoq; leviter ungendum. Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis, & paulum mellis adiectum est. Ad omnia verò ista, atque etiam ad colorandas cicatrices potest ea compositio, quæ ad Tryphonem patrem autorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani, * crocomationes sunt myrobalani, * magmatis, cretæ cismatis molie subcerulæ, nucum amararum, farinæ hordei, atque erui, struthij albi, sertulæ campænæ seminis. Quæ omnia contrita, melle quàm amarissimo coquuntur, illitumq; à vespere vsq; mane eluitur.

De oculorum morbis, curationibusque eorum,
& primo de his morbis, qui lenibus medicamentis curantur. C A P. VI.

Sed hæc quidem mediocria sunt. Ingentibus verò, & varijs casibus oculi nostri patent. Qui cum magnam partem ad vitæ simul & usum,

usum, et dulcedinē conferant, summa cura tuendi sunt. Protinus autem orta lippitudine quædā notæ sunt, ex quibus quid euenturum sit, colligere possimus. Nam simul ac lacryma, & tumor, & crassa pituita cœperint, si ea pituita lacrymæ mixta est, & ea lacryma calida est, pituita verò alba, & mollis, tumor non durus, longæ valetudinis metus non est. At si lacryma multa, & calida, pituita paulum, tumor modicus, idq; in vno oculo est, longum id, sed sine periculo futurum est. Idq; lippitudinis genus minime cum dolore est, sed vix ante vigesimum diem tollitur, nonnunquā per duos menses durat, sed quandoq; finitur. Si pituita alba et mollis esse incipit, lacrymæq; miscentur, aut si simul hæ utrumque oculum inuaserunt, potest esse breuior, sed periculum vlcere est. Pituita autem sicca & arida dolorem quidem mouet, sed maturius desinit, nisi quid exulcerauit. Tumor magnus si sine dolore est & siccus, sine vlllo periculo est. Si siccus quidem, sed cum dolore est, ferè exulcerat, & nonnunquam ex eo casu fit, vt palpebra cum oculo glutinetur. Eiusdem exulcerationis timor in palpebris pupillis uel est, vbi super magnum dolorem lacrymæ salsa, calidaq; eunt, aut etiam si tumore infinito diu lacryma cum pituita profluit. Peius etiam est, vbi pituita calida, aut liuida est, lacryma calida aut multa profluit, caput calet, à temporibus ad oculos dolor peruenit, nocturna vigilia vrget. Siquidem sub
his

his oculus plerūq; rumpitur, rotumq; est, ut tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula iuuat. Si foras iam ruptus procedit, sine auxilio est. Si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. At si asperum crassum est, etiam post curationem vestigium aliquod relinquit. Curari verò oculos sanguinis detractione, medicamēto, balneo, vino, vetustissimus autor Hippocrates memoriæ prodidit. Sed eorum tempora, & causas parum explicuit, in quibus Medicinæ summa est. Neque minus in abstinentia, & alui ductione sepe auxilij est. Hos igitur interdum inflammatio occupat, ubi cum tumore in his dolor est, sequiturq; pituitæ cursus nonnunquam copiosior vel acrior, nonnunquam utraq; parte moderatior. In eiusmodi casu prima omnium sunt, quies & abstinentia. Ergo primo die loco obscuro cubare debet, sic ut a sermone quoque abstineat. Nullum cibum assumere, si fieri potest, ne aquam quidem: sin minus, certè quàm minimum eius. Quòd si graues dolores sunt, commodius secundo die, si tamen res vrget, etiam primo sanguis mittendus est, utique si in fronte venæ tument, si firmo corpori materia superest. Si verò minor impetus, minus acrem curationem requirit, aluum, sed non nisi secundo, tertio uel die duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat. Satisq; est uti quiete, & abstinentia. Neque tamen in lippientibus longum ieiunium necessarium est, ne pituita

tnita tenuior atque acrior fiat. Sed secundo die dari debet id, quod leuissimum videri potest ex his, quæ pituitam faciunt crassiores, qualia sunt oua sorbilia. Si minor vis vrget, pulticula quoque, aut panis ex lacte. Insequentibus diebus, quantum inflammationi detrahatur, tantum adijci cibus poterit. Sed generis eiusdem, utique ut nihil falsum, nihil acre, nihil ex his, quæ extenuant, sumatur, nihil potui præter aquam. Et victus quidem ratio talis maxime necessaria est. Protinus autem primo die croci p. i. ✱. & farina candidæ quàm tenuissimæ p. ii. ✱. excipere oportet oui albo, donec mellis crassitudinem habeat, idq; in linteolum illinere, & fronti agglutinare, ut compressus venis pituitæ impetum cohibeat. Si crocum non est, thus idem facit. Linteolo an lana excipiatur, nihil interest. Super inungi verò oculi debent, sic ut croci quantum tribus digitis comprehendi potest, sumatur: myrrhæ ad fabæ, papaueris lacrymæ ad lenticulæ magnitudinem, eaq; cum passo conterantur, & specillo super oculum inducantur. Aliud idem: Myrrhæ p. i. ✱. mandragoræ succi p. ii. ✱. papaueris lacrymæ p. ii. ✱. foliorum rosæ, cicutæ seminis, singulorum p. iiii. ✱. acaciæ p. iiii. ✱. gummi p. viii. ✱. Et hæc quidē interdiu. Noctu verò, quò commodior quies veniat, non alienum est superimponere candidi panis interiorē partē ex vino subactam. Nam & pituitam reprimit,

y

& si

& si quid lacrymæ processit, absorbet, & oculum glutinari non patitur. Si graue id, & durum propter magnum oculorum dolorem videtur, oui & album, & vitellus in vas defundendum est, adiiciendumq; eo mulsi paulum, idq; digito permiscendum. Vbi facta vnitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quæ id excipiat, superq; oculos imponi. Ea res & leuis est, & refrigerando pituitam coërcet, & non exarescit, & glutinari oculum non patitur. Farina quoque ordeacea cocta, & cum malo cotoneo cocto mista, commodè imponitur. Neque ab ratione abhorret etiam penicillo potissimum uti expresso: si leuior impetus est, ex aqua: si maior, ex posca. Priora fasciæ deliganda sunt, ne per somnum cadant, & hoc superimponi satis est, quia & reponi ab ipso commodè potest: & cum inaruit, iterum madesaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum aliquid dandum est, quæ ἀνώδινα Græci vocant. Satisq; est puero, quod erui, viro quod fabæ magnitudinem impleat. In ipsum verò oculum primo die, *modica si immodica inflammatio est*, nihil rectè conijcitur. Sæpe enim potius concitatur eo pituita, quàm minuitur. A secundo die graui quoque lippitudini per indita medicamenta rectè succurritur, vbi vel iam sanguis missus, vel alius ducta est, aut vbi neutrum necessarium esse, manifestum est.

De

De diuersis oculorum collyriis.

Multa autem malorumq; autorum collyria ad id apta sunt, nouisq; etiā nunc misturis temperari possunt, cum lenia medicamenta & modice reprimētia, facile & varie misceantur. Ergo nobilissima exequar.

Philonis collyrium.

Est igitur Philonis, quod habet cerussæ elotæ, spodij, gummi, singulorum P. I. *. papaueris lacrymæ combustæ P. I. *. Illud scire oportet, hic quoque omnia medicamenta, singula primum per se teri, deinde mista, iterū adiecta paulatim vel aqua vel alio humore: gummi cum Gummi. quasdam alias facultates habeat, hoc maxime præstare, ut ubi collyria facta inaruerunt, glutinata sint, neq; frientur.

Dionysii collyrium.

Dionysij verò collyrium est, papaueris lacrymæ combustæ, donec tenerescat, P. I. *. thuris combusti, gummi, singulorum P. I. I. *. spodij P. I. I. I. I. *.

Cleonis collyrium.

Cleonis nobile admodum, papaueris lacrymæ friolæ P. I. *. croci P. I. *. gummi P. I. *. quibus cum teruntur, adijcitur rosæ succus. Aliud eiusdē valentius: Squamæ aris quod *σπομυα* appellant, P. I. *. croci P. I. I. *. spodij P. I. I. I. *. plumbi & eloti, & combusti P. VI. *. gummi tantundem. Eius aliud quoque ad idem est, maxime ubi multa pituita profluit. Castorei P. *. 3. aloës P. L. *. croci * P. L. *. *. P. XI.

γ 2

myrr

myrrhæ p. i i. *. lycij p. i i i. *. cadmiæ cura-
 te p. v i i i. *. stibis tantundem, acaciæ succi
 p. x i i. *. quod cum gummi miscuit, liqui-
 dum in pixidicula seruatur. Theodotus verò
 huic cōpositioni adiecit papaueris lacrymæ com-
 *aliàs: nu bustæ p. *. æris combusti & eloti p. i i. *. *nu-
 cleos pal- cleorum palmarum combusti p. x *. gum-
 marū cō- mi p. x i i. *.

bustos nu Theodoti collyrium, Acharstam appellatum.
 mero x.

A Tipsius Theodoti, quod à quibusdā ἀχάρ-
 στυς nominatur, eiusmodi est. Casto-
 *p. ii. rei, nardi indici, singulorum p. i. *. lycij * p. *.
 papaueris lacrymæ tantundem, myrrhæ p. i i. *.
 croci, cerussæ elotæ, aloës, singulorum p. i i i. *.
 cadmiæ botryodis elotæ, æris combusti, singulo-
 *p. xviii rum p. v i i i. *. gummi * p. v i i i. *. acaciæ suc-
 ci p. x x. *. stibis tantundem, quibus aqua plu-
 uialis adijcitur.

Cythion vel Tephion collyrium.

P Ræter hæc ex frequentissimis collyrijs est
 id, quod quidam Cythion, quidam à cine-
 reo colore Tephion appellant, amyli, tragacan-
 thæ, acaciæ succi, gummi, singulorum p. i. *. pa-
 *p. viii. paueris lacrymæ p. i i. *. cerussæ elotæ * p. i i i i.
 spumæ clo *. spumæ elotæ p. v i i i. Que aque ex aqua plu-
 tæ p. xiiii uiali conteruntur.

Euclidis collyrium, Trygodes nominatum.

E Velpides autem qui etate nostra maximus
 fuit oculus medicus, utebatur eo, quod
 ipse cōposuerat, Trygodes nominabat : Castorei
 p. i i.

P. I I . * . lycij, nardi, papaueris lacryma, singulo-
 rum P. I . * . croci, myrrha, aloës, singulorum P.
 I I I I . * . æris combusti P. V I I I . * . cadmiæ, & P. V I I I I
 stibis, singulorum P. X I I . * . acaciæ succi P.
 X X V I . * . gummi tantundē. Quo grauior verò
 quæq; inflammatio est, eo magis leniri medica-
 mentum debet, adiecto vel albo oui, vel muliebri
 lacte. At si neque medicus, neq; medicamentum
 præsto est, sepius vtrumlibet horum in oculis pe-
 nicillo ad ipsum facto infusum, id malum lenit.
 Vbi verò aliquis releuatus est, iamq; cursus
 pituitæ constitit, reliquias fortasse leniores fu-
 turas discutiunt balneum & vinum. Igitur la-
 uari debet leuiter, antè ex oleo perfricatus, diu-
 tiusq; in cruribus & feminibus, multa q; ca-
 lida aqua fouere oculos, deinde per caput prius
 calida, tum egelida perfundi, à balneo caue-
 re, ne quo frigore afflatu'ue laedatur: posthæc
 cibo paulo pleniore, quàm ex eorum dierum
 consuetudine, vti: vitatis tamen omnibus pi-
 tuitam extenuantibus. Vinum bibere lene, sub-
 austerum, modice vetus, neque effuse neque
 timide, vt neque cruditas ex eo, & tamen
 somnus fiat, lenianturq; intus latentia acria.
 Sed si quis in balneo sensit maiorem oculorum
 perturbationem quàm attulerat, quod incide-
 re his solet, qui manente adhuc pituitæ cursu
 festinarunt, quàmprimum discedere debet, ni-
 hileo die vini assumere, cibi minus etiam quàm
 pridie. Deinde cum primū satis pituita substitit

iterum ad usum balnei redire. Solet tamen euenire nonnunquam siue tempestatum vitio, siue corporis, ut pluribus diebus neq; dolor, neq; inflammatio, & minimè pituitæ cursus finiatur. Quod ubi incidit, iamq; ipsa vetustate res matura est, ab his eisdem auxilium petendum est, id est balneo ac vino. Hæc enim ut in recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt, & accendere, sic in veteribus quæ nullis alijs auxilijs cesserunt, admodum efficacia esse consuerunt. Videlicet hic quoq; ut alibi, cum secunda vana fuerint, contrarijs adiuvantibus. Sed antè tonderi ad cutem convenit. Deinde in balneo aqua calida quàm plurima caput atq; oculos fouere, tum utrunq; penicillo detergere, & ungere caput imo unguento continereq; in lectulo se, donec omnis calor qui conceptus est, finiatur, desinatq; sudor, qui necessario in capite collectus est. Tum ad idem cibi viniq; genus veniendum est sic, uti potiones meracæ sint, obtegendumq; caput, et quiescendum. Sæpe enim post hæc grauis somnus, sæpe sudor, sæpe alui deiectio pituitæ cursum finit. Si leuatum malum est, quod aliquanto sæpius fit, per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas restituatur. Si diebus eisdem aluus nihil reddit, ducenda est, quo magis superiores partes leuentur. Nonnunquam autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat. $\pi\gamma\sigma\eta\sigma\omega\pi$ id, quoniam oculi prociunt, Græci appellant. His utiq;

vtiq; si vires patinuntur, sanguinem mitti: si id fieri non potest, aluum duci, longioremq; in diem indici necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est. Ideoq; Cleonis collyrio quidam quod ex duobus antè positum est, vtuntur. Sed optimum est Nilei. Neq; de vlllo magis inter omnes autores conuenit.

Nilei collyrium omnium optimum.

ID habet nardi Indici, papaueris lacrymæ, singulorum p. i. ✱. gummi p. i. ✱. croci p. ii. ✱. foliorum rosæ recetium p. iii. ✱. Que vel aqua pluuiatili, vel vino leni subaustero coguntur. Neq; alienum est malicoriũ, vel fertulam campanam ex vino coquere, deinde conterere, aut myrrham nigram cum rosæ folijs miscere, aut hyoscyami folia, cum oui cocti vitello, aut farinam cum acacie succo, vel passo, aut mulso. Quibus si folia quoq; papaueris adiunguntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo preparato, penicillo fovere oculos oportet, ex aqua calida expresso: in qua antè mel myrti vel rosæ folia decocta sint. Deinde ex illis aliquid imponi. Præter hæc ab occipitio incisa cute, cucurbitula admouenda est. Quod si per hæc restitutus oculus in sedem suam non est, eodemq; modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum. Deinde futurum, vt inarescat is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo qui propior temporis est, incidi oculus debet: vt effuso pure et inflammatio, ac dolor finiatur, & intus tunice res-
y 4 dant,

dant, quo minus fœda postea facies sit. Utendum deinde vel iisdem collyrijs est ex lacte, aut ovo, vel croco, cui album oui misceatur. Ac si induit & sic emortuus est, ne in pus verteretur, quatenus fœde prominebit, excidendum erit, sic ut hamo summa tunica apprehendatur: infra id deinde scalpellus incidat, tātundem medicamenta erunt conijcienda, donec omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis in eo quoq; oculo utendum est, qui primum procidit, deinde per plura loca fixus est.

De carbunculis oculorum, & eorum curatione.

Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in palpebris: & in his ipsis oculis modo ab interiore, modo ab exteriori. In hoc casu alius ducenda est, cibus minuendus, lac potui dandum, ut acria quæ laferunt, leniantur. Quod ad cataplasmata & medicamenta pertinet, his utendum, quæ aduersus inflammationes proposita sunt. Atq; hic quoq; Nilei collyrium optimum est: si tamen carbunculus in exteriori palpebræ parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen, ex mulso coctum: aut si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

De pustulis oculorum & curatione earum.

Pustulæ quoq; ex inflammationibus interdum oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam seruanda sunt, quæ de sanguine

sanguine, et quiete supra posui. Sin serius quam
ut sanguis mitti possit, alius tamē ducenda est.
Si id quoq; aliqua res inhibet, utiq; victus ratio
seruanda est. Medicamentis autem hic quoq; le-
nibus opus est, quale Nilei, quale Cleonis est.

*Philetis collyrium, ad pustulas oculorum.

*φιλαι-

ID quoq; quod *Philetis vocatur, huic aptum
est, Myrrhae, papaueris lacrymae, singulorum
P. I. *. plumbi eloti, terrae samiae, quae ἀσκή vo-
catur, tragacanthae, singulorum P. IIII. *. sti-
bis cocti, amyli singulorum P. XVI. *. spodij elo-
ti, cerussae elotae, singulorum P. VIII. *. Quae a-
qua pluuiali excipiuntur. Usus collyrij, relex
ouo, relex lacte est.

*Philale-

thos

De vlceribus oculorum, & eorum curatio-
ne, & de διαβαλαν collyrio.

EX pustulis vlcera interdum fiunt, eaq; re-
centia aequale lenibus medicamentis nutrien-
da sunt, & iisdem fere quae supra in pustulis
posui. Fit quoq; proprie ad haec quod *diabalanu
vocatur. Habet aeris combusti & eloti papau-
ris lacrymae frictae, singulorum P. I. *. spodij elo-
ti, thuris, stibis combusti & eloti, myrrhae, gum-
mi, singulorum P. II. *.

*διαβα-

λανον

Curatio oculorum aliquo casu imminutorum.

Venit etiam, ut oculi vel ambo, vel singuli,
minores fiat, quam esse naturaliter debeant.
Idq; & acer pituitae cursus in lippitudine effi-
cit, & continuati fletus, & ictus parum bene
curati. In his quoq; iisdem lenibus medicamentis

ex muliebri lacte utendum est. Cibus verò his qui maxime corpus alere, & implere consue-
runt. Vitandaq; omni modo caussa, quæ lacry-
mas excitet, curaq; domesticorum, quorum etiam
si quid tale incidit, eius notitiæ subtrahendum:
atq; acria quoq; medicamenta, et acres cibi non
alio magis nomine his nocent, quàm quòd lacry-
mas mouent.

De pediculis palpebrarum.

Genus quoq; vitij est, qui inter pilos pal-
pebrarum pediculi nascuntur. Id φθειρίασι
Græci nominant. Quod cum ex malo corporis
habitu fiat, raro nō vltra procedit. Sed fere tem-
pore interposito, pituitæ cursus acerrimus sequi-
tur, exulceratisq; vehementer oculis, aciem quoq;
ipsam corrumpit. His aluus ducenda, caput ad
cutem tondendum, diuq; quotidie ieiunio perfr-
candum. His, ambulationibus, alijsq; exercita-
tionibus diligenter utendum, gargarizandumq;
ex mulso, in quo nepeta & pinguis ficus deco-
cta sit: sæpe in balneo multa calida aqua fouen-
dum caput. Vitandi acres cibi, lacte vinoq; pin-
gui utendum, bibendumq; liberalius quàm eden-
dum est. Medicamenta verò intus quidem le-

* aliàs, nia danda sunt, *ne acriorem pituitam conci-
ne acrio- tent. Super ipsos verò pediculos alia, quæ neca-
res pitui- re cos et prohibere ne similes nascantur, possint.
te conci- Ad id ipsum spumæ nitri p. i. *. sandaracæ p. i.
tentur. *. vix taminiæ p. *. i. simul teruntur, adijci-
turq; vetus cleum pari portione, atq; acetum, do-
nec

nec ei mellis crassitudo sit.

De oculorum grauioribus morbis, qui ex inflammationibus oriuntur, & validioribus medicamentis curantur, & de Andreae collyrio, & de *diacerato.

H Aclenus oculorum morbi lenibus medicamentis *nutriuntur. Genera deinde alia ^{*dià né-} ^{ga/θ.} sunt, quae diuersam curationē desiderant, fereq; ^{*curatur} ex inflammationibus nata sunt, sed finitis quoq; his manentia. Atq; in primis in quibusdam perseuerat tenuis pituitae cursus, quibus alius ab inferiore parte euocanda est, demendum aliquid ex cibo. Neq; alienum est illini frontem compositione Andreae. Quae habet gummi p. i. *cerusse, stibi, singulorum p. i i. *. spumae argenti & coctae, & elotae p. i i i. *. Sed & ea spuma ex aqua pluuiali coquitur, & arida haec medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoq; super injiciendum ex farina, quae frigida aqua coacta sit, cuiq; aut acaciae succus, aut cupressus adiecta sit. Cucurbitula quoq; , inciso vertice, recte accommodatur, aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi verò eo debet quod habet squamæ aeris, papaueris lacrymae, singulorum p. *. ceruini cornu combusti & eloti, plumbi eloti, gummi, singulorum p. i i i i. *. thuris p. xii. *. Hoc collyrium quia cornum habet, ^{*dià né-γτθ} nominatur. Quotiescunque non adyicio quod genus humoris adijciendum sit, aquam intelligi volo.

Memigmenon, Euelpidis collyrium.

Ad

AD idem Euelpidis, quod *μεμυγμένον* nominabat. In eo papaveris lacryma, & albi piperis, singulae unciae sunt, gummi libra, aeris combusti *℞. i. ℥.* Inter has autem curationes, post intermissionem aliquā profunt balneum & vinum. Cumq; omnibus lippientibus vitandi cibi sunt, qui extenuant, tum praecipue quibus tenuis humor diu fertur. Quod si iam fastidium est eorum, quae pituitam crassiorem reddunt, sicut in hoc genere materiae maxime promptum est, confugiendum est ad ea, quae quia ventrem, corpus quoq; astringunt.

De oculorum viceribus supercrescentibus, sordidis, cauis, veteribus, & curationibus singulorum.

AT vlcera si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut caua, aut certe vetera esse consuerunt. Ex his supercrescentia collyrio, quod Memigmenon vocatur, optime reprimuntur. Sordida purgantur & eodem, & eo quod Smilion nominatur.

Smilion collyrium.

Habet aeruginis *℞. i. i. ℥.* gummi tantundem, ammoniaci, minij sinopici, singulorum *℞. x. v. ℥.* Quae quidam ex aqua, quidam, quo vehementiora sint, ex aceto terunt.

Phynon collyrium Euelpidis.

* Alias, **I**D quoq; Euelpidis, quod *Phynona adpellatur, huic vtile est: Croci *℞. i. ℥.* papaveris lacryma, gummi, singulorum *℞. i. i. ℥.* aeris combusti et eloti, myrrhae, singulorum *℞. i. i. i. ℥.* piperis albi *℞. vi. ℥.*

nardi, casie, castorei singulorum p. i i. *. galle
p. v. *. myrrhe, croci, thuris, lycij, cerussæ, singu-
lorum p. v i i i. *. papaueris lacrymæ p. xii. *.
aloës, aris combusti, cadmiæ, singulorum p. xvi.
*. acaciæ, stibis, gummi, singulorum p. xxv. *.

De cicatricibus oculorum, quæ ex ulceribus fa-
ctæ sunt, & quomodo curari debeant,
& de Asclepia, & Canopite &
Pyxino, collyrijs.

FActæ verò ex ulceribus cicatrices, duo-
bus vitijs periclitantur, ne aut caue, aut
crassæ sint. Si caue sunt, potest eas implere, id
quod sphaerion vocari dixi, vel id quod Ascle-
pius nominatur. Habet papaueris lacrymæ p. ii.
*. sagapeni, opopanacis, singulorum p. iii. *. a-
ruginis p. i i i i. *. cumini p. v i i i. *. piperis
p. x i i. *. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum p.
xvi. *. At si crassæ cicatrices sunt, extenuat
vel Smilion, vel Canopite collyrium quod habet
cinamomi, acaciæ, singulorum p. i. *. cadmiæ e-
lotæ, croci, myrrhe, papaueris lacrymæ, gummi,
singulorum p. i i. *. piperis albi, thuris, singulo-
rum p. iii. *. aris combusti p. i x. *. cum aqua
pluiatili. Vel Euelpidis Pyxinum, quod ex his
constat: Salis fossilis p. iiii. *. ammoniaci, thy-
mi amatis p. viii. *. papaueris lacrymæ p. xii.
* aliâs, *. cerussæ p. xv. *. piperis albi, croci siculi, * sin-
singulorū galorum p. lii. *. gummi p. xiii. *. cadmiæ
xxx i. elotæ p. ix. *. Maxime tollere cicatricem vide-
tur, id quod habet gummi p. i i i. *. aruginis
p. i. *. crocomagnatis p. iiii. *.

De

De alio genere inflammationis oculorum.

Est etiam genus inflammationis, in qua se
cui tument ac distenduntur cum dolore o-
culi, sanguinem ex fronte emitti necessarium,
multaq; aqua calida caput atq; oculos fouere,
gargarizari ex lenticula, vel ex fici cremore,
inungi acribus medicamentis, quæ supra cõpre-
hensa sunt, maximeq; eo quod Sphæron nomi-
natur, quod lapidem hæmatiten habet. Atq; a-
lia quoq; vtilia sunt, quæ ad extenuandã aspri-
tudinem fiunt, de qua protinus dicam. Hanc au-
tem inflammatio oculorum fere sequitur, inter-
dum maior, interdum lenior, nõnunquam etiam
ex aspritudine lippitudo fit, deinde aspritudinẽ
ipsam auget, fitq; ea in alijs brevis, in alijs lon-
ga, & quæ vix vnquam finiatur. In hoc genere
valetudinis quidam crassis durasq; palpebras,
& ficulneo folio & asperato specillo, & inter-
dum scalpello eradunt, versisq; quotidie medi-
camentis suffricant. Quæ neq; nisi in magna ve-
tustaq; aspritudine, neq; sæpe faciẽda sunt. Nam
melius eõdem ratione victus & idoneis medi-
camentis peruenitur. Ergo exercitationibus ute-
mur, & balneo frequentiore, multaq; oculorum
palpebras aqua calida fouebimus. Cibos autem
sumemus acres, & extenuantes.

Cæsarianum collyrium.

AT medicamentum id quod Cæsarianum
vocatur, habet atramenti sutorij p.l. ✕.
misys

missos p. *. piperis albi p. v. *. papaveris lacry-
 mæ, gummi, singulorum p. ii. *. cadmiæ lot. p.
 iii. *. stibis p. vi. *. Satisq; constat, hoc colly-
 rium aduersus omne genus oculorum valetudi-
 * Aliàs, nis idoneum esse, exceptis his quæ lenibus * nu-
 curantur triuntur.

Hieracis collyrium.

ID quoq; quod Hieracis nominatur, ad aspri-
 tudinem potest: Habet myrrhæ p. i. *. am-
 moniaci, thymiamatis p. ii. *. æruginis rase p.
 iii. *. cum aqua pluuiatili. Ad idem idoneum
 est etiam id quod Canopite est, & id quod Smi-
 lion vocatur, & id quod pyxinum, & id quod
 Sphæron. Si composita medicamēta non adsunt,
 felle caprino, vel quàm optimo melle satis com-
 mode aspritudo curatur.

De Xerophthalmia, genere aridæ lippitudinis.

Est etiam genus aridæ lippitudinis, ἕγχοψ-
 δαλµία Græci appellant; neq; tument,
 neq; fluunt oculi, sed rubent tantum, & cū dolo-
 re quodam grauescunt, et noctu prægravi pitui-
 * inhere- ta* inalescunt: quantoq; minor generis huius im-
 scunt petus, tanto finis minus expeditus est. In hoc
 vitio multum ambulare, multum exerceri, lauari
 sepe, ibiq; desudare, multaq; frictione vti neces-
 sarium est. Cibi neq; qui implent, neq; nimium
 acres apti sunt, sed inter hos medij. Mane vbi
 concoxisse manifestum est, non alienum est ex
 * Aliàs, sinapi gargari, tum deinde caput. atque os
 defricare diutius* perfricare.

Rhinion

Rhinion collyrium.

Collyrium verò aptissimum est, quod Rhinion vocatur. Habet myrrhæ P. I. ✱. papaueris lacrymæ, acaciæ succi, piperis, gummi, singulorum P. I. ✱. lapidis hematitis, lapidis phrygy, lycij, lapidis scissilis, singulorum P. I. ✱. eris combusti P. I I I I. ✱. Ac pyximum quoque eodem accommodatum est.

Ad oculos scabros, collyria.

SI uerò scabri oculi sunt, quod maxime in angulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion, id quod supra positum est: potest similiter prodesse id quod habet æruginis rasæ, piperis longi, papaueris lacrymæ, singulorum P. ✱. I I. piperis albi, gummi, singulorum P. ✱. I I I I. cadmiæ elotæ, cerussæ, singulorum P. V I. ✱. Nullum tamen melius est quam Euelpidis, quod Basilicon nominabat. Habet papaueris lacrymæ, cerussæ, lapidis Asij, singulorum P. I I. ✱. gummi P. X I I I. ✱. piperis albi P. I I I I. ✱. croci P. V I. ✱. psorici P. X I I I. ✱. Nulla autem per se materia est, quæ Psoricum nominetur, sed chalcitidis aliquid, & *descriptio,* cadmiæ dimidio plus ex aceto simul conteruntur, *quæ eadem* idq; in vas fictile additum, & contactum ficul- *fere & à* neis folijs sub terra reponitur, sublaturumq; post *Dioscori-* dies viginti rursus teritur, & sic appellatur. *de tradi-* Verum in basilico quoque collyrio conuenit, ad o- *tur.* mnes affectus oculorum id esse idoneum, qui non **lenibus* medicamentis curantur. Vbi non sunt **lenibus* autem medicamenta composita, scabros angulos *lenant*

leuant & mel & vinum. Succurritq; & his,
& aride lippitudini, si quis panem ex uino sub-
actum super oculum imponit. Nam cum fere sit
humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo
angulos, aut palpebras exasperat, sic, & si quid
prodit humoris, extrahitur, & si quid iuxta
est, repellitur.

Ad Caligationem oculorum, quæ propter lippi-
tudinem oritur, remedia & collyria.

CAligare verò oculi nonnunquam ex lip-
pitudine, nonnunquam etiam sine hac pro-
pter senectutem, imbecillitatem, ue aliam consue-
runt. Si ex reliquijs lippitudinis id vitium est,
adiuuat collyrium, quod Asclepias nominatur.
Adiuuat id quod ex crocomagmate fit.

diæ upōn collyrium.

Propriè etiam ad id componitur, quod *diæ*
upōn vocant: habet piperis p. i. *. croci
cibicis, papaueris lacrymæ, cerussæ, singulorum p.
i i. *. psorici, gummi, singulorum p. i i i i. *.

Ad caligationem oculorum, quæ propter sene-
ctutem, aut aliam imbecillitatem fit.

AT si ex senectute, alia, ue imbecillitate id
est, recte inungi potest, & melle quàm
optimo, & cyprino, & oleo vetere. Commodis-
simum tamen est, balsami partem rnam, & olei
veteris, aut cyprini partes duas, mellis quàm a-
cerrimi partes tres miscere. Vtilia quoque huic
medicamenta sunt, quæ ad caliginem proxime,
quæq; ad extenuandas cicatrices supra compre-
hensa sunt. Cuicunq; verò oculi caligabunt, huic
opus

opus erit multa ambulatione atque exercitatione, frequenti balneo, ubi totum quidem corpus perfricandum est, præcipue tamē caput, & quidem irino, donec insudet, velandumq; postea, nec detegendum antequam sudor & calor domi conquierint. Tum cibis utendum acribus, & extenuantibus, interpositisq; aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum.

De suffusione oculorum.

Suffusio quoque (quam Græci *ὑπόχυσιν* nominant) interdum oculi* potentia, qua cer-
nit, se opponit. Quod si inueterauerit, manu curandum est. Inter initia nonnunquam etiam certis observationibus discutitur. Sanguinē ex fronte vel naribus mittere, in tēporibus venis adurere, gargarizando pituitam euocare, suffumigare oculos acribus medicamentis, inungere expedit. Viētus optimus est, qui pituitam extenuat.

De resolutione oculorum, quæ Paralysis dicitur.

Ac ne resolutio quidem oculorum, quam *παράλυσιν* Græci nominant, alio viētus modo, vel alijs medicamentis curanda est. Exposuisse tantum genus vitij satis est. Igitur interdum euenit, modo in altero oculo, modo in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione nervorum, qua vehementer oculus ipse concussus est, ut his neque ququam intendi possit, nec omnino consistat: sed huc illuc'ue sine ratione moueatur, ideoq; ne conspectum quidem rerum præstet.

De Mydriasi oculorum.

Non multum ab hoc malo distat id, quod *μυδρίασις* Græci vocant. Pupilla effunditur & dilatatur, aciesq; eius hebescit: ac penè difficilime genus id imbecillitatis eliditur. In utraq; verò, id est, & paralyti & mydriasi, pugnandum est per eadem omnia, quæ in caligine oculorum præcepta sunt, paucis tantum mutatis: siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adijciendum est, melle inungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis vsi releuatiq;. Quidam sine vlla manifesta caussa subito obcecati sunt. Ex quibus nonnulli cum aliquandiu nihil vidissent, repentina profusione alui lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, ex recenti re & interposito tempore medicamentis quoq; moliri deiectiones, quæ omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

De imbecillitate oculorum.

Preter hæc imbecillitas oculorū est, ex qua quidem interdum satis, noctu nihil cernunt, quod in fœminam bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet. **aliàs, hu* tet **sanguine iocinoris, maxime hircini: si minore io-* nus, caprini: vbi id assum coquitur, excepto: *cin-* atq; edi quoque ipsum iecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quæ vel cicatrices, vel aspritudinem extenuant: quidam contritò semine portulacæ mel adijciunt, eatenus ne id ex specillo distillet, eoq; inungunt.

Exerc

Exercitationibus, balneo, frictionibus, gargarizationibus iisdem, his quoq; utendum est.

Ad oculos, qui extrinsecus offenduntur, cum sanguine suffusi sunt.

E *Thæc quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus verò interdum si ictus oculum lædit, ut sanguis in eo suffundatur, nihil commodius est, quàm sanguine vel columbæ, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit, cum horum acies extrinsecus læsa interposito tempore in antiquum statum redeat, celeberrimeq; hirundinis. Vnde etiam locus fabulæ factus est, aut per parentes, aut id herba chelidonia restitui, quod per se sanescit. Eorū ergo sanguis nostros quoq; oculos ab externo casu commodissime tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime efficax columbæ & illi ipsi, & nobis. Supra percussum verò oculum ad inflammationem leniendam, non est alienum imponere etiam cataplasmata. Sed *arm-
moniacus, vel quilibet alius quàm optimus teri
debet, sic ut ei paulatim oleum adiciatur, donec
crassitudo strigmenti fiat. Id deinde miscendum
est cum hordacea farina, quæ ex mulso decocta
sit. Facile autem recognitis omnibus, quæ medici
quoq; prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix
vllum ex his, quæ supra comprehensa sunt, oculi
vitiū esse, quod non simplicibus quoq; & prom-
ptis remedijs submoveri possit.*

*Armenia
cus legen-
dū, ut sub-
audiatur
lapis.

De aurium morbis, & curationibus. CA. VII.

℞ 3 Haet

H Aclenus in oculis ea reperiuntur, in quibus medicamenta plurimum possint. Ideoque ad aures transeundum est, quarum usum proximum a luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto maius periculum est: nam vitia oculorum intra ipsos nocent. Aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementiam mortemque precipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne maiori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere et continere se debet. Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere et operire. At magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliquae causae prohibent, aliud soluenda est. Cataplasmata quoque calida subinde mutata proficiunt, siue fœni Græci, siue lini, siue alia farina ex mulso decocta est. Recte etiam subinde admouentur spongiae, ex aqua calida expressæ. Tum lenato dolore, certum circumdari debet ex irino aut cyprino factum. In quibusdam tamen melius, quod ex rosa factum est, proficit. Si vehemens inflammatio fomini ex toto prohibet, adijci cataplasmata debent, papaveris, corticis fricti atque contriti, sicut ex his pars dimidia sit, eaque tum simul ex passio misto decoquatur. In aurem verò infundere aliquod medicamentum oportet, quod semper ante tepesceri convenit, commodissimeque per strigilem instillatur. Vbi auris repleta est, super lana mollis

lis addenda est, quæ humorem intus contineat. Et hæc quidem communia sunt. Medicamentum verò est & rosæ, & radicum arundinum succus, & olerum in quo lumbrici cocti sunt, et humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali persici expressus. Composita verò ad inflammationem doloremq; leniendum hæc fere sunt: Castorei, papaveris lacrymæ pares portiones continentur, deinde adijcitur his passum. Vel papaveris lacrymæ, croci, myrrhæ par modus, sic teritur, ut inuicem modo rosæ, modo passum instilletur. Vel id quod amarum in ægyptia saba est, conteritur, rosæ adiecta. Quibus myrrhæ quoq; paulum à quibusdam miscetur, vel papaveris lacrymæ, aut thus cum muliebri lacte, vel amararum nucum cum rosæ succo. Vel castorei, myrrhæ, papaveris lacrymæ pares portiones cum passo. Vel croci p. i. * myrrhæ, aluminis scissili, singulorum p. *. 3. quibus cum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mellis minus cyathio. Idq; ex primis medicamentis est. Vel papaveris lacryma ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis, quæ habet castorei, opopanax, papaveris lacrymæ ex aceto, singulorum p. i i. *. spumæ lycij p. i i i i. *. Quæ contrita passo excipiuntur, donec cerati crassitudinem habeant, atq; ita reponantur. Vbi usus requiritur, rursus idem medicamentum adiecto passo, specillo teritur. Illud perpetuum est, quotiescunq; crassius medicamentum est, quam ut in aurem instillari possit,

℞ + sit,

sit, adiiciendum eum esse humorem, ex quo id
 componi debet, donec satis liquidum sit. Si verò
 pus quoque aures habent, recte lycium per se in-
 funditur, aut irinum vnguentum, aut porri suc-
 cus cum melle, aut centaurea succus cum passo,
 aut dulcis punici mali succus in ipsius cortice te-
 pefactus, adiecta myrrhae exigua parte. Recte
 etiam misceantur myrrhae (quam $\epsilon\alpha\kappa\tau\lambda\omega$ co-
 gnominat) p.i. *. croci tantundem, nuces ama-
 re x v. mellis sesquicyathus. Quae contrita, cum
 utendum est, in cortice punici mali tepescant. Ea
 quoque medicamenta quae oris exulcerati causa
 componuntur, et quae ulcera aurium sanant. Quae
 si vetustiora sunt, et multa sanies fluit, apta
 compositio est, quae ad autorem Erasistratum re-
 fertur, piperis p.i. *. croci p.i. 3. *. myrrhae, mi-
 syos cocti, singulorum p.i. i. *. aris combusti p.
 i. i. *. Hac ex vino teruntur. Deinde ubi in-
 aruerunt, adiiciuntur passi heminae tres, et si-
 mul coquantur. Cum utendum est, adijcitur his
 mel et vinum. Est etiam Ptolemæi chirurgi me-
 dicamentum, quod habet lentisci p.i. *. gallæ p.
 i. *. omphacis p.i. *. succum punici mali. Est
 Menophili validum admodum, quod ex his con-
 stat, piperis longi p.i. *. castorei p.i. i. *. myr-
 rhæ, croci, papaveris lacrymæ, nardi syriaci, thu-
 ris, malicorij, ex Aegyptia faba partis interio-
 ris, nucum amararum, mellis quàm optimi, sin-
 gulorum p.i. i. i. *. Quibus, cum teruntur, ad-
 jicitur acetum quàm acerrimum, donec crassitu-
 do

do in his passi fiat. Est Cratonis, cinamomi, casiae, singulorum p. i. *. lycij, nardi, myrrhae, singulorum p. i. *. aloës p. i. i. *. mellis cyathi tres, vini sextarius. Ex quibus vinum cum lycio decoquitur, deinde his alia miscentur. At si multum puris, malusq; odor est, æruginis rase, thuris, singulorum p. i. i. *. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquuntur. Vbi vtendum est, dulce vinum miscetur. Aut aluminis scissilis, papaueris lacrymæ, acaciæ succi par pondus miscetur, hisq; adijcitur hyoscyami succi dimidio minor quam unius ex superioribus portio, eaq; trita, ex vino diluuntur. Per se quoq; hyoscyami succus satis proficit. Commune verò auxilium aduersus omnes aurium casus, iamq; vsu comprobatū Asclepiades composuit. In eo sunt cinamomi, casiae, singulorum p. i. *. flores iunci rotundi, castorei albi, piperis longi, amomi, myrobalani, singulorum scrupuli duo, thuris masculi, nardi syriaci, myrrhae pinguis, croci, spumæ nitri, singulorum p. i. i. *. Quæ separatim contrita, rursus mista ex aceto conteruntur, atq; ita condita, ubi vtendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est, Polybij sphragis ex dulci vino liquata. Quæ compositio priore libello continetur. Quod si & sanies profluit, & tumor est, non alienum est, misto vino per oricarium clysterem eluere, & tum infundere vinum austerum cum rosa mistum, cui spodij paulum sit adiectum, aut lycium cum lacte, aut her-

be sanguinalis succum cum rosa, aut mali punici succum cum exigua parte myrrhæ. Si sordida quoque vlcera sunt, melius mulso eluuntur, & tum aliquod ex his, quæ suprâ scripta sunt, quod mel habeat, infunditur. Si magis pus profluit, & caput utiq; tondendum est, & multa calida aqua perfundendum, & gargarizandum, & vsq; ad lassitudinẽ ambulandum, & cibo modico vtendum est. Si cruor quoq; ex vlcerebus apparuit, lycium cum lacte debet infundi, vel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbe sanguinalis, aut acaciæ adiecto. Quod si super vlcera caro increuit, eaq; mali odoris sanguinẽ fundit, aqua tepida elui debet: tamẽ infundi id, quod ex thure & arugine, & aceto, & melle fit, aut mel cum arugine incoctum. Squama quoq; aris cum sandaraca contrita per fistulam recte instillatur.

Aduersus aurium vermes.

Vbi verò vermes orti sunt, si iuxta sunt, protrahendi oriculario specillo sunt. Si longius, medicamentis enecandi, cauendumq; ne postea nascentur. Ad vtrunq; proficit album veratrum cum aceto contritum. Elui quoque aurem oportet vino, in quo marrubium decoctum sit. Sic emortui vermes in primam auris partem pronocabuntur, vnde facillime educi possunt.

Ad compressa aurium foramina.

Si in foramen auri compressum est, & intus crassa series subest, mel quàm optimum addendum est. Si id parum proficit, mellis cyatho

¶

Et dimidio, eruginis rasæ p. i i. x. adijciendum est, incoquendumq; et eo vtendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item mellis et rosæ scrupuli duo. Item galbani p. i i. x. myrrhæ cum melle, et fellis taurini, singulorum p. i i. x. vini quantum satis est ad myrrham diluendam.

Ad grauiem auditum.

Vbi uerò grauius aliquis audire cœpit, quod maxime post longos capitis dolores euenire consuevit. In primis aurem ipsam considerare oportet. Apparebit enim aut crusta, qualis super vlcera inuascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle ærugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri paulum. Atq; ubi crusta à corpore iam recedit, eluenda auris aqua tepida est, quo facilius ea per se diducta, oriculario specillo protrahatur. Si sordes æque molles sunt, eodem specillo eximendæ sunt. At si duræ sunt, acetum et cum eo nitri paululum coniiciendum est. Cumq; emollita sunt, eodem modo elui aurem purgariq; oportet. Quod si capitis grauitas manet, attendendum idem, et leniter, sed diu perfricandum est: adiecto vel irino vel laureo oleo, sic ut utrilibet paulum acetis misceatur: tum diu ambulandum, leniterq; post vnctionem aqua calida caput fouendum. Cibisq; vtendum ex imbecillissima, et media materia, magisq; assumendæ dilutæ potiones, nonnunquam gargariandum est. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto, et laureo oleo, et succo radic

radicula corticis. Aut cucumeris agrestis succus, adiectis contritis rosa folijs. Immaturæ quoque
 * sordidi- vus succus cum rosa instillatus, aduersus * sur-
 tatem ditatem satis proficit.

Ad sonitum aurium intra seipfas.

Aliud vitij genus est, vbi aures intra se-
 ipsas sonant. Atq; hoc quoq; fit, ne exter-
 num sonum accipiant. Leuissimum est, vbi id ex
 grauedine est. Peius, vbi ex morbis, capitis'ue
 longis doloribus incidit. Pessimum, vbi magnis
 morbis venientibus, maximeq; comitali, proue-
 nit. Si ex grauedine est, purgare aurē oportet, &
 spiritū continere, donec inde humor aliquis ex-
 pumet. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad
 exercitationē, frictionem, perfusionē, gargari- &
 zationemq; pertinet, eadem faciēda sunt. Cibus non
 vtendum nisi extenuantibus. In aurem dandus
 radicula succus cum rosa, vel cum succo radicis
 ex cucumere agresti, vel castoreum ex aceto,
 & laureo oleo. Veratrum quoq; cum aceto conte-
 ritur, deinde melle cocto excipitur, & inde col-
 lyrium factum in aurem demittitur. Si sine his
 cæpit, ideoq; nouo metu terret, in aurem dari de-
 bet castoreum cum aceto, vel irino, vel laureo
 oleo, aut huic mistum castoreum cum succo nu-
 cum amararum, aut myrrha et nitrum cum ro-
 sa & aceto. Plus tamē in hoc quoq; proficit vi-
 ctus ratio. Eademq; faciēda sunt, quæ supra
 comprehendi, cum maiore quoq; diligentia: &
 præterea donec his sonus finiatur, à vino absti-
 nendum.

nendum. Quòd si simul & sonus & inflammatio est, laureum oleū coniecisse abunde est, aut id quod ex amaris nucibus exprimitur, quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

Ad ea quæ in aurem inciderunt extrahenda.

SOlet etiā interdum in aurem aliquid incidere, vt calculus, aliquod'ue animal. Si pulex intus est, compellendū eo lana paulū est, quò ipse is subit, & simul extrahitur. Si non est secutus, aliud'ue animal est, specillū lana inuolutū in resina quam glutinosissimā, maximeq; terebinthinā demittendū, idq; in aurem injiciendū, ibiq; vertendum est. Vtiq; enim cōprehendet & eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendū est, aut hamulo retuso paulū recurvato. Si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoq; admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoq; collocatur media inherens capitibus utrinq; pendentibus, superq; eam homo deligatur in id latus versus, cuius auris eo modo laborat, sic vt extra tabulā emineat. Tum malleo caput tabulae, quod à pedibus est, feritur: atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

De Nariū morbis, & curationibus. CAP. VIII.

NAres verò exulceratas fouere oportet vapore aquae calidae, id est spongia expressa atq; admota. Fit & subiecto vase oris angustī, calida aqua repleto. Post id fomentum illinenda
vlcera

ulcera sunt, aut plumbi recremento, aut cerussa.
Aut argenti spumã cum quolibet horum aliquis
conterit, eiq; dum teritur, inuicem vinum &
oleum myrteum adijcit, donec mellis crassitudi-
nem fecerit. Sin autẽ ea ulcera circa nares sunt,
pluresq; crustis & odorem fœdum habet, quod
genus Græci ἀίωνα appellant, sciri quidẽ de-
bet, vix ei malo posse succurri. Nihilominus ta-
men hæc tentari possunt, vt caput ad cutem ton-
deatur, assidueq; vehementer perfricetur, multa
calida aqua perfundatur, multa ei deambulatio
sit, cibus modicus, neq; acer, neq; valentissimus.
Tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resi-
ne terebinthine coniiciatur, quod specillo quoq;
inuoluto lana fit, attrahaturq; spiritu is succus,
donec in ore gustus eius sentiat. Sub his enim
crustæ resolvuntur, quæ tum per sternutamenta eli-
di debent. Puris ulceribus vapor aquæ calidæ
subijciendus est. Deinde adhibendũ aut lycium
ex vino dilutum, aut amurca, aut omphaciũ, aut
menta, aut marrubij succus, aut atramentum su-
torium, quod candens factum, deinde contritum
sit: aut interior scillæ pars contrita, sic vt horum
cuiuslibet mel adijciatur. Cuius in cæteris admo-
dum exigua pars esse debet: in atramento suto-
rio tanta, vt ea mĩstura liquida fiat, cum scilla
vtique pars maior, inuoluendumq; lana specil-
lum est, & in eo medicamento intingendum,
eoq; ulcera implenda sunt. Rursusq; linamẽtum
inuolutum & oblongum eodem medicamento
illinen

illinendum, dimittendumq; in nares est, & ab inferiore parte leniter deligandum. Idq; per hyemem, & ver, bis die: per æstatem, & autumnum, ter die fieri debet. Interdum verò etiam in naribus caruncula quedam, similes muliebribus manimis nascuntur, hæc; in his partibus, quæ carnosissimæ sunt, inhaerent. His curare oportet medicamentis adurentibus sub quibus ex toto consumuntur. Polypus verò est caruncula, modò πολυψος, alba, modò subrubra, quæ narium ossi inhaeret, & modò ad labra pēdens, nares implet, modò retro per id foramen, quò spiritus à naribus ad fauces descendit, adeo increscit, uti post ruam conspici possit, strangulatq; hominem maxime, austro aut euro flante, fereq; mollis est, raro dura: eaq; magis spiritum impedit, & nares dilatat, quæ fere νᾱγνυῶδες est, itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur, interdum tamen inarescit, si addita in nares per linamentum aut penicillum ea compositio est, quæ habet minij sinopici, chalcitidis, calcis, sandaracæ, singulorum P. I. ✱. atramenti sutorij P. I I. ✱.

De Dentium dolore, & curationibus. CAP. IX.

IN Dentium autem dolore, qui ipse quoq; maximis tormētis annumerari potest, vinum ex toto circuncidendum est. Cibo quoq; primo abstinendum, deinde eo modico molliq; utendum, ne mandentis dentes irriter, tum extrinsecus admo-
uendus per spongiam vapor aque calide, impo-
nend

nendumq; ceratum ex cyprino aut irino factum,
 lanaq; id comprehendendum, caputq; velan-
 dum est. Quod si grauior is dolor est, vtiliter &
 alius ducitur, & calida cataplasmata super ma-
 xillas inijciuntur, & ore humor calidus cum
 medicamentis aliquibus continetur, sæpiusq; mu-
 tatur. Cuius rei causa & quinquefolij radix, in
 vino misto coquitur, & hyoscyami radix, vel
 in posca, vel in vino misto coquitur, sic vt paulū
 his salis adijciatur, & papaueris non nimium: ari-
 di cortices, et mūdragoræ radix, eodē modo. Sed
 in his tribus utiq; vitandū est, ne quod haustum
 erit deuoretur. Ex populo quoq; alba, cortex ra-
 dicis in hunc usum in vino misto rectē coquitur,
 & in aceto cornu ceruinum rasum, & nepeta
 cum teda pingui: ac ficus itē pinguis vel in mul-
 so, vel in aceto & melle, ex quibus cum ficus de-
 cocta est, is humor percolatur. Specillū quoq; la-
 na inuolutum in calidum oleum demittitur, eoq;
 ipso dens fouetur. Quinetiam quedam quasi ca-
 taplasmata in dentem ipsum illinuntur. in quem
 usum ex malo punico acido atq; arido, malicorij
 pars interior cum pari portione, & galle, & pi-
 nei corticis conteritur, misceturq; his minium: eaq;
 contrita aqua pluuiatili coquuntur. Aut panacis,
 papaueris lacrymæ, peucedani, vire taminiæ si-
 ne seminibus, pares portiones conteruntur. Aut
 galbani partes tres, papaueris lacrymæ pars
 quarta. Quicquid dentibus admotū est, nihilomi-
 nus supra maxillā, ceratum, quale supra posui,
 esse

esse debet lana obiectū. Quidam etiam myrrhae,
 cardamomi, singulorum P. I. *. croci, pyrethri,
 *ficorum partes, singulorum P. I I I I. *. sinapis *ficorum
 P. V I I I. *. contrita linteolo illinunt, imponūtq; pinguium,
 in humero partis eius qua dens dolet. Si is supe- fortasse le-
 rior est, à scapulis: si inferior, à pectore. Idq; do- gendū, aut
 lorem leuat: & cum leuauit, protinus submouen- paruarū,
 dum est. Si verò exesus est dens, festinare ad
 eximendum eum, nisi res coegit, non est necesse.
 Sed cum omnibus fomētis, quæ supra posita sunt,
 adiiciendæ quædā valentiores cōpositiones sunt,
 quæ dolorem leuant, quales hæ sunt. Habet au-
 tem papaueris lacrymæ P. I. *. piperis P. I I. *.
 psoreos P. X. *. quæ contrita galbano excipiun-
 tur: idq; circumdatur. Aut Menemachi maxi-
 me ad maxillares dentes, in qua sunt croci P.
 I. *. cardamomi, thuris fuliginis, ficorum *partes, *parua-
 pyrethri, singulorum P. I I I I. *. sinapi P. V I I I. rum, vel
 *. Quidam autem immiscent pyrethri, piperis, pinguiū:
 elaterij, singulorum P. I. *. aluminis scissilis, pa- vt supra.
 paueris lacrymæ, vne taminie, sulphuris ignem
 non experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis,
 singulorum P. I I. *. Quod si dolor eximi eum
 cogit, & piperis semen cortice liberatum, & eo-
 dem modo bacca hederæ coniecta in id foramē,
 dentem findit, isq; forte stans excidet. Et plani
 piscis, quam pastinacam nostri, τρυγῶνα Græci Pastinacæ.
 vocant, aculeus torretur, deinde conteritur, resi-
 naq; excipitur, quæ denti circumdata hunc sol-
 uit. Et alumen scissile in id foramen contactum
 demittit

Λ

demitti

demitti commodius est, quia sic dente seruato, dolorem leuat. Hæc à Medicis accepta sunt. Sed agrestium experimento cognitum, cum dens dolet, herbam mentastrum cum suis radicibus velli debere, & in peluem conijci, supraq; aqua infundi, collocariq; iuxta sedentem hominem vndique veste contextum, tum in peluem candentes filices demitti, sic vt aqua tegantur, hominemq; eum hiante ore vaporem excipere, vt supra dictum est, vndique inclusum. Nam & sudor plurimus sequitur, & per os continens pituita defluit, idq; sæpe longiorem, sæpe annuam valetudinem bonam præstat.

De Tonsillis, & eorum cura. C A P. X.

Radix dul-
cis.

SI vero tonsilla sine exulceratione per inflammationem intumuerunt, caput velandum est extrinsecus, is locus vapore calido fouendus, multa ambulatione vtendum, caput in lecto sublime habendum, gargarizandumq; est ex reprimentibus. Radix quoq; ea, quam dulcem appellant, contusa & in passō, mulso'ue decocta idem præstat. Leniterq; quibusdā medicamentis eas illini non alienum est, quæ hoc modo fiunt: Ex malo punico dulci succus exprimitur, & eius sextarius in leni igne coquitur, donec ei mellis crassitudo sit, tum croci, myrrhæ, aluminis scissilis, singulorum p. i. l. x. per se conteruntur, paulatimq; his adiungitur vini lenis cyathi duo, mellis vnus, deinde priori succo ista miscentur, & rursus leniter incoquantur. At eiusdem succi sextarius eadem

eodem modo coquitur, atq; eadem ratione trita
 ei adijciuntur hæc: Nardi^r p. i. x. omphacij p. i. x. *p. v.
 cinamomi, myrrhæ, casia, singulorum p. i. x. Ea-
 dem autem hæc et auribus, & naribus purulen-
 tis accommodata sunt. Cibus quoq; in hac vale-
 tudine lenis esse debet, ne exasperet. Quod si tan-
 ta inflammatio est ut spiritum impediat, in lecto
 conquiescendum, à cibo abstinendum, neq; adsumen-
 dum quicquid præter aquam calidam est. Aluus
 quoq; ducenda est. Gargariandum ex fico &
 mulso. Illinendum mel, cum omphacio. Intrinsecus
 admonendus, sed aliquanto diutius, vapor aque
 calidæ, donec ea suppurent, & per se aperiatur.
 Si pure substantie non rumpuntur, hi tumores,
 incidendi sunt, deinde ex mulso calido gargari-
 andum ex fico. At si modicus quidem tumor &
 exulceratio est, fursurum cremori ad gargari-
 andum paulum mellis adijciendum est, illinendaq; ulce-
 ra hoc medicamento. Passi quamdulcissimi tres
 hemine ad unam coquuntur, tum adijcitur thu-
 ris p. i. x. croci, myrrhæ, singulorum p. i. x. leni-
 terq; omnia rursus feruescunt. Vbi plurima ulce-
 ra sunt, eodem fursurum cremore, vel lacte gar-
 gariandum est. Atque hic quoque cibus lenibus
 opus est, quibus adijci dulce vinum potest.

De Oris ulceribus, & curationibus, & quæ An-
 theræ sunt.

C A P. XI.

Vlcera autem oris, si cum inflammatione
 sunt, & parum pura ac rubicunda sunt,
 optime his medicamentis curantur, quæ supra po-

A 2

sita

sita ex malis punicis fiunt. Continendusq; saepe ore reprimens cremor cui paulum mellis sit adiectum. Viendū ambulationibus, & non acri cibo. Simulatq; verò pura vlcera esse cœperunt, lenis humor, interdum etiam quàm optima aqua ore continenda est. Prodestq; assumptum purum vinum, pleniorq; cibus, dum acribus vacet. Inspergiq; vlcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallæ immaturæ sit adiectum. Si iam crustas habent, quales in adustis esse consuerunt, adhibenda sunt hæ compositiones quas Graci ἀνθραξας nominant. Iunci quadrati, myrrhæ, sandaracæ, singulorū P. I I I I. *. aluminis pares portiones. Aut croci, myrrhæ, singulorum P. I I. *. iridis, aluminis scissilis, sandaracæ, singulorum P. I I I I. *. iunci quadrati P. V I I I. *. Aut gallæ, myrrhæ, singulorum P. I I. *. aluminis scissilis P. I I. *. rosæ felicis P. I I I I. *. Quidā autem croci P. *. aluminis scissilis, myrrhæ, singulorum P. I. *. sandaracæ P. I I. *. iunci quadrati P. I I I I. *. miscent. Priora arida insperguntur. Hoc cum melle illinitur, neq; vlceribus tantum, sed etiam tonsillis. Verum ea longe periculosissima vlcera sunt, quas ἀφθας Graci appellant, sed in pueris: hos enim saepe consumunt, in viris & mulieribus idem periculum non est. Hæc vlcera à gingiuis incipiunt, deinde palatum totumq; os occupant: tum ad vnam faucesq; descendunt. Quibus obsessis, non facile fit, vt puer conualescat. Ac miserius etiam est, si lactens adhuc infans est,

est, quominus imperari remedium aliquod potest. Sed in primis nutrix cogenda est exerceri ambulationibus, hisq; operibus, quæ superiores partes mouent. Mittenda in balneum, iubendaq; ibi calida aqua mammis perfundere, tum alenda cibus lenibus, & his qui facile non corrumpuntur. Potiones, si febricitat puer, aquæ: si sine febre est, vini diluti. Ac si aluus nutrici substituit, ducenda est. Si pituita eius in os coit vomere debet. Tum ipsa vlcera perungenda sunt melle, cui *rhus quem syriacum vocat, aut amaræ nu- *ros
ces adiectæ sunt. Vel mistis inter se rosæ folijs aridis, pineis nucleis, mentæ coliculo, melle. Vel eo medicamento, quod ex moris fit, quorum succus eodem modo quo punici mali ad mellis crassitudinē coquitur, eademq; ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel, miscetur. Neq; quicquā dandum, ad quod humor euocari possit. Si verò iam firmior puer est, gargarizare debet his fere, quæ supra comprehensa sunt. At si lenia medicamēta in eo parum proficiunt, adhibenda ea, quæ adurendo crustis vlceribus inducant. Quale est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium. Prodest etiam fames, & abstinentia quanta maxime imperari potest. Cibus debet esse lenis. Ad purganda tamen vlcera interdum caseus ex melle recte datur.

De *linguæ vlceribus.

C A P. XII. *lingua-

L* Inguæ quoq; vlcera non alijs medicamentum
tis egent, quam quæ prima parte superioris *Gingiuæ
capitis

A 3

capitis

capitis exposita sunt. Sed quæ in latere eius nascuntur, diutissime durant. Videndumq; est, num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere sepe vlcus eo loco non finit, ideoq; limandus est.

De paradontidibus gingivarum tuberculis, deq;
alijs vlcibus gingivarum. CAP. XIII.

Solent etiam interdum iuxta dentes in gingivis tubercula quædam oriri dolentia, πᾶσι γινγίβιδας Græci appellant. Hæc initio leniter sale contrito perfricare oportet, aut inter se mistis sale fossili, combusto cupresso, nepeta, deinde eluere os cremore lenticulæ, & inter hæc hiare, donec pituitæ satis profluat. In maiore verò inflammatione iisdem medicamentis utendum est, quæ ad vlcera oris supraposita sunt: et mollis linamenti paulum involuendum aliqua compositione ex his, quas antheras vocari dixi, demittendumq; id inter dentem & gingivam: quod si durior erit, & id prohibebit, extrinsecus admo-
nendus erit spongiæ vapor calidus, imponendumq; ceratum. Si suppuratio se ostendet, diutius eo vapore utendum erit, & continendū ore calidum mulsum, in quo ficus decocta sit. Itemq; subcrudum incidendū, ne si diutius ibi pus permanserit, os ledat. Quod si maior is tumor est, commodius totus exciditur, sic ut ex utraq; parte dens liberetur. Pure exempto, si levis plaga est, satis est ore calidam aquā continere, & extrinsecus fovere eodē vapore. Si maior est, lenticulæ cremore: uti iisdem medicamentis, quibus cætera vlcera

ulcera oris curantur. Alia quoq; ulcera in gingivis plerūq; oriuntur, quibus eadem quæ in reliquo ore succurrunt. Maxime tamen mandere ligustrum oportet, succumq; eū ore continere. Fit etiam interdum, ut ex gingivæ ulcere, siue ^{*pa-} ^{*παγοδόν} rodontides sint, siue nō sint, diutius pus feratur. ^{tis fuit,} Quod aut dente corrupto, aut fracto, vel aliter siue non vitiatō osse, maximeq; id per fistulam venire fuit cōsuevit, ubi incidit, locus aperiendus, dens eximendus: testa ossis, si qua excessit, recidenda est: si quid vitiosi est, radendum. Post quæ, quid fieri debeat, suprà in aliorum ulcerum curatione comprehensum est. Si verò à dentibus gingivæ recedunt, eadem antheræ succurrunt. Utile est etiam pyra, aut mala non permatura mandere, et ore eum humorem continere. Idemq; præstare non acre acetum in ore retentum potest.

De Vux morbo, & curatione. CAP. XIII.

Vux vehemens inflammatio terrere quoq; debet. Itaq; in hac abstinentia necessaria est, & sanguis recte mittitur: & si id aliqua res prohibet, alius utiliter ducitur, caputq; super hæc velandum, & sublimius habendum est: tum aqua gargarizandum, in qua simul rubus & lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa vux vel omphacio, vel galla, vel alumine scissilli, sic ut cuilibet eorum mel adijciatur. Est etiam medicamentum hæc aptū, quod *Aydronium* appellatur. Cōstat ex his, alumine scissilli, squama aris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy.

Audroniū.

A 4 Quæ

Que per se contrita mistaq; rursus paulatim ad-
iecto vino austero teruntur, donec his mellis cras-
situs sit: ubi horum aliquo illita vna est, cheli-
denie quoq; succo per cochlear illita vna maxi-
me prodest. Fere multa pituita decurrit, cumq;
ea quieuit, ex vino calido gargarizandū. Quod
si minor in ea inflammatio, laser terere, eiq; adij-
cere frigidam aquam satis est, eamq; aquam co-
chleario exceptam ipsi vna subijcere: Ac me-
diocriter eam tumentem aqua quoq; frigida, eo-
dem modo subiecta, reprimit. Ex eadem autem
aqua gargarizandum quoq; est, vel cum lasere,
vel sine eo hac curatione vna subiecta est.

De Cancro oris.

CAP. XV.

SI quando autem vlcera oris cancer inuasit,
primo considerandum est, num malus cor-
poris habitus sit, eiq; occurrendum, deinde ipsa
vlcera curanda. Quod si in summa parte id vi-
tium est, satis proficit anthera humido vlceri ari-
da inspersa: sicciori cum exigua parte mellis il-
lita. Si paulo altius, chartæ combustæ partes due,
auripigmenti pars vna. Si penitus malum de-
scendit, chartæ combustæ partes tres, auripi-
gmenti pars quarta. Aut pares portiones salis
fricti, et iridis frictæ. Aut item pares portiones
chalcitidis, calcis, auripigmenti. Necessarium au-
tem est linamentū in rosa tingere, & super adu-
rentia medicamenta imponere, ne vicinum &
sanum locum ledant. Quidā etiam in acris aceti
beminam frictum salem coniungunt, donec tabe-
scere

scere desinat : deinde id acetum coquunt , donec
 exiccetur , eumq; salem contritum inspergunt.
 Quoties autem medicamentū inijcitur , & ante
 & post os diluendum est, vel cremore lenticulae,
 vel aqua in qua aut eruum , aut olea , aut ver-
 bene decoctae sint, sic ut cuilibet eorum paulum
 mellis misceatur. Acetum quoq; ex scilla reten-
 tum ore, satis aduersus haec vlcera proficit. Ex
 aceto cocto sili , sicut supra demonstratum est,
 rursus mistum acetum . Sed & diu continere
 vtrumlibet, et id bis aut ter die facere, prout ve-
 hemens malum est, necessarium est. Quod si puer
 est, cui id incidit, specillum lana inuolutū in me-
 dicamentum demittendum est , & super vlcus
 tenendum, ne per imprudentiam adurentia de-
 uoret. Et si dolor in gingiuis est, mouenturq; ali-
 qui dentes, refici eos oportet: nam curationes ve-
 hementer impediunt. Si nihil medicamenta pro-
 ficient, vlcera erunt adurenda. Quod tamen in
 labris ideo non est necessarium, quoniam excide-
 re commodius est. Et id quidem aequae adustum
 atq; excisum, sine ea curatione, quae corpori ma-
 ni adhibetur , impleri non potest . Gingivarum
 verò ossa, quae hebetia sunt, in perpetuum vstio-
 ne nudantur. Neq; enim postea caro increscit.
 Imponenda tamen adustis lenticula est , donec
 sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

De Parotidibus, quae sub auribus oriuntur.

C A P. XVI.

HAec in capite fere medicamentis egent.

A S Sub

Sub ipsis verò auribus oriri πᾶσι τὶδες solēt, modo in secunda valetudine ibi inflāmate orta, modo post lōgus febres, illuc impetu morbi conuerso. Id abscessus genus est. Itaq; nullam nouam curationem desiderat. Animaduersionem tantummodo hanc habet necessariam, quia si sine morbo id intumuit, primum reprimendum experimentum est. Si ex aduersa valetudine, illud inimicum est, maturariq; & quā primum aperiri commodius est.

De Umbilici prominentis curatione.

C A P.

XVII.

AD Umbilicos verò prominentes, ne manu ferroq; vtendum sit, antè tentandum est, vt abstineat, alius his ducatur, imponatur super umbilicum id, quod ex his constat: Cicutæ & fuliginis, singulorum p.i. * cerussæ elotæ p.iiii. * plumbi eloti p.viii. * ouis duobus, quibus etiam solani succus adijcitur. Hoc ilutius impositum esse oportet, & interim conuiescere hominem, cibo modico vti, sic vt vitentur omnia infantia.

De obscœnarum partium vitijs, & curationibus.

C A P.

XVIII.

Proxima sunt ea, quæ ad partes obscœnas pertinent, quarum apud Græcos vocabula & tolerabilius se habent, & accepta iam vsu sunt, cum omni ferè medicorum volumine atq; sermone iactentur: apud nos sædiora verba, ne
 *accom- consuetudine quidem aliqua verecundius lo-
 modata quentium *commēdata sunt: vt difficilis hæc ex-
 planatio

planatio sit, simul & pudorem, et artis præcepta seruantibus. Neq; tamen ea res à scribendo deterrere me debuit. Primum, vt omnia quæ salutaria accepi comprehendere, dein quia in vulgus eorum curatio etiam præcipuè cognoscenda est, quæ inuitissimus quisq; alteri ostendit.

De Colis morbis, & curationibus.

Igitur si ex inflammatione Coles intumuit, reduciq; summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fouendus locus est. Vbi verò glans contacta est, oriculario quoque clystere inter eam, cutemq; aqua calida inferenda est. Si mollita sic & extenuata cutis, ducenti paruit, expeditior reliqua curatio est. Si tumor vicit, imponenda est vel lenticula, vel marrubium, vel olea folia ex vino cocta, sic vt cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum adijciatur. Sursumq; coles ad ventrem deligandus est. Quod in omni curatione eius necessarium est. Isq; homo continere se debet, & abstinere à cibo, & potione aquæ tantum à siti vindicari. Postero die rursus adhibendum ijsdem rationibus aquæ fomentum est, & cum vi quoq; experiundum, an cutis sequatur. Eaq; si non parebit, leuiter summo scalpello cöcidenda erit. Nam cum sanies profluxerit, extenuabitur is locus, et facilius cutis ducetur. Siue autem hoc modo vitela erit, siue nunquam repugnauerit, vlcera vel in cutis vltiore parte, vel in glande vltra'ue eam in cole reperientur: quæ necesse est, aut pu-
ra sicca

ra sicca' re sint, aut humida, & purulenta. Si
 sicca sunt, primum aqua calida fouenda sunt: de-
 inde imponendum lycium ex vino est, aut amur-
 ca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum. Si le-
 uis uis humor inest, vino eluenda sunt, tum buty-
 ri, & rosae mollis paulum, & resinae terebinthi-
 nae pars quarta adijcienda est, eoq; vtendum.
 Aut si pus ex his profluit, ante omnia elui mul-
 so calido debet. Tum imponi piperis p. i. *. myr-
 rhæ p. ii. *. croci, misyos cocti, singulorum p. ii.
 *. Quæ ex vino austero coquantur, donec mellis
 crassitudinem habeant. Eadem autem compositio
 tonsillis, rube madentiori, nariumq; vlceribus
 accommodata est. Aliud ad eam piperis p. i. *.
 myrrhæ p. i. *. croci p. ii. *. misyos cocti p. i. *.
 arsi combusti p. ii. *. primum ex vino austero
 conteruntur, deinde ubi inaruerunt, iterum te-
 rantur ex passi tribus cyathis, & incoquantur,
 donec visci crassitudinem habeant. Aerugo quoq;
 cum cocto melle, & ea quæ ad oris vlceres supra
 comprehensa sunt, curant. Aut Erasistrati com-
 positio, aut Cratonis recte super purulenta natu-
 ralia imponitur. Folia quoq; oleæ ex noue cya-
 this vini coquantur. His adijcitur aluminis scis-
 filis p. iiii. *. lycij p. viii. *. mellis sesquicya-
 thus. Ac si plus puris est, id medicamentum ex
 melle: si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum
 est, post curationem dum inflammatio manet,
 quale suprapositum est, cataplasma supra dare,
 & quotidie vlceres eadem ratione curare. Quod
 si pus

si pus & multum, & cū malo odore cœpit profluere, elui cremore lenticulæ debet, sic, vt ei mellis paulum adiñciatur: aut oleæ, aut lentisci folia, vel marrubium decoquendum est, eoq; humore eodem modo cum melle vtendum, imponendaq; eadem, aut etiam omphacium cum melle, aut id quod ex erugine & melle ad aures fit, aut compositio Andronis, aut anthera, sic, vt ei paulum mellis adiñciatur. Quidam vlcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex vino curant. Si verò vlcus latius atq; altius serpit, eodem modo elui debet. Imponi verò, aut erugo, aut omphacium cum melle, aut Andronis compositio, aut marrubij, nyrrihæ, aut croci, aluminis scissilis cocti, rose foliorum aridorum, gallæ, singulorum p. i. .x. minij sinopici p. ii. .x. Quæ per se singula primum teruntur, deinde iuncta iterum melle adiecto, donec liquidi cerati crassitudinē habeant: tum in aneo vase leniter coquuntur, ne superfluant. Cum iam guttæ indurescunt, vas ab igne remouetur, idq; medicamentū, prout opus est, aut ex melle aut ex vino liquatur. Idem autem per se etiam ad fistulas vtile est. Solet etiam interdum ad nervos vlcus descendere, profluitq; pituita multa, sanies tenuis maliq; odoris, non cocta, aut aqua similis, in qua caro recens lota est. Doloresq; is locus & punctiones habet. Id genus quamuis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est, quale est emplastrum ῥεῖσα γαργαλιανῶν ex rosa liquatum, sicut thuris quoq;

quoq; paulum ei misceatur. Aut id quod ex butyro, rosa, resina, melle fit, supra verò à me positum est. Præcipueq; id vlcus multa calida aqua fouendum est, velandumq; neq; frigori committendum. Interdum autē per ipsa vlcera, coles sub cute exesus, sic vt glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuū ē, est, quoties glans, aut ex cole aliquid vel excidit, vel abscinditur, hanc non esse seruandā, ne confidat, vlceriq; agglutinetur, ac neq; reduci possit postea, & fortasse fistulā quoq; vrinx includat. Tubercula etiam, quæ φύμαλα Græci vocant, circa glandē oriuntur, quæ vel medicamentis vel ferro aduruntur: & cū crustæ exciderunt, squama aris inspergitur, ne quid ibi rursus increseat.

De Caueri, qui in cole nascitur, curatione.

Hæc citra cancerum sunt, qui cum in reliquis partibus, tum in his quoq; vel præcipue vlcera infestat. Incipit à nigrilie, quæ si cutem occupauit, protinus specillum subiciendum, eaq; incidenda est, deinde ora vulsellaprehendende: tum quicquid corruptū est, excidendum, sic vt ex integro quoq; paulum dermat, idq; adurendum. Quoties quid vstum est, id quoq; sequitur, vt imponenda lenticula sit, deinde vbi crustæ exciderunt, vlcera sic, vt alia, curentur. At si cancer ipsum colem occupauit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeq; id quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. Si medicamēta vincuntur, hic quoq; scalpello quicquid

quid corruptum est, sic ut aliquid etiam integri trahat, præcidi debet. Illud quoque æque perpetuum est, exciso cancro vulnus esse adurendum. Sed siue ex medicamentis, siue ex ferro crustæ occalluerunt, magnum periculum est, ne his decidentibus ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete & immobili penè corpore opus est, donec ex ipsa crusta pura leniter resoluantur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur, immature crustas diduxit, et fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est. Si hæc parum valet, decurrendum est ad medicamenta, quæ sanguinem supprimunt. Si ne hæc quidem succurrunt, aduri diligenter et timide debet, neque vllò postea motu dandus eidem periculo locus est.

De Phagedænæ in cole nascentis curatione.

Nonnunquam etiam id genus ibi cancri, quod φρυδάινæ à Græcis nominatur, oriri solet, in quo minime differendum, sed protinus iisdem medicamentis occurrendum est, & si parum valent, ferro adurendum. Quædam etiam nigrities est, quæ non sentitur, & serpit, ac si sustinuiamus, usque ad vesicam tect, neque succurri postea potest. Si id in summa glande circa fistulam vrinz est, prius in ea tenue specillum demittendum est, ne claudatur: deinde ferro adurendum. Si verò alte penetravit, quicquid occupatum est præcidendum est. Cæterum eadem, quæ in alijs cancribus, facienda sunt.

De Carbunculo, qui in cole nascitur.

Occalle

Occalescit etiam in cole interdum aliquid, idq; omni penè sensu caret, quod ipsum quoq; excidi debet. Carbunculus autē ibi natus, ut primum apparet, oriculario clystere eluendus est. Deinde ipse quoq; medicamentis vrendus, maximeq; chalcitide cū melle, aut æruginē cum cocto melle. Vbi is excidit, liquidis medicamētis vtendum est, quæ ad ora vlcis componuntur.

De Testiculorum morbis, & eorum curatione.

IN testiculis verò, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est, à cibo abstinendum, imponendum ex faba farina ex mulso cocta, cū cumino contrito ex melle cocto. Aut contritum cuminum cū cerato ex rosa facto. Aut lini semen frictum, contritum, & in mulso coctum, aut tritici farina ex mulso cocta cum cupressō, aut lilij radix contrita. Aut si iudē induruerunt, imponi debet lini vel sœnigraci semen ex mulso coctū, aut ex cyprino ceratum: aut similia ex vino contrita, cui paulum croci sit adiectum. Si vetustior iam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita. Si ex ictu tument, sanguinē mitti necessarium est, magisq; si etiam liuent, Imponendum verò vtrumlibet ex his, quæ cum cumino cōponuntur, supraq; proposita sunt. Aut ea compositio quæ habet nitri cocti p.i. *. resine pineæ, gummi, singulorum p.ii. *. v. æ taminiæ sine seminibus p.iiii. *. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculis aliquid desit,

desit, fere quoque increfcit, neque aliter succurri poteſt, quàm ſi incifo ſcroto, & pus emiſſum, & ipſe teſticulus exciſus eſt.

De Rhagadiis, & Condylomate, & Hæmorrhoidibus, aliisq; ani morbis, & curationibus eorum: & primo de Rhagadiis.

ANus quoque multa tediūq; plena mala recipit, nec in ſe multum abhorrentes curationes habet. At primum in eo ſæpe, & quidem pluribus locis, cutis exciditur, Πάγῃδιαι Græci vocant. Id ſi recens eſt quieſcere homo debet, & in aqua calida deſidere. Columbina quoque oua coquenda ſunt, & ubi induruerunt purganda: deinde alterum iacere in aqua bene calida debet, altero calido foueri locus, ſic vt inuicem vtroq; aliquis vtatur. Tum tetrapharmacum, aut rhypodes roſa diluendum eſt, aut hyſſopum recens miſcendum cum cerato liquido ex roſa factō. Aut eidem cerato liquido plumbum elotum adiſciendum. Aut reſine terebinthinæ myrrha, aut ſpumæ argenti vetus oleum. Et quolibet ex his id perungendum. Si quicquid leſum eſt, extrâ eſt, neq; intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentū ſuperdandum eſt, & quicquid antè adhibuimus cerato contegendum. In hoc autem caſu neq; acribus cibis vtendum, neq; aſperis, nec aluum comprimentibus: ne aridum quidem quicquam ſatis vtile eſt, niſi admodum paulum. Liquida, lenia, pingua, glutinoſa meliora ſunt. Vino leni vti nihil prohibet.

B

De

Condyloma autem est tuberculum, quod ex quadam inflammatione nasci solet. Id ubi ortum est, quod ad quietē, cibos, potionesq; pertinet, eadem seruari debent, quæ proxime scripta sunt. Iisdem etiam cui recte tuberculum id fouetur. Sed desidere ante homo in aqua debet, in qua verbenæ decoctæ sunt ex reprimentibus. Tum recte imponitur & lenticula cum exigua mellis parte, & sertula campana ex uino cocta, & rubi folia contrita cum cerato ex rosa facta, & cum eodem cerato contritū uel cotoneum malum, uel malicorij ex uino cocti pars interior, & chalcitis cocta atque contrita, deinde hyssopo ac rosa excepta. Et ex ea compositione, quæ habet thuris ꝑ. i. ✱. aluminis scissilis ꝑ. i. i. ✱. cerussæ ꝑ. i. i. i. ✱. spumæ argenti ꝑ. v. ✱. Quibus dum teruntur, inuicē rosa & vinum instillatur. Vinculum autē ei loco linteolum, aut panniculus quadratus est, qui ad duo capita duas ansas, ab altera verò parte totidem fascias habet: cumq; subiectus est, ansis ad ventrē datis à posteriore parte in eas adductæ fasciæ coniunguntur, atq; ubi artatae sunt, dexteriori sinistra, sinistriori dextra procedit, circumdataq; circa aluū inter se nouissime nodo deligantur. Sed si vetus condyloma iam induruit, neq; sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat, aruginis ꝑ. i. i. ✱. myrrhæ ꝑ. i. i. i. ✱. gūmi ꝑ. v. i. i. ✱. thuris ꝑ. x. i. i. ✱. stibis, papaueris lacryma, acacia,

eis, singul. p. xvi. x. quo medicamento quidam etiam vlcera, de quibus proxime dixi, renouant. Si hoc parū in cōdylomate proficit, adhiberi possunt etiam vehemētius adurētia. Vbi cōsumptus est tumor, ad medicamēta lenia transeundum est.

De Hæmorrhoidibus.

Tertium autem uitium est, ora uenarū tanquam ex capitulis quibusdam surgentia, quæ sæpe sanguinē fundunt, αἱμορροΐδης Græci vocant. Idq; etiam in ore vuluæ scæminarum incidere consuevit. Atq; in quibusdam parum tutò supprimitur, qui sanguinis profluuiū imbecilliores non fiunt. Habent enim purgationē hanc, non morbum. Ideoq; curati quidam cum sanguinis exitum non haberent, inclinata in præcordia ac viscera materia, subitis & grauissimis morbis correpti sunt. Si cui verò id nocet, is desiderare in aqua ex uerbenis debet: imponere maxime mallicorium cum aridis rosæ folijs contritum, aut ex his aliqua quæ sanguinem supprimunt. Solet autem oriri inflammatio, maxime vbi dura alius eum locum læsit. Tum in aqua dulci desidendum est, & id fouendum ovis, imponendi vitelli cum rosæ folijs ex passō* subactō: idq; si intus est, digito illinendum: si extra, supèr illitum panniculū imponendum est. Ea quoq; medicamēta, quæ recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibis verò in hoc casu iisdem, quibus in prioribus, vtendum est. Si ista parū iuuant, solent imposita medicamenta adurentia, ea capitula absu-
mere.

*subactis

B 2

mere. Ac si iam uetustiora sunt, sub autore Dionysio inspergenda sandaraca est, deinde imponendum, quod ex his constat: Squamæ aris, auripigmenti, sing. p. v. *. saxi calcis p. viii. *. postero die acu compungendum. Aduſtis capitulis fit cicatrix, quæ sanguinē fundi prohibet. Sed quoties is suppressus est, ne quid periculi afferat multa exercitatiōe digerēda materia est. Prætereaq; & viris et sæminis, quibus mēstrua non proueniunt, interdū ex brachio sanguis mittendus est.

Si anus vel os vuluæ procidit, qua curatione utendum sit.

AT si anus ipse, vel os vuluæ procidit (nam id quoq; interdū fit) considerari debet purum ne id sit, quod prouolutū est, an humore mucoso circumdatū. Si purū est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis, vel malicorio incocta. Si humidū, vino austero subluendum est, illinendumq; fece vini combusta. Vbi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est, imponendaq; plantago contrita, vel folia salicis in aceto cocta, tum linteolum, & supèr lana æque deliganda, cruribus inter se deuinctis.

De vlcere fungo simili in ano.

Fungo quoq; simile vlcus in eadē sede nasci solet. Id si hyems est, egelida: si aliud tem-
 *squama pus, frigida aqua fouendum est: deinde *spuma
 aris inspergenda, supraq; ceratum ex myrteo factum, cui paulum squamæ fuliginis, calcis sit adieciū. Si id hac ratione non tollitur, vel medica-
 mentis

mentis uehemētioribus, vel ferro adurendum est.

De digitorum ulceribus.

CAP. XIX.

Digitorum autem uetera ulcera commodissime curantur, aut lycio, aut myrrha cocta, cum utrilibet uinū adiectum est. In uisdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore consuevit, πύριον Græci appellant. Oportet alumen melinū rotundū in aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat: tum quantū eius aridi fuit, tantundem mellis infundere & radiculam miscere, donec similis croco colore fiat, eoq; illinere. Quidam ad eundē usum decoquere simul maluam solent: cum paria pōdera aluminis aridi & mellis miscuerint. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fouēdi aqua ex verbenis, imponendumq; super medicamentū ita factū: Chalcitis, malicorin, squama æris excipiuntur fico pingui leniter cocto ex melle. Aut chartæ combustæ, auripigmenti, sulphuris ignem non experti par modus cerato miscetur ex myrteo factō. Aut æruginis rase p.i. * squama p.ii. * mellis cyatho coguntur, aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quicquid horū impositum est, tegendum linteolo aqua madesacto est, tertio die digitus resoluendus est. Si quid aridi est, iterum excidendum, similisq; adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgandus scalpello, tenuibusq; ferramētis adurendus est, & sicut reliqua uulsa curandus est. At ubi scabri ungues sunt, circumaperiri debēt,

B 3

quæ

quà corpus contingunt, tunc super eos ex hac
compositione aque imponi sandaracæ, sulphuris,
singulorum P. I I. *. nitri, auripigmenti, singu-
* aliàs, lorum P. I I. *. resinæ liquidæ P. V I I I. *. Ter-
P. I I I I. tioq; id die resoluendum est. Sub quo medicamen-
to vitiosi ungues cadunt, & in eorum locum
meliores renascuntur.

LIBER VII.

De Chirurgica, & qui in ea claruerint, & qualis
esse Chirurgus debeat, & quid in hoc
libro describatur.



PARTIAM esse medicinæ partem,
quæ manu curet, & vulgo notum,
& à me propositum est. Ea non qui-
dem medicamenta atq; victus ra-
tionem omittit, sed manus tamen plurimum præ-
stat, estq; eius effectus inter omnes medicinæ
partes euidentissimus. Siquidem in morbis cum
multum fortuna conferat, eademq; sæpe saluta-
ria, sæpe vana sint, potest dubitari secunda va-
letudo medicinæ, an corporis beneficio contigerit.
In his quoque, in quibus medicamentis maxi-
me nitimur, quamuis profectus euidentior est,
tamen sanitatem & per hæc frustra quæri, &
sine his reddi sæpe manifestum est. Sicut in ocu-
lis quoque deprehendi potest, qui à medicis diu
vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea par-
te, quæ manu curat, euidentius est, omnem profectum,
ut aliquid ab alijs adiuuetur, hinc tamen pluri-
mum

num trahere. Hæc autem pars cum sit vetustissima, magis tamen ab illo parente omnis medicina Hippocrate, quam à prioribus exculta est. Deinde posteaquàm diducta ab alijs habere professores suos cœpit, in Aegypto quoq; increvit, Philoxeno maxime autore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque & Sostratus, & Hieron, & Apollonij duo, & Ammonius Alexandrinus, multiq; alij celebres uiri, singuli quedam repererunt. Ac Romæ quoq; non mediocres professores, maximeq; nuper Tryphon pater, & Euelpistus, & ut ex scriptis eius intelligi potest, horum eruditissimus Meles, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei discipline adiecerunt. Esse autem chirurgus debet adolescens, aut certè adolescentiæ propior, manu strenua, stabili, nec unquam intremescente, eaq; non minus sinistra, quam dextra promptus, acie oculorum acri, claraq; animo intrepidus, immisericors, sic ut sanari velit eum, quem accipit, non ut clamore eius motus, vel magis quam res desiderat, properet, uel minus quam necesse est, scet: sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex uagitibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri, quid huic parti proprie vendicandum sit, quia vulnorum quoq; ulcerumq; multorum curationes, quas alibi executus sum, chirurgi sibi vendicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista præstare concipio. Atq; ubi se diuiserunt, eum laudo, qui

quàmplurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit, & in quibus vulneribus vlceribus'ue plus perfici manu, quàm medicamento credo: tum quicquid ad ossa pertinet, quæ deinceps exequi adgrediar, dilatisq; in aliud volumen ossibus, in hoc cetera explicabo: præpositisq; his, quæ in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quæ proprias sedes habent, transibo.

De Luxatis.

CAP. I.

Luxata igitur, in quacunq; parte corporis sunt, quamprimum sic curari debent, ut quæ dolor est, eà scalpello cutis crebro incidatur, detergaturq; eodem aduerso profluens sanguis. Quod si paulò tardius subuenitur, iamq; etiam rubor est, quæ rubet corpus, si tumor quoq; accessit, quacunq; is est, id optimū auxilium est. Tum superdanda reprimentia sunt: maximeq; lana succida ex aceto & oleo. Quod si leuior is casus est, possunt etiam sine scalpello imposita eadem mederi. Et si nihil aliud est, cinis quoque maxime ex sarmentis. Si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

De his quæ per se intumescunt, quomodo excidenda, & curanda sint.

CAP. II.

Verum hoc quidem promptū est. In his autem negotium maius est, quæ per se vitio intus orto intumescunt, & ad suppurationē spectant. Ea omnia genera abscessuum esse aliàs proposui, medicamentaq; eis idonea executus sum.

Nunc

Nunc superest, ut dicam in iisdem quæ manu fieri debeant. Ergo priusquam indurescant, cutem incidere, & cucurbitulam accommodare oportet, quæ quicquid illuc malæ corrupta quæ materia coit, extrahat, id quæ iterum tertio quæ recte fit, donec omne indicium inflammationis excidat. Neque tamen fas non est, nihil cucurbitula agere. Interdum enim, sed raro quicquid abscedit, velamento suo includitur, id antiqui tunicam nominabant. *Tunica.*

Meles, quia tunica omnis nervosa est, dicit non nasci sub eo vitio nervi, quo caro consumeretur, sed subiecto iam vetustiore pure callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco pertinet, quia quicquid dixi, si tunica est, idem si callus est, fieri debet. Neque ulla res prohibet, etiam si callus est, tamen quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoque maturiore hæc interdum esse consuevit. Ideoque quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. Sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo siue id incidit, siue iam durities est, in hac auxilij nihil est. Et ut alias scripsi, vel auertenda concurrens eò materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil præter ea necessarium est. Si pus maturuit in alijs quidem & in inguinibus, raro secandum est. Item ubicunque mediocris abscessus est. Item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est, nisi festinare curantis imbecillitas cogit. Satis quæ est cataplasmata efficere,

B 5

ut

ut per se pus aperiatur. Nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autē altius malum est, considerari debet, nervosus ne is locus sit, an non sit. Nam si sine nervis est, candenti ferramento aperiri debet. Cuius hac gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus euocandum putet, paruaq; postea cicatrix fit.

*ignis a- At si nerui iuxta sunt, *in his periculum est, ne
liens est vel distendantur hi, vel membrum debilitent. Neccessaria verò opera scalpelli est. Sed cetera etiam subcruda aperiri possunt. Inter nervos verò ultima expectanda maturitas est, quæ cutem extenuet, eiq; pus iungat, quod propius reperia-
*alia tur. Itemq; * aliam rectam plagam desiderant in carne, quia fere vehementer cutem extenuat, tota ea super pus excidenda est. Semper autem ubi scalpellus admonetur, id agendum est, ut & quamminime, & quamparcissime plage sint: cum eo tamen ut necessitati succurramus & in modo & in numero. Nam maiores sinus, latius interdum etiam duabus aut pluribus lineis incidendi sunt. Dandaq; opera, ut imus sinus exitum habeat, nequis humor intus subsidat, qui proxima et adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit. Nam ubi post longos morbos totus corporis habitus vitiatum est, lateq; se sinus diffundit, & in eo pars cutis pallet, scire licet eam iam emortuam esse, & inutilem futuram. Ideoq; excidere commodius est, maxime si circa articulos maiores
id

id euenit, cubantemq; agrū fluens alius *exer- *exhausti-
 cuit, neq; per alimenta quicquam corpori acce-
 dit. Sed excidi ita debet, vt plaga ad similitudi-
 nem myrtei folij fiat, quo facilius sanescat. Idq;
 perpetuum est. Vbicunq; medicus ex quacunque
 caussa cutem excidit, pure effuso in alis vel in-
 guinibus, linamento opus non est. Spongia ex ui-
 no imponenda est. In ceteris partibus, si æquè ea
 linamenta superuacua sunt, purgationis caussa
 paulum mellis infundendum, dein glutinantia su-
 pèr danda. Si illa necessaria sunt, super ea quoq;
 similiter dari spongia eodem modo ex vino ex-
 pressa debet. Quando autem linamentis opus sit,
 quando non sit, aliàs dictum est. Cetera eadem,
 incisa suppuratione, facienda sunt, quæ ubi per
 medicamenta rupta est, facienda esse proposui.

De bonis malisue signis exulceratorum.

C A P. III.

Protinus autem quantum curatio efficiat,
 quantumq; aut sperari aut timeri debeat,
 ex quibusdam signis intelligi potest, fereq; ijs-
 dem quæ in vulneribus exposita sunt. Nam bo-
 na signa sunt, somnum capere, facile spirare, siti
 non confici, cibum non fastidire, si febricula fuit,
 ea vacare. Itemq; habere pus album, leue, non
 fædi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus grani-
 tas, sitis, cibi fastidium, febris, pus nigrum, aut
 feculentum, & fædi odoris. Item procedente cu-
 ratione eruptio sanguinis: aut si antequàm sinus
 carne impleatur, oræ carnosæ fiunt. Illa quoque
 ipsa

ipsa carne hebetē nec firma, deficere tamen animam, vel ipsa curatione vel postea, pessimum omnium est. Quinetiā morbus ipse siue subito solutus est, deinde suppuratio exorta est, siue effuso pure permanet, non iniuste terret. Estq; inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut hac ipsa fortuna huc illuc'ue discernit, sic medici partus est, eniti ad reperiendā sanitatē. Ergo quoties vlcus resilerit, eluere id: si reprimendus humor videbitur, vino ex aqua pluiatili misto, vel aqua in qua lenticula cocta sit, debebit. Si purgandū erit, mulso: rursusq; imponere eadē. Vbi iam repressus videbitur humor, vlcusq; purum erit, produci carnem conueniet, & foueri vulnus pari portione vini ac mellis, superq; imponi spongia ex vino & rosa tincta. Per quae cum caro producat, plus tamen (ut alias quoq; dixi) vlcus ratio eo confert, id est solutis iam febribus & cibi cupiditate reddita, balneum rarum, quotidiana, sed lenis gestatio, cibi portionesq; corpori reficiendo. Apteq; omnia quae per medicamenta suppuratōe quoq; rupta sequuntur, sed quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reseruata sunt.

De Fistulis.

C. A. P. II II.

ADuersus Fistulas quoq; si altius penetrāt, ut ad ultimas demitti collyrium non possit, si tortuose sunt, si multiplices, maius in manu quam in medicamentis praesidium est, minusq; operae est, si sub cute transuersae feruntur, quam si recte

recte intus tendunt. Igitur si sub cute transuersa fistula est, demitti specillum debet, supraq; id ea incidi: si flexus reperiuntur, hi quoq; simul specillo & ferro persequendi sunt. Idemq; faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Vbi ad fines fistule ventum est, excidendus ex toto cal-
lus est, superq; fibule danda, & medicamentum quo glutinetur. At si recta subter tedit, ubi, quò maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet, dein fibula oris cutis inijcienda est, & aequae glutinantia medicamenta superdanda sunt. Aut si corruptius vlcus, quod interdum osse uti-
ato fit, ubi id quoq; curatum est, pus mouentia. Solent autem inter costas fistulae subter exire, quod ubi incidit, eo loco costa ab utraq; parte decidenda & eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur: solent ubi costas transierunt, septum id, quod transuersum à superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi & ex loco, & ex magnitudine doloris potest, & quia nonnunquam spiritus eo, cum humore quasi bullate prorumpit, maximeq; si humore ille continuit. In eo medicamini locus nullus est. In ceteris vero quae circa costas sanabilia sunt, pingua medicamenta inimica sunt, ceteris quae ad vulnera accommodantur, uti licet. Optime tamen sicca linamenta, vel si purgandum aliquid videtur, in melle tincta imponuntur. Venti nullum os subest, sed ibi perniciose admodum fistulae sunt, adeo ut Sostratus insanabiles esse credider

diderit. Id non ex toto ita se habere vsus ostēdit. Et quidē (quod maxime mirum videri potest) tutior fistula est contra iecur, & lienem, & ventriculū, quā cōtra intestina: non quo perniciosior res ibi sit, sed quo alteri periculo locū faciat. Cuius experimento moti quidam autores parum modum rei cognouerūt. Nam venter sēpe etiam telo perforatur, prolapsaq; intestina conduntur, & oras vulneris suturæ comprehendunt, quod quemadmodū fiat mox indicabo. Itaq; etiam vbi tenuis fistula abdomen perrumpit, excidere eam licet, suturāq; oras coniungere. Si verō ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat, quod nisi magna vi utiq; ab interiore parte sui non potest, qua quasi membrana quædam finit abdomen, quam *περιτόναια* Græci vocant. Ergo vbi aliquis ingredi ac moueri cōpit, rumpitur illa sutura, atque intestina soluantur. Quo fit, vt pereundum homini sit. Sed non omni modo res ea desperationem habet. Ideoq; tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

De ani fistulis.

Propriā etiamnum animaduersionē desiderāt ea, quæ in ano sunt. In hac demisso specillo, ad vltimum eius caput incidi cutis debet, dein nouo foramine specillū educi lino sequente, quod in aliam eius partem ob idipsum perforatū coniectum sit. Ibi lino prehendendum, vinciens dumq; cum altero capite est, vt laxè cutem, quæ super fistulā est, teneat. Idq; lino esse debet crūdum,

dum, & duplex triplex'ue, sic tortum ut unitas facta sit. Interim autem licet negotia agere, ambulare, lauare, cibū capere perinde atq; sanissimo. Tantummodo id linum bis die saluo nodo ducendū est, sic ut subeat fistulā pars quæ superior fuerit. Neq; committendū est, ut id linum putrescat. Sed tertio quoq; die nodus resoluendus est, & ad caput alterum recens linum alligandum, educitoq; vetere, id in fistula cum simili nodo relinquendū. Sic enim id paulatim cutem, quæ supra fistulam est incidit, simulq; & id sanescit, quod à lino relictum est, & id quod ab eo mordetur, inciditur. Hæc ratio curationis longa, sed sine dolore est. Qui festinat, astringere cutem lino debet, quo celerius secet, noctuq; penicillo tenuia quadam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur, quo extenditur. Sed hæc dolorem mouent. Adijcitur celeritati sic, ut tormento quoq; ^{*sicut} si & linum & id quod ex penicillo est, aliquo medicamēto illinitur, ex his quibus callum excidi posui. Poterit tamen fieri ut ad scalpelli curationem etiam illò loci veniendum sit, si intus fistula fert, si multiplex est. Igitur in hæc genera demisso specillo duabus lineis incidenda cutis est, ut media inter eas habennula tenuis admodum eijciatur, ne protinus ora coeant, sitq; locus aliquis linamentis, quæ quàm paucissima superinijcienda sunt, omniaq; eodem modo facienda, qui in abcessibus positus est. Si vero ab vno ore plures sinus erunt, recte fistula scalpello erit incid

incidenda, ab eo ceteræ quæ iam patebunt lino excipiendæ: si intus aliqua procedet, quò ferrum tuto peruenire non poterit, collyrium demittendum erit. Cibus autem in omnibus eiusmodi casibus, siue manu siue medicamentis agetur, dari debet humidus, potio liberalis, diuq; aqua: ubi iam caro increfcit, tum demum & balneis raris vtendum erit, & cibus corpus implentibus.

De Telis è corpore extrahendis.

Tela quoque quæ illata corporibus intus hæserunt, magno negotio sæpe eijciuntur. Suntq; quædã difficultates ex generibus eorum, quædam ex his sedibus, in quibus illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte qua venit, aut ab ea in quam tetendit. Illic viam qua redeat, ipsum sibi fecit. Hic à scalpello accipit. Nam contra mucronem caro inciditur. Sed si non alte telum insedit, & in summa est, aut certe magnas venas et loca nervosa non transiit, nihil melius est, quàm quàm venit, id euellere. Si verò plus est per quod telo reuertendū, quàm quod perrumpendū est: iamq; venas nervosq; id trāsit, commodius est aperire quod superest, * itaq; extrahere. Nam & propius petitur & tutius euellitur, & in maiore membro si medium mucro transiit, facilius sanescit quod peruium est, quia vtrinq; medicamento fouetur. Sed si retro telum recipiendū est, amplianda scalpello plaga est, quo facilius id sequatur, quoq; minor oriatur inflammatio: quæ maior fit, si ab illo ipso telo dum redit,

*eaq;

dit, corpus laniatur. Itē si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quā ut telo postea transeunte ampliatur. Summa autem utraque parte ita habenda cura est, ne nervus, ne vena maior, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso est, abducendumq; scalpello. Vbi autem satis incisum est, telum eximendū est, tum quoq; eodem modo & eadē cura habita, ne sub eo quod eximetur, aliquid eorum ledatur, quae tuenda esse proposui. Hec communia sunt. Propria quaedā in singulis telorum generibus subiicienda sunt, quae protinus subiiciam. Nihil tam facile in corpore quā sagitta conditur, eademq; altissime insidit. Hec autem eveniunt, & quia magna vi fertur illa, & quia ipsa in angusto est. Sapius itaq; ab altera parte, quā ex qua venit recipienda est, praecipueq; quia fere spiculis cingitur, quae magis laniant, si retro, quā si contra trahuntur. Sed inde aperta via, caro diduci debet ferramento ad similitudinem facto Graecae literae ϕ. Deinde ubi apparuit, si mucro, si arundo inheret, propellenda est, donec ab altera parte adprehendi & extrahi possit. Si iam illa decidit, solumq; intus ferrum est, mucro vel digitis adprehendi, vel forfice, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte qua venit, euelli magis placuit. Nam ampliato vulnere, aut arundo, si inest, euellenda est: aut si ea non est, ferrum ipsum. Qued si spicula apparuerunt, eaq;

c breuia

breuia & tenuia sunt, forfice ibi communi debent, vacuumq; ab his telum educi: si ea maiora valentioraq; sunt, fissis scriptorijs calamis contigenda, ac ne quid lacerent, sic euellenda sunt. Et in sagittis quidem hac observatio est. Latum vero telum si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulnere ipsi quoque ingens vulnus adiciamus. Euellendum est ergo genere quodam ferramenti, quod Diocleum Gracigraphiscum vocant, quoniam autorem Dioclem habet, quem inter priscos maximosq; medicos fuisse iam posui. Lamina vel ferrea vel aenea etiam ab altero capite duos utrinq; deorsum conuersos uncas habet, ab altero duplicata lateribus leuiterq; extrema in eam partem inclinata, quae sinuata est, insuper ibi etiam parte inclinata, quae perforata est. Hec iuxta telum transversa demittitur. Deinde ubi ad inum mucronem ventum est, paulum torquetur, ut telum foramine suo excipiat. Cum in cauo mucro est, ilico duo digiti subiecti partis alterius uncis, simul & ferramentum id extrahunt & telum. Tertium genus telorum est, quod interdum euelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod perrupta cute, integrum intus insedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idq; quod inest, ea qua venit, forfice extrahendum est. Accedit vero aliquid difficultatis sub omni ictu, si telum vel ossi inhaesit, vel in articulo se inter duo ossa demersit, in osse usq; eo mouendum

mouendum est, donec is locus laxetur, qui mucronem momordit, & tum vel manu vel forfice telum extrahendum est, quæ ratio in dentibus quoq; eiiciendis est. Et vix unquã ita telum non sequitur. Sed si morabitur, excuti quoq; ictum aliquo ferramẽto poterit. Vltimum est, vbi non euellitur, terebra iuxta forare, ab eo quoq; foramine ad speciẽ literæ & contra telũ os excidere, sic vt lineæ quæ deducuntur ad telum spectent, eo facto id necesse est labet, et facile auferatur. Inter duo verò ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenis ne deligãda, & per has in diuersas partes diducenda sunt, vt nervos distendat. Quibus extẽtis laxius inter ossa spatiũ est, vt sine difficultate telũ recipiatur. Illud videndum est, sicut in alijs locis posui, ne quis neruus, aut vena, aut arteria à telo ledatur, dum id extrahitur, eadem scilicet ratione quæ supra posita est. At si venenato quoq; telo quis ictus est, iisdem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis adiicienda curatio est, quæ vel epoto veneno, vel a serpente ictis adhibetur. Vulneris autẽ ipsius extracto telo medicina nõ alia est, quàm quæ esset, si corpore icto nihil inhaesisset. De qua satis alio loco dictum est.

De Gangliis, & Meliceride, & Atheromate, & Steatomate capitis tuberculis. C A P. VI.

HAec venire in qualibet parte corporis possunt. Reliqua certas sedes habent, de quibus dicam, orsus à capite. In hoc multa variaq;

riaq; tubercula oriuntur, γάρλια, μελιγκίδας,
 & ἀθερώματα nominant, alijsq; etiamnum vo-
 cabulis quædam alijs discernunt, quibus ego σεα-
 τώματα quoque adijciam. Quæ quamuis & in
 ceruice et in alis & in lateribus oriri solent, per
 se tamē non posui, cum omnia ista mediocres dif-
 ferentias habeant, ac neq; periculo terreant, neq;
 diuerso genere curentur. Omnia autem ista &
 ex paruulo incipiunt, & diu paulatimq; incre-
 scunt, & tunica sua includuntur. Quædā ex his
 dura ac renitentia, quædam mollia cedentiaq;
 sunt: quædam spatio nudantur, quædam tecta ca-
 pillis suo permanent, fereq; sine dolore sunt. Quid
 intus habeant, vt coniectura præ sagiri potest, sic
 ex toto cognosci, nisi cum eiecta sunt, non potest.
 Maxime tamen in his quæ renitentur, aut lapil-
 lis quædam similia, aut cōcreti confertiq; pili re-
 periuntur. In his verò quæ cedunt, aut melli si-
 mile aliquid, aut tenui pulticula, aut quasi rase
 cartilagini, aut carni hebeti, & cruenta, qui-
 bus aliqui colores esse consuerunt, fereq; gan-
 glia renitentur. Atheromati subest, quasi tenuis
 pulticula. Meliceridi liquidior humor, ideoq;
 pressum circumfluit. Steatomati pingue quid-
 dam, idq; latissime patere consuevit, resoluitq;
 totam cutem superpositam, sic, vt ea labet, cum
 in cæteris sit adstrictior. Omnia derafa antè, si ca-
 pillis conteguntur, per medium oportet incidere:
 sed steatomatis tunica quoq; secāda est, vt effun-
 datur quicquid intus coit: quia nō facile à cute,
 subiecta

subiecta carne, ea separetur, in ceteris ipsa tunica inuiolata seruanda est. Protinus autem alba & intenta se ostendit. Tum scalpelli manubriolo diducenda à cute & à carne est, eijciendaq; cum eo quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicae musculus inhaesit, ne is laedatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Vbi tota exempta est, committendae orae, fibulaq; his inijcienda, & super medicamentum glutinans dandum est. Vbi vel tota tunica, vel aliquid ex ea relictum est, pus mouentia adhibenda sunt.

De oculorum vitis quæ scalpello & manu curantur.

CAP. VII.

Sed ut hæc neq; genere vitæ neq; ratione curationis inter se multum distat, sic in oculis, quæ manum postulant, & ipsa diuersa sunt, & aliter aliterq; curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicae nasci solent pingues grauesq;, quæ vix attollere oculos sinunt, leuesq; pituitæ cursus, sed assiduos in oculis mouent. Fere verò in pueris nascuntur. Oportet compresso digitis duobus oculo, atq; ita cute intecta, scapello transversam linea incidere, suspensa leuiter manu, ne vesica ipsa vulneretur, & ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpat, tum digitis eam apprehendere oportet, & euellere. Facile autem sequitur. Dein superungi collyrio debet ex his aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur, paucissimisq; diebus cicatricula inducitur. Mole-

C 3

stius

stius est, ubi incisa vesica est. Effundit enim humorem, neq; postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quæ puri mouendo sunt.

De Crite tuberculo palpebrarum.

IN eadem palpebra super pilorum locum, tuberculum paruulum nascitur, quod à similitudine ordeï, à Græcis *ἰκθὺς* nominatur. Tunica quiddam quod difficulter maturescit, comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foueri oportet, sic ne nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur. Hac enim ratione sepe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello diuidi debet, & quicquid intus humoris est exprimi. Eodem deinde vapore postea quoq; foueri, & superinungi, donec ad sanitatem perueniat.

De Chalazio palpebrarum.

ALia quoq; quadam in palpebris huic non dissimilia nascuntur, sed neq; utiq; figure eiusdem, & mobilia simul atque digito huc vel illuc impelluntur. Ideoq; ea *χαλᾶζια* vocant. Hæc incidi debent, si sub cute sunt, ab exteriori parte: si sub cartilagine, ab interiori. Dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. Ac si intus plaga est, mungendum primo lenibus, deinde acrioribus. Si extrâ, superdandum emplastrum, quo id glutinetur.

De vngue oculorum, quod *πλῆγμα*
Græcis vocatur.

Vnguis

VNguis verò, quod pterygion Greci vocant, est membranula nervosa oriens ab angulo, quæ nonnunquã ad pupillam quoq; pervenit, eiq; afficit. Sæpius à nariû, interdû etiam à temporum parte nascitur. Hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur. Si inueteravit, iãq; ei crassitudo quoq; accessit, excidi debet. Post abstinentiam verò unius diei, vel aduersus in sedili contra medicum is homo collocandus est, vel sic auersus, ut in gremium eius caput resupinus effundat. Quidam si in sinistro oculo vitium est, aduersum: si in dextro resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram à ministro diduci oportet, alteram à medico. Sed ab hoc, si ille aduersus est, inferiorem: si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum paulum mucrone intus recurvato subijcere extremo vngui debet, eumq; infigere, atq; eã quoq; palpebrã tradere alteri, ipse hamulo apprehenso levare vnguem, eũq; acu trajicere linum trahente. Deinde acum ponere, lini duo capita apprehendere, & per ea erecto vngue, si qua parte oculo inheret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat. Deinde, inuicem modo remittere, modo attrahere, ut sic & initium eius, & finis anguli reperiatur. Duplex enim periculum est, ne vel ex vngue aliquid relinquatur, quod exulceratum vix ullam recipiat curationem, vel ex angulo quoq; caruncula abscindatur,

tur, quæ si vehementius unguis ducitur, sequitur.
 Ideoq; decipit: ac si abscissa est, patescit foramen,
 * ῥυπαῖδα per quod postea semper humor descēdit, * ῥυαῖδα
 Græci vocant. Verus ergo anguli finis utiq; no-
 scendus est, qui ubi satis constitit, non nimis ad-
 ducto ungue scalpellus adhibendus est, deinde
 excidenda ea membranula, ne quid ex angulo
 ledatur. Eo deinde ex melle linamentum super-
 dandum est, supraq; linteolum & aut spongia,
 aut lana succida, proximisq; diebus diducendus
 quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpe-
 bræ glutinentur. Siquidem id quoq; tertium pe-
 riculum accedit, eodemq; modo linamētum im-
 ponendum, ac nouissime inungendum collyrio,
 quo vlcera ad cicatricem perducuntur. Sed ea cu-
 ratio * vera ratio * vere esse debet, aut certe ante hyemem.
 De qua re ad plura loca pertinente semel dixis-
 se satis erit. Nam duo genera curationum sunt.
 Alia in quibus eligere tēpus non licet, sed uten-
 dum est eo, quod incidit, sicut in vulneribus, &
 in fistulis. Alia in quibus nullus dies vrget, &
 expectare tutissimū & facile est, sicut euenit in
 ijs, quæ & tarde increscunt, & dolore non cru-
 ciant, in his ver expectādū est. Aut si quid ma-
 gis pressit, melior tamē autūnus vel æstas, quā
 hyems est. Atq; is ipse medius, iā fractis æstati-
 bus, nōdū ortis frigoribus. Quo magis aut neces-
 saria pars erit, quæ tractabitur, hoc quoq; ma-
 iori periculo subiecta est, et sæpe quo maior pla-
 ga faciēda, eo magis hæc tēporis ratio seruabit.

De

De Encanthide, tuberculo.

EX curatione verò vnguis, ut dixi, vitia nascuntur, quæ ipsa alijs quoq; de causis oriri solent. Interdum enim fit in angulo, parum vngue exciso, vel aliter tuberculū, quod palpebris parum diduci patitur, ἐγκανθὶς Græce nominatur. Excidi hamulo & circuncidi debet, hinc quoq; diligenter temperata manu, ne quid ex ipso abscindat. Tum exiguum linamentum respergendum est, vel cadmia, vel atramento sutorio, inq; eum angulum diductis palpebris inferendum, supraq; eodē modo deligandum, proximisq; diebus similiter nutriendum, tantum ut primus aqua egelida, vel etiam frigida foveatur.

De Ancyloblepharo oculorum vitio.

Interdum inter se palpebræ coalescunt, apeririq; non potest oculus. Cui malo solet etiam illud accedere, ut palpebræ cum albo oculi cohaerescant: scilicet cum in utroq; fuit vlcus negliger curatum. Sanescendo enim quod diduci potuit & debuit, glutinabit, ἀγκυλοβλέφαρον sub utroq; vitio Græci vocant. Palpebræ tātum inter se coherentes, non difficulter diducuntur, sed interdum frustra, nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet, quia bene res sæpius cedit. Igitur aduersum specillum inferendum, diducendaq; eo palpebræ sunt, deinde exigua penicilla interponēda, donec exulceratio eius loci finiatur. Aut ubi albo ipsius oculi palpebra inhaesit, Heraclides Tarentinus autor est, aduerso scalpello

c s pello

pello subsecare magna cum moderatione, ut neq;
ex oculo, neq; ex palpebra quicquā abscindatur:
ac si necesse est, ex palpebra potius. Post hæc in-
ungatur oculus medicamentis, quibus asperitudo
curatur, quotidieq; palpebra vertatur, non solū
ut ulceri medicamentū inducatur, sed etiam ne
rursus inhereat, ipsiq; etiam præcipiatur, ut sæ-
pe eam duobus digitis attollat. Ego sic restitutum
esse neminē memini. Megeſ se quoq; multa ten-
tasse, neq; vnquam profuisse, quia semper iterum
oculo palpebra inhæserit, memoriæ prodit.

De Aegilopa, fistula oculorum.

ETiamnum in angulo, qui naribus propior
est, ex aliquo vitio quasi parua fistula a-
peritur, per quam pituita adsidue distillat, αἰγί-
δοπα Græci vocāt, idq; assidue male habet ocu-
lum, nōnunquam etiam exeso osse vsq; ad nares
penetrat, idq; interdum naturam carcinomatis
habet. Vbi intēta venæ & recuruatæ sunt, color
pallet, cutis dura est, & leui tactu irritatur, in-
flammationēq; in eas partes, quæ cōiunctæ sunt,
euocat. Ex his eos qui quasi carcinoma habent,
curare periculosum est. Nā mortem quoq; ea res
maturat. Ea verò quibus ad nares tendit, super-
uacui: neq; enim sanescunt. At quibus id in an-
* eo, ne gulo est, potest adhiberi curatio, cum*eam non
ignotum sit esse difficilem, quantoq; angulo pro-
pius id foramen est, tātō difficilior est, quoniam
perangustum est in quo versari manus possit.
Recenti tamē re mederi facilius est. Sed hamulo
summ

summum eius foraminis excipiendum, deinde totum id cauum, sicut in fistulis dixi, usque ad os excidendum, oculoque et ceteris iunctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum est vehementius. Quod si iam carie vexatum est, quo crassior his squama accedat, quidam adurentia imponunt, ut atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel æruginem rasam. Quod et tardius et non idem facit. Osse adusto curatio sequitur eadem, quæ in ceteris vstis.

De Pilis palpebrarum oculum irritantibus.

Plli verò qui in palpebris sunt, duabus de causis oculum irritare consuerunt. Nam modo palpebræ superioris summa cutis relaxatur, et procidit: quo fit, ut eius pili ad ipsum oculum conuertantur, quia non simul cartilago quoque se remisit. Modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes verò hæc sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem hastæ lata, in igne coniungenda est. Deinde candens sublata palpebra sic, ut eius perniciosi pili in conspectu curantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus ab angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebræ transuat. Deinde iterum tertioque usque ad alterum angulum. Quo fit, ut omnes pilorum radices adustæ emoriantur. Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat, atque ubi crustæ exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facillime
autem

autem id genus sanescit: quidā aiunt acu transui
iuxta pilos in exteriorē partem palpebræ opor-
tere, eāq; transmitti duplicē capillū muliebrem
ducentem: atq; vbi acus transiit, in ipsius capilli
sinum, quā duplicatur, pilū esse injiciendum, &
per eum in superiorē palpebræ partem attrahen-
dum, ibiq; corpori adglutinandū & imponendū
medicamētum, quo foramen quoq; glutinetur: sic
enim fore, vt is pilus in exteriorē partem postea
spectet. Id primū fieri non potest, nisi in pilo lon-
giore, cum fere breues eo loco nascantur. Deinde
si plures pili sunt, necesse est longū tormentum,
cum toties acus transiit, magnam inflammatio-
nem moueat. Nouissime cum humor aliquis ibi
subsit, oculo & antè per pilos, & tum per pal-
pebræ foramina affecto, vix fieri potest, vt glu-
ten, quo vinctus est pilus, non resoluitur. Eoq;
fit, vt is eò vnde vi abductus est, redeat. Ea verò
curatio, quæ palpebræ laxioris ab omnibus fre-
quentatur, nihil habet dubij. Siquidem oportet
contecto oculo mediā palpebræ cutem, siue ea su-
perior, siue inferior est, apprehendere digitis, ac
leuare, tum considerare quantulo detracto futu-
rum sit, vt naturaliter se habeat. Siquidem hic
quoq; duo pericula circūstant: si nimium fuerit
excisum, ne contegi oculus non possit: si parum,
ne nihil actum sit, & frustra sectus aliquis sit.
Quā deinde incidendum videbitur per duas li-
neas atramento notandū est, sic vt de interiore
quæ pilos continet, & propiore ei linea aliquid
relinq

reliquatur, quod apprehendere acus postea possit. His constitutis scalpellus adhibendus est, & si superior palpebra est, antè: si inferior, postea propius ipsis pilis incidendum, initiumq; faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo qui temporibus: in dextro, ab eo qui naribus propior est, idq; quod inter duas lineas est, excidendum. Deinde ora vulneris inter se simplici sutura committenda, operiendusq; oculus est: & si parum palpebra descendet, laxanda utiq;: si nimium, aut astringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda. Vbi secta est, alia sutura adijcienda, quæ supra tres esse non debent. Præter hæc in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent. Idq; si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, spōgia ex aqua frigida expressa super deliganda est. Postero die glutinans emplastrum inijciendum. Quarto sutura tollenda est, & collyrio quod inflammationes reprimat, superinungendum.

De Lagophthalmo oculorum.

Nonnunquam autem nimium sub hac curatione excisa cute evenit, ut oculus non contegatur. Idq; interdum etiā alia de causa fit, λαγώφθαλμος Græci appellant. In quo si nimium palpebræ deest, nulla id restituere curatio potest. Si exiguum, mederi licet, paulum infra supercilium cutis incidenda est lunata figura, cornibus

nibus eius deorsum spectantibus. Altitudo esse plagæ usq; ad cartilaginē debet, ipsa illa nihil læsa. Nam si ea incisa est, palpebra cōcidit, neq; attolli postea potest. Cute igitur tantum diducta sit, ut paulum in ima oculi ora descendat, hianti scilicet sup̄er plagā, in quā linamentū conijciendum est, quod & cōiungi diductam cutē prohibeat, et in medio carunculam citet: quæ ubi eum locum impleuit, postea rectē oculus operitur.

De Ectropio.

VT superioris autem palpebræ vitium est, quod parum descendit, ideoq; oculum non contegit, sic inferioris, quod parū sursum attollitur, sed pendet & hiat, neq; potest cum superiore committi. Atq; id quoq; euenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute, ἐκτροπία Graci vocant. Si ex mala curatione est, eadem ratio medicinae est, quæ sup̄a posita est, plagæ tantum cornua ad maxillas, non ad oculum conuertenda sunt. Si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum, & quarto die vapore aquæ calidæ fouendum inungendumq; medicamentis ad cicatricem perducentibus.

De Staphylomate oculi.

HAec fere circa oculum in angulis palpebrisq; incidere cōsueuerunt. In ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica, siue ruptis intus membranis aliquibus, siue laxatis, & similis figura acino fit. Vnde id σταφύλωμα Graci

Græci vocant. Curatio duplex est. Altera ad ipsas radices per medium transuere acu duo lina ducente. Deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex interiore astringere inter se, quæ paulatim secando id excidunt. Altera in summa parte eius ad lenticulæ magnitudinem excidere, deinde spodium aut cadmiam infricare. Vtrobilibet autem facto, album oui lana excipiendum & imponendum, posteaq; vapore aquæ calidæ fouendus oculus, & lenibus medicamentis vngendus est.

De Clauis oculorum.

Clavi autem vocantur callosa in albo oculi tubercula, quibus nomen à figuræ similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraq; eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

De natura oculorum, & eorum suffusione.

Suffusionis iam aliàs feci mentionē, quia cum recēs incidit, medicamentis quoq; sæpe discutitur. Sed vbi vetustior facta est, manus curationem desiderat, quæ inter subtilissimas haberi potest. De qua antequā dico, paucis ipsius oculi natura indicanda est. Cuius cognitio, cū ad plura loca pertineat, tum vel præcipuè ad hunc pertinet. Is igitur summus habet duas tunicas, ex quibus superior à Græcis *negaxiosidus* vocatur. Ea qua parte alba est, satis crassa, pupillæ loco extenuatur. Huic inferior adiuncta est media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circa

circa tenuis, vltioribus partibus ipsa quoque
 *χεροειδης plenior, quae *εραγοειδης à Gracis nominatur. Haec
 duae tunicae cum interiora oculi cingant, rursus
 sub his coeunt, extenuataeque, & in vnum coactae,
 per foramen, quod inter ossa est, ad membranam
 cerebri perueniunt, eiisque inhaerescunt. Sub his au-
 tem qua parte pupilla est, locus vacuus est. De-
 inde infra rursus tenuissima tunica quam Hero-
 philus εραχνοειδης nominauit. Ea media subsi-
 dit, coque cauo continet quiddam, quod à vitri simi-
 litudine υαροειδης Graci vocant. Id neque liqui-
 dum, neque aridum est, sed quasi coactus humor, ex
 cuius colore pupillae color vel niger est, vel ca-
 sius, cum summa tunica tota alba sit. Id autem super-
 ueniens ab interiore parte membrana includit,
 sub huius gutta humoris est, oui albo similis, à qua
 videndi facultas proficiscitur, χυσαροειδης à
 Gracis nominatur. Igitur vel ex morbo vel ex
 ictu coe crescit humor sub duabus tunicis, quae lo-
 cum vacuum esse proposui: isque paulatim indu-
 rescens interiori potestati se opponit. Vtque eius
 plures species sunt, quaedam sanabiles, quaedam
 quae curationem non admittunt. Nam si exigua
 suffusio est, si immixtilis, colore verò habet ma-
 rinae aquae, vel ferri nitentis, & à latere sensum
 aliquem fulgoris relinquit, spes superest. Si ma-
 gna est, si nigra pars oculi amissa naturali figu-
 ra in aliam vertit, si suffusioni color caruleus est,
 aut auro similis, si labat, & haec atque illae mo-
 uetur, vix unquam succurritur. Fere verò peior
 est,

est, quo ex grauiore morbo, maioribus'ue capitis doloribus, vel ictu vehementiore orta est. Neq; idonea curatio, si senilis ætas est, quæ sine nouo vitio tamen aciem hebetem habet. At ne puerilis quidem, sed inter hæc media ætas. Oculus quoque curationi neq; exiguus, neque concauus satis opportunus est, atq; ipsius suffusionis quædam maturitas est. Expectandum igitur est donec iam non fluere, sed durties quædam concreuisse videatur. Ante curationem autem modico cibo vti, bibere aquam triduo debet, pridie ab omnibus abstinere. Post hæc in aduerso sedili collocandus est loco lucido, lumine aduerso, sic ut contrà medicus paulo altius sedeat. A posteriore autem parte caput eius, qui curabitur, minister contineat, & immobile id præstet. Nam leui motu eripi acies in perpetuum potest. Quin etiam ipse oculus qui curabitur, immobilior faciendus est, super alterũ lana imposita & deligata. Curari verò sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus admonenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaq; demittenda. Sed recta est per summam duas tunicas medio loco inter nigrũ oculi et angulum temporis propiorẽ è regione mediæ suffusionis, sic ne qua vena ladata. Neq; tamen timide demittenda est, quia mani loco excipitur. Ad quem cum ventũ est, ne mediocriter quidẽ peritus falli potest, quia prementi nihil renititur. Vbi eo ventum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionẽ est. Leuiterq;

D ibi

ibi uerti & paulatim eam deducere infra regionem pupillæ debet: ubi deinde eam transit, vehementius imprimi ut inferiori parti insidat. Si hæsit, curatio expleta est. Si subinde redit, eadē acus magis cōcideda, et in plures partes dissipāda est, quæ singulæ & facilius cōduntur, et minus late efficiunt. Post hæc educēda acus recta est, imponendumq; est lana molli exceptū oui album, & supra, quod inflammationē coërceat, atq; ita deuinciendū. Post hæc opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorū inunctionibus, cibo, qui postero die satis mature datur, primū liquido ne maxillæ laborent, deinde inflammatione finita, tali, qualis in vulneribus propositus est. Quibus ut aqua quoq; diutius bibatur, necessario accedit.

De Pituita oculorum.

DE pituitæ quoque tenuis cursu, qui oculos infestat, quatenus medicamētis agendum est, iam explicui. Nunc ad ea veniam, quæ curationem ex manu postulant. Animaduertimus autē quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere, quæ res aspritudinem continuat, ex leuibus momentis inflammationes & lippitudines excitat, totam deniq; vitam hominis infestat. Idq; in quibusdam nulla ope adiuuari potest, in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen est, nosse oportet, ut alteri succurratur, alteri manus non iniiciatur. Ac primum superuacua curatio est in his qui ab infantibus id vitium habent, quia necessario man-
surum

surum est vsq; mortis diem. Deinde non necessario etiam in his, quibus non multa, sed acris pituita est. Si quidē manu nihil adiuuantur, medicamentis, & victus ratione, quæ crassiorē pituitam reddit, ad sanitatē perueniunt. Lata etiam capita vix medicinæ patent. Tum interest venæ pituitam emittant, quæ inter caluariam & cutē sunt, an quæ inter membranā cerebri, & caluariam. Superiores ferè per tēpora oculos rigant, inferiores per eas membranas, quæ ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium his, quæ supra os fluunt, non potest his, quæ sub osse. Ac ne his quidem succurritur, quibus pituita vtrinq; descendit, quia leuata altera parte, nihilominus altera infestat. Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, à supercilijs vsq; ad verticem illini debent. Si sicci oculi esse cæperunt, apparet per eas venas, quæ sub cute sunt, irrigari. Si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere. Si est humor, sed leuior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venæ exerceant, ideoq; pluribus etiam opitulari licet. Idq; non in Græcia tantummodo, sed in alijs quoque gentibus celebre est, adeo vt nulla medicina pars magis per nationes quoque exposita sit. Reperti in Græcia sunt, qui nouem lineis cutem capitis inciderent, duabus in occipitio rectis, vna super eas transversa, dein duabus

D 2 bus

bus super aures, una inter eas item transversa, tribus inter verticem & frontem rectis. Reperti sunt, qui à capite recte eas lineas ad tempora diduceret, cognitisq; ex motu maxillarum musculorum initis, leuiter super eos cutem inciderent, inductisq; per retusos hamos oris infererent linamenta, ut neq; inter se cutis antiqui fines committerentur, & in medio caro incresceret, qua venis ex quibus humor ad oculos transiret, astringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt à media aure ad mediam alteram aurem, deinde à naribus ad verticem. Tum ubi lineae committebantur, scalpello inciderunt, & post sanguine fuso, os ibidem adusserunt. Nihilominus autem & in temporibus, & inter frontem atq; caluariam eminentibus venis idem candens ferrum admouerunt. Frequens curatio est, venis in temporibus adurere, quae fere quidem in eiusmodi malo tument, sed tamen ut inflentur magisq; se ostendant, ceruix antè modice deliganda est: tenuibusq; ferramentis, & retusis uenae adurendae, donec in oculis pituita cursus conquiescat. Id enim signum est quasi ex cactorum itinerum, per quae humor ferebatur. Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditaeq; venae, ideoq; legi non possunt. Eodem modo ceruice deligata, retentoq; ab ipso spiritu, quo magis venae prodeant, atramento notare eas contra tempora & inter ceruicem, ac frontem, deinde ceruice resoluta, quae nota sunt, venas incidere, & sanguinem mittere.

Vbi

Vbi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere. Contra tempora quidem, timide, ne subiecti musculi, qui maxillis tenent, sentiant: inter frontem verò & verticem, vehementer, vt sic squama ab osse recedat. Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem vsque ad os adurunt, sic vt squamam remittat. Sed nihil melius est, quàm quod in Gallia quoq; Comata fit, vbi venis in temporibus & in superiore capitis parte legunt. Aduſta quemodo curanda ſint, iam explicui. Nunc illud adiſcio, neq; vt cruſta decidant, neq; vt vlcus impleatur aduſtis venis eſſe properandum, ne uel ſanguis erumpat, uel citopius ſupprimatur, cum per hoc ſicceſcere eas partes opus ſit, per illud exhauriri opus non ſit. Si quando tamē ſanguis eruperit, inſtricanda medicamenta eſſe, quæ ſic ſanguinem ſupprimant, ne adurant. Quemadmodum autem venæ deligendæ ſint, quidq; lectis his faciendum ſit, cum venero ad crurum varices, dicam.

De aurium morbis, qui manu & ſcalpello curantur.

CAP. VIII.

Verum vt oculi multiplicē curationē, etiam manus exigunt: ſic in auribus admodum pauca ſunt, quæ in hac medicina parte tractentur. Solet tamen euenire vel à prima natali die protinus, vel poſtea facta exulceratione per cicatricem aure repleta, vt foramen in ea nullum ſit, ideoq; audiendi uſu careat. Quod vbi incidit, ſpecillo tentandum eſt, alte'ne id repletum,

D 3 an

an in summo tantum glutinatum sit. Nam si altè est, prementi non cedit: si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet, ne sine effectus spe distentio oriatur nervorum, & ex ea mortis periculum sit. Hoc facile curatur. Nam quia cauum esse debet, vel medicamentum aliquod imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumq; id patefactum, & iam vlcus purum est, iniicienda eò pinna est, illita medicamento cicatricè inducente: circaq; idem medicamentum dandum, vt cutis circa pinnam sanescat: quo fit vt ea remota, postea facultas audiendi sit. At vbi aures, in viro puta, perforatae sunt, & offendunt, traicere id cauum celeriter candente acu satis, vt leniter eius ora exulcerentur, aut etiam adurente medicamento idem exulcerare, postea deinde imponere id quod purget, tum quod eum locum repleat, & sic cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est (sicut solet esse in his, qui maiora pondera auribus gesserunt) incidere quod superest ad extremum oportet: supra deinde oras scalpello exulcerare, & postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire: quæ res cum in labris quoq; & naribus fieri possit, eandem etiam rationem habeat, simul explicanda est.

Curta in auribus, labrisq; ac naribus, quomodo
sarciri, & curari possint.

CAP. IX.

Curta

Curta igitur in his tribus, ac si qua parua
 paria sunt, curari possunt. Si qua maiora
 sunt, aut non recipiunt curationem, aut ita per hanc
 ipsam deformantur, ut minus indecora antè fue-
 rint. Atque in aure quidem & naribus deformi-
 tas sola timeri potest. In labris verò si nimium
 contracta sunt, usus quoque necessarius iactura fit,
 quia minus facile & cibus assumitur, & sermo
 explicatur. Neque enim creatur ibi corpus, sed ex
 vicino adducitur: quod in leui mutatione, &
 nihil eripere, & fallere oculum potest: in magna
 non potest. Neque senile autem corpus, neque quod
 mali habitus est, neque in quo difficulter ulcera
 sanescunt, huic medicine idoneum est, quia nus-
 quam celerius cancer occupat, aut difficiliter tol-
 litur. Ratio curationis eiusmodi est. Id quod cu-
 ratum est, in quadratum redigere, ab interioribus
 eius angulis lineas transversas incidere, quæ ci-
 teriorem partem ab ulteriore ex toto diducant:
 deinde ea quæ sic*reposuimus, in unum adducere. *resolui-
 Si non satis iunguntur, ultra lineas, quæ antè mus
 fecimus alias duas lunatas, & ad plagam con-
 uersas immittere, quibus summa tantum cutis di-
 ducatur. Sic enim fit, ut facilius quod adducitur,
 sequi possit: quod non vi cogendum est, sed ita
 adducendum, ut ex facili subsequatur, & *di- *demissum
 missum non multum recedat. Interdum autem ab
 altera parte cutis haud omnino adducta, defor-
 mem quem reliquit locum, reddit. Huiusmodi lo-
 ci altera pars incidenda, altera intacta habenda
 D 4 est.

est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex medio naso imis venarum partibus, neque ex angulis labrorum quicquam attrahere tentabimus. Vtrinque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut medijs naribus, aut medijs labris deerit. Quae tamen interdum etiam duobus locis curata esse consuerunt. Sed eadem ratio curandi est, si cartilago in eo quod incisum est eminet, excide da est. Neq; enim aut glutinatur, aut acutò traicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas oras liberae cutis, utrinque coitus puris fieri possit. Tum iunctae orae inter se suendae sunt, utrinque cute apprehensa, & quae priores lineae sunt, ea quoque suturae iniiciendae sunt. Siccis locis, ut in naribus, illita spuma argenti satis proficit. In vltiores vero lunatasq; plagas linamentum dandum est, ut caro increescens vulnus impleat, summaq; cura quod ita sutum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fouendum erit uapore aquae calidae, rursusq; idem medicamentum iniiciendum, fereq; septimo die glutinatum est. Tum suturae eximi, & vlcus ad sanitatem perducere debent.

De Polypi curatione per ferrum. CAP. X.

Polypum uero, qui in naribus nascitur, praecipue ferro curari iam alias posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto in modum spatulae facto resolvere ab osse oportet: adhibita diligentia

tia, ne infra cartilago ledatur, in qua difficilis curatio est. Vbi abscissus est, vnco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoq; nares leniter implende. Sanguine suppresso, linamento vulnus purgandum est. Vbi purum est, eò pinna eodem modo, quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

De Ozæna.

CAP. XI.

ID autem vitium, quod ὀζαίνα à Græcis vocatur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurgos non reperi. Credo, quia res raro ad sanitatem satis proficit, cum aliquod in ipsa curatione tormentū habeat. Apud quosdam tamen positū est vel sutilem fistulam, vel enodem scriptorium calami in narem esse coniiciendum, donec sursum ad os perueniat: tum per id tenue ferramentū candens dandum esse ad ipsum os, deinde adustum locū purgandum esse æruginē & melle. Vbi purus est, lycio ad sanitatē perducendū. Vel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut & conspicilocus possit, & facilius candens ferramentū admoueri. Tum sui narem debere, & adustum quidē ulcus eadē ratione curari. Sutura vero illi uel spuma argēti, vel alio glutinante.

De oris vitijs, quæ manu & ferro curantur.

CAP. XII.

D 5 De

IN ore quoq; quædam manu curantur. Vbi in primis dentes nonnunquam mouentur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingiuarū arefcentium uitium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingiuis admouere, ut leuiter attingat, non ut incidat. Adusta gingiua melle illinenda, & mulso eluenda sunt. Et pura vlcera esse cœperunt, arida medicamenta infricanda sunt ex his quæ reprimunt. Si verò dens dolores mouet, eximiq; eum, quia medicamenta nihil adiunant, placuit, circumradi debet, ut gingiua ab eo resoluator. Tum is concutiendus est. Eaq; facienda, donec bene moueatur. Nam dens hæres cum summo periculo euellitur, ac nonnunquam maxilla loco mouetur. Idq; etiam maiore periculo in superioribus dentibus fit, quia potest tempora oculos uel concutere. Tum si fieri potest manu, si minus, forfice, dens excipiendus est. Ac si exesus est, antè id foramen vel linamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forfice confringatur. Recta verò forfex ducenda est, ne inflexis radicibus os earum, cui dens inheret, parte aliqua frangatur. Neq; ideo nullum eius rei periculum est, utique in dentibus breuibus, qui ferè longiores radices habent. Sæpe enim forfex cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingiua prehēdit & frangit. Propterea autem ubi plus sanguinis profluit, scire licet,

licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo
conquirenda est testa, quæ recessit, & volsella
protrahenda est. Si non sequitur, incidi gingiua
debet, donec labans ossis testa recipiatur. Quod si
fractum statim non est, indurefcit extrinsecus
maxilla, ut is hiare non possit. Sed imponendum
calidum ex farina & fico cataplasma est, donec
ibi pus moueatur. Tum incidi gingiua debet.
Pus quoq; multum profluens, ossis fracti nota est.
Itaq; etiam tum id extrahi conuenit. Nonnun-
quam etiam eo laso, fistula fit, quæ eradi debet.
Dens autem scaber, qua parte niger est, raden-
dus est, illinendusq; rosæ flore contrito, cui gal-
le quarta pars, & altera myrrhæ sit adiecta.
Continendumq; ore crebro vinum meraciû. Atq;
in eo casu velandum caput, ambulatione multa,
frictione capitis, cibo non acri utendum est. At
si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, au-
ro cum his qui bene herent vinciendi sunt. Con-
tinendaq; ore reprimentia, ut vinum in quo ma-
licorium decoctum, aut in quo galla candens con-
iecta sit. Si quando etiam in pueris alter dens
nascitur quàm prior excidat, is qui cadere de-
buit, circum purgandus & euellendus est, is qui
natus est in locum prioris quotidie digito adur-
gendus, donec ad iustam magnitudinem perue-
niat. Quotiescunq; dente exempto radix relicta
est, protinus ea quoq; ad id facta forfice, quâ rhi-
zan Græci vocant, eximenda est. Tonsillas autem,
quæ post inflammationes induruerunt, ærtiades
autem

autem à Græcis appellantur, cum sub leui tunica sint, oportet digito circūradere & euellere: si ne sic quidem resoluuntur, hamulo excipere, & scalpello excidere, tum vlcus aceto eluere, et illinere vulnus medicamento, quo sanguis supprimatur.

De Vua

Vasi cum inflāmatione descendit, dolori q̄; est & subrubicundi coloris, præcidi sine periculo non potest. Solet enim multum sanguinē effundere. Itaq; melius est his vti, quæ aliās proposita sunt. Si verò inflammatio quidē nulla est, nihilominus autem ea vltra iustum modū à pituita deducta est, & est tenuis, acuta, alba, præcidi debet. Item q̄; si ima, liuida, & crassa, summa, tenuis est. Neq; quicquā cōmodius est, quā vossella prehendere, sub ea q̄; quod volumus excidere. Neq; enim vllum periculum est, ne plus minus'ue præcidatur, cum liceat tantum infra vossellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est, id q̄; præcidere quo longior vua est, quā esse naturaliter debet. Post curationē eadē facienda sunt, quæ in tonsillis proxime posui.

De Lingua.

Lingua verò quibusdā cum subiecta parte à primo natali die iuncta est, qui ob id ne loqui quidē possunt. Horum extrema lingua vossella prehendenda est, sub ea q̄; mēbrana incidenda, magna cura habita, ne venæ quæ iuxta sunt, violentur, & profusione sanguinis noceāt. Reliqua curatio vulneri, in prioribus posita est. Et pleriq;

pleriq; quidem ubi confanuerunt, loquuntur. Ego autem cognoui, qui succisa lingua cum abunde super dentes eam premeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. Adeo in medicina etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est, id quod sequi conuenit.

De Abscessu sub lingua.

Sub lingua quoq; interdum aliquid abscedit, quod serè consistit in tunica, doloresq; magnos mouet: quod si exiguum est, incidi semel satis est: si maius, summa cutis usque ad tunicam excidenda est, deinde utrinque oræ hamulis excipiendæ, & tunica vndique circumdata liberanda est: magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua maior vena incidatur.

De Labris.

Labra autem sæpe finduntur, eaq; res habet cum dolore etiam hanc molestiã, quòd sermo prohibetur, qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt, medicamentis curare cõmodius est, quæ ad vlcera oris fiunt. Si verò alius descenderunt, necessarium est tenui ferramento adurere, quod spathe simile quasi transcurrere, non imprimi debet. Postea faciendæ eadem sunt, quæ in auribus adustis exposita sunt.

De Cruentis vitis, & curatione. CAP. XIII.

At in ceruice inter cutem et asperam arteriam tumor increfcit, ῥγογχοῦλαρ Græci vocant, qua modo caro hebes, modo humor aliquis

quis melli aquæ'ue similis includitur, interdum etiam minutis ossibus pili immisti. Ex quibus quicquid est, quod tunica continetur, potest adurentibus medicamentis curari, quibus summa cutis cum superiecta tunica * exeritur. Quo facto, siue humor est, profluit: siue quid densius, digitis educitur, tum vlcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio breuior est. Medio tumore una linea inciditur vsq; ad tunicā. Deinde vitiosus sinus ab integro corpore digito separatur, totusq; cum velamento suo eximitur. Tum aceto cui vel salē vel nitrū aliquis adiecit, eluitur, oraq; una sutura iunguntur, cæteraq; eadē quæ in alijs suturis superinſciuntur. Leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur: si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurētia, linamentiq; id curandū est, cæteris prout mouentibus.

De Umbilici vitis.

CAP. XIII.

Sunt etiā circa Umbilicū plura vitia, de quibus propter raritatē inter autores parū constat. Verisimile est autem id à quoq; prætermisum, quod ipse non cognouerat, à nullo id quod non viderat, fictū. Cōmune omnibus est, umbilicum indecore prominere. Causæ requiruntur. Mæges tres has posuit. Modo intestinum eo irrumperet, modo omentum, modo humorem. Sosttratus nihil de omento dixit. Duobus iisdem adiecit, carnem ibi interdum increſcere, eamq; modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoq; omenti mentionem omisit. Sed eadem

tria

tria causatus, spiritum quoque interdum eò dicit
 irrumpere. Hieron omnibus his quatuor positis,
 & omenti mentionem habuit, & eius quod si-
 mul & omentum & intestinum habuerit. Quid
 autem horum sit, his indicij cognoscitur. Vbi in-
 testinum prolapsum est, tumor neque durus, neque
 mollis est, omni frigore comminuitur: non solum
 sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit.
 Sonat interdum, atque ubi resupinatus est aliquis
 delapso intestino ipse desidit. Vbi verò omentum
 est, cetera similia sunt, tumor mollior ab * ima ^{*vna}
 parte, latus extenuatum in ventrem est, si quis
 apprehendit, elabatur. Vbi utrunque est, indicia
 quoque mista sunt, & inter utrunque molities. At
 caro durior est, semperque etiam resupinato corpo-
 re tumet, prementique non cedit, prioribus facile
 cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet,
 quas in carcinomate exposui. Humor autem se
 premitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit,
 sed protinus redit, resupinato quoque corpore tu-
 morem in eadem figura tenet. Ex his id quod ex
 spiritu vitium est, medicinam non admittit. Ca-
 ro quoque carcinomati similis cum periculo tra-
 ctatur. Itaque omittenda est. Sana excidi debet,
 idque vulnus linamentis curari. Humorem quidam
 vel inciso summo tumore effundunt, & vulnus
 iisdem linamentis curant. In reliquis varia sen-
 tentia sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse
 res ipsa testatur, ut in uterum siue intestinum,
 siue omentum est, delabatur. Sinus verò umbi-
 lici

lici tum vacuus à quibusdā duabus regulis exce-
 ptus est, vehementerq; earum capitibus deliga-
 *id vitiū tis, ibi emoritur. A quibusdam^x ad imum acu-
 traieclatur, duo lima ducente, deinde utriusq; li-
 ni duobus capitibus diuersa partes astringitur.
 Quod in vna quoq; oculi fit. Nam sic id quod su-
 pra vinculum est, moritur. Adiecerunt quidā,
 vt antequam vincirent, summum vna linea in-
 ciderēt, exciderentq; quo facilius digito, demi-
 sso, quod illuc irrupisset, depellerent, tum deinde
 uinxerunt. Sed abunde est, iubere spiritū cōtine-
 re, vt tumor quātus maximus esse potest, se osten-
 dat, tum imam basim eius atramento notare, re-
 supinatoq; homine digitis tumorem eum preme-
 re, vt si quid delapsum non est, manu cogatur.
 Posthac umbilicū attrahere, & qua nota atra-
 menti est, lino vehementer astringere. Deinde
 partem superiorem aut medicamentis, aut ferro
 adurere donec emoriatur, atque vt cetera vsta
 vlcus nutrire. Idq; non solum vbi intestini vel
 omentū uel utrūq; est, sed etiam vbi humor est,
 optime proficit. Sed antè quaedam visenda sunt,
 ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curatio
 ni neq; infans, neq; aut robustus annis, aut senex
 aptus est, sed à septimo ferè anno ad quartum-
 decimum. Deinde ei corpus idoneū est id, quod
 integrum est. At quod mali habitus est, quodq;
 papulas, impetigines, similiaq; habet, idoneum
 non est. Lenibus quoq; tumoribus facile subue-
 nitur. At in eorum, qui nimis magni sunt, cura-
 tione

tionem periculum est. Tempus autem anni & autumnale, et hybernium vitandum est. Ver idoneum maxime est. Ac prima æstas non aliena est. Præter hæc abstinere pridie debet. neque id satis est. Sed alius quoque ei ducenda est, quo facilius omnia quæ excesserunt, intra aluum considant.

Quomodo aqua hydropicis emittatur.

CAP. XV.

Aquam his qui hydropici sunt emitti oportere aliàs dixi. Nunc quemadmodum id fiat, dicendum. Quidam autem sub umbilico fere quatuor interpositis digitis à sinistra parte. Quidam ipso umbilico perforato, facere consueverunt. Quidam cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso, quia quod per ignem diuisum est, minus celeriter coit. Ferramentum autem demittitur, magna cura habita, ne qua vena incidatur. Id tale esse debet, ut ferè tertiâ digitipartem latitudo mucronis impleat. Demittendumque ita est, ut membranâ quoque transeat, qua caro ab interiore parte finitur, eò tum plumbea aut anea fistula injicienda est, vel recuruatis in exteriorè partem labri, vel in media circum surgente* quodam nodo, ne tota intus delabi possit, huius ea mora pars quæ intrâ, paulò longior esse debet, quàm quæ extrâ, ut ultra vltiorem membranâ procedat. Per hanc effundendus humor est. Atque ubi maior pars eius euocata est, cludenda demisso linteolo fistula est, & in vulnere, si id uestigio non est, relinquenda. Deinde per insequentes dies

B circa

circa singulas heminas emittendū, donec nullum aquæ vestigiū appareat. Quidā tamen etiā non ista cute protinus fistulā recipiūt, & super vulnus spongiā expressam deligāt. Deinde, postero die rursus fistulā demittunt, quod recens vulnus paulū diductiō patitur, ut si quid humoris superest, emittatur. Idq; bis ita fecisse contenti sunt.

De intestinorum vulneratorum curationibus.

CAP. XVI.

Nonnunquā autem venter ictu aliquo perforatur, sequiturq; ut intestina euoluantur. Quod ubi incidit, protinus considerandū est, an integra ea sint, deinde an his color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatū est, nihil profici posse iam retuli. Latius intestinū sui potest, non quod certa fiducia sit, sed quod dubia spes certa desperatione sit potior. Interdū enim glutinatur. Tum si utrūlibet intestinum lividum, aut pallidum, aut nigrum est, quibus illud quoq; necessario accedit, ut sensu careat, medicina omnis inanis est. Si verò adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est. Memento enim alienātur externo & insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est coxis erectioribus. Et si angustius vulnus est, quā ut intestina commode refundantur, incidendum est donec satis pateat. Ac si iam sicciora intestina sunt, perluenda aqua sunt, cui paulum admodum olei sit adiectum. Tum minister oras vulneris leviter diducere manibus suis, vel etiam duobus hamis

hamis membranae interiori iniectis debet, medicus priora semper intestina quae posteriora prolapsa sunt, condere, sic ut orbium singulorum locum seruet. Repositis omnibus, leniter homo concutiendus est. Quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes diducantur, & inibi concidant. His conditis omentum quoque considerandum est, ex quo si quid iam nigri & emortui est, forfice excidi debet. Si quid integrum est, leniter super intestina diduci: sutura autem neque summae cutis, neque interioris membranae per se satis proficit, sed utriusque. Et quidem duobus lineis vincienda est spissior, quam alibi: quia rumpi & facilius motu ventris potest, & non aequè magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duabus acubus fila traicienda, eaque duabus manibus tenenda, et prius interiori membranae sutura iniicienda est, sic ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinisterrima à principio vulneris orsa, ab interiori parte in exteriorem acum immittat. Quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acum longè sit, quae retusa est. Semel utraque parte traiecta permutanda acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quae fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continuit. Iterumque eodem modo per oras immittere sunt. Atque ita tertio & quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus includenda plaga. Posthac eadem fila, eademque acus ad cutem transferenda. Similique ratione ei quoque parti utraque sutura

iniicienda, semper ab interiore parte acubus venientibus, semper inter manus traiectis. Deinde glutinaria iniicienda. Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto impressam accedere debere manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impositis his leuiter deligari venter debet.

De Interiore parte abdominis rupta, & qua ratione curanda sit. C A P. XVII.

Interdum tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub graui fasce interior abdominis membrana superiore cute integra, rumpitur. Quod sceminis quoque ex utero saepe euenire consuevit, sitque praecipue circa ilia, sequitur autem cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecore intumescat. Atque id quoque aliter ab alijs curatur. Quidam enim per acum duobus lineis ad imam basin immisis, sic utrinque deuinciunt, quemadmodum & in umbilico, & in rua positum est, ut quicquid super vinculum est, emariatur: quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folij, quod semper eodem modo seruandum esse iam posui, & tum oras sutura iungunt. Commodissimum est autem resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est ea parte rupta membrana sit, quaque integra est, ea magis obnitatur, tum qua rupta videbitur, immittenda
 due li. scalpello due tunice sunt, ut exciso medio interior membrana utrinque recentem plagam habeat,

beat, quia quod vetus est, sutura non coit, loco patefacto. Si qua parte membrana non novam plagam, sed veterem habet, tenuis excidenda habena est, quæ tantum ora eius exulceret. Cetera, quæ ad suturæ reliquam curationem pertinent, suprâ comprehensa sunt.

De Varicibus ventris.

Pater hæc evenit, ut in quorundâ ventribus varices sint, quare quia nullâ alia curatio est, quàm quæ in cruribus esse cõsuevit, tum eam partem explanaturus, hanc quoq; eo differo.

De Testiculorum natura, & morbis eorum.

CAP. XVIII.

Venio autem ad ea, quæ in naturalibus partibus circa testiculos oriri solent, quæ quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam medullis habent. Nam sanguine non emittunt, & omni sensu carent. Dolent autem in ictibus & inflammationibus tunica, quibus hi continentur. Dependent verò ab inguinibus per singulos nervos, quos *νεύρα* Græci nominant, cum quorum utroque bina descendunt & vena & arteria. Hæ autem tunica conteguntur tenui, nervosa, sine sanguine, alba, quæ *ἐντοροειδής* à Græcis nominatur: super eam valentior tunica est, quæ interiori vehementer ima parte inhaeret, Darton Græci vocant. Multa deinde membranula venas & arterias, eosque nervos comprehendunt. Atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus

bus leues, paruulaq; sunt. Haftenus propria v-
 triq; testiculo & velamenta & auxilia sunt.
 Communis deinde vtriq; , omnibusq; interioribus
 finis est, qui iam cōspicitur à nobis, ὀσχεῶν Græ-
 ci, scrotum nostri vocant, isq; ab ima parte me-
 dijs tunicis leuiter innexus est, à superiore tan-
 tum circumdatus est. Sub hoc igitur plura vitia
 esse consuerunt. Quae modo ruptis tunicis, quas ab
 inguinibus incipere proposui, modò his integris
 fiunt. Siquidem interdum vel ex morbo primum
 inflammatur, deinde postea pondere abrumpi-
 tur, vel ex iclu aliquo protinus rumpitur tuni-
 ca, quae diducere ab inferioribus partibus inte-
 stina debuit, tñ pondere eò deuoluitur, aut omen-
 tum, aut etiam intestinum. Atq; ibi reperta via,
 paulatim ab inguinibus in inferiores quoq; par-
 tes* demissum, subinde nervosas tunicas, & ob
 id eius rei patientes diducit, ἐν τῷ ποικίλῳ &
 ἐπιπλοκίλῳ Græci vocant, apud nos indecorū,
 sed commune his Hernie nomen est. Deinde, si
 descendit omentum, nunquam in scroto tumor
 tollitur, siue inedia fuit, siue corpus huc illuc' re-
 conuersum, aut aliquo modo collocatum. Itemq; ,
 si retentus est spiritus, nō magnopere increscit,
 tactu verò inequalis est, & mollis, & lubricus.
 At si intestinum quoq; descendit,* tumor is sine
 inflammatione modò minuitur, modò increscit.
 Est q; ferè sine dolore, & cūm conquiescit ali-
 quis, aut iacet, interdū ex toto desidit, interdum
 sic diuiditur, vt in scroto exiguae reliquiae ma-
 neant.

Scrotum.

*nism

Hernia.

*humor
his

neant. At si clamore & satietate, & si sub aliquo pondere is homo nixus est, crescit, frigore omni contrahitur, calore diffunditur. Estq; tum scrotum & rotundum, & tactu leue, idq; quod subest, lubricum est: si pressum est, ad inguen reuertitur, dimissumq; iterum cum quodam quasi murmure deuoluitur. Et id quidem in leuioribus malis euenit. Nonnunquam autem stercore accepto vastius tumet, retroq; compelli non potest: adfert tum dolorem & scroto, & inguinibus, et abdomini: nonnunquam stomachus quoq; affectus, primum ruffam bilem per os reddit, deinde viridem, quibusdam etiam nigram. Integris verò membranis interdum eam partem humor dstringit. Atq; eius quoq; species duæ sunt. Nam vel inter tunicas is increscit, vel in membranis, quæ ibi circa venas et arterias sunt, ubi hæc grauata occaluerunt. Ac ne ei quidem humori, qui inter tunicas est, una sedes est. Nā modo inter summam & mediam, modo inter mediam & imam consistit. Græci communi nomine quicquid est, ὀδονόληον appellant: nostri ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis, hoc quoq; sub eodem nomine, quo priora habent. Signa autem quedam communia sunt, quedam propria. Communia, quibus humor deprehenditur. Propria, quibus locis humorem subesse dicimus: si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed interdum leuior, aut propter fæmen, aut propter febriculam, maximeq; in pueris, isq; moris est, si

non nimius humor subest. At si is vehementer increuit, renititur sic, ut vter repletus, & arte astrictus. Venæ quoq; in scroto inflantur, & si digito pressimus, cedit humor, circumfluensq; id quod non premitur, attollit, & tanquam in vitro cornu' re per scrotum apparet, isq; (quantum in ipso est) sine dolore est. Sedes autem eius sic deprehenditur: Si inter summam mediamq; tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos reuertēs subit, scrotum ipsius albidius est. Si ducitur, aut nihil, aut paruulū intenditur, testiculus ea parte neq; visu, neq; tactu sentitur. At si sub media tunica est, intētum scrotum magis se attollit, adeo, ut superior coles sub tumore eo delitecat. Præter hæc æque integris tunicis ramex innascitur *κισσουλῆα* Græci appellant, cum venæ intumescunt. Hæ quoq; intortæ conglomeratæq; ad superiorem partem, vel ipsum scrotum implent, vel mediam tunicam, vel imam. Interdum etiam sub ima tunica circa ipsum testiculū neruumq; eius increſcunt. Ex his eæ quæ in ipso scroto sunt, oculis patent: hæ verò quæ mediæ imæ' ve tunicæ insident, ut magis condita, non æquè quidem cernuntur, sed tamen etiam visui subiectæ sunt, præterquàm quod & tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine & modo: & id prementi magis renititur, ac per ipsos venarum toros inæquale est: & qua parte id est, testiculus magis iusto dependet. Cum verò etiam super ipsum testiculum neruumq;

neruumq; eius, id malum increuit, aliquāto longius testiculus ipse descendit, minorq; altero fit, utpote alimento amisso. Raro, sed aliquando caro quoque inter tunicas increfcit, σαρξονκλήν Græci vocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoq; adfert, & nisi celeriter ea inflammatio conquieuit, dolor ad inguina atq; ilia peruenit, partesq; hæ intumescunt: neruus ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulq; indurefcit: super hac inguen quoq; nonnunquam varices implent, βάρανοκλήν appellant.

De testiculorum curationibus communibus, & primò de incisione & curatione inguinis, vel scroti. CAP. XIX.

His cognitis, de curatione dicendum est, in qua quædam cõmunia omnium sunt, quædam propria singulorum. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de his, quæ scalpellum desiderant. Nam quæ vel sanari nō possint, vel aliter nutrirī debeant, dicendum erit, simul ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In vtraq; curatione, homo ante triduum bibere aquam, pridie abstinerere etiam à cibo debet, ipso autem die collocari supinus: deinde si inguen incidendum est, idq; iam pube contegitur, antè radendum est, & tum extento scroto, ut cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, qua cum abdomine tunica inferiores committuntur. Ape-

riendum

riendum autem audacter est, donec summa tunica, quæ ipsius scroti est, incidatur, perueniaturq; ad eam, qua media est plaga facta. Foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistra manus digitus index, ut diductis interuenientibus membranulis simul laxet. Minister autem sinistra manu comprehenso scroto, sursum versus eum debet extendere, & quammaximè ab inguinibus abducere: primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas, quæ super mediam tunicam sunt, si digito deducere non potest, scalpello abscindat. Deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagæ iungatur, digitoq; inde promatur, & super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde si qua vitiosa sunt, circuncidenda sunt. In quibus cum multe venæ discurrant, tenuiores quidem præcidi protinus possunt: maiores verò antè longiore lino deligande sunt, ne periculose sanguinem fundant. Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum increuerit, excidenda erit, sic, ut alte ad ipsum inguen præcidatur. Infra tamen non tota demenda est. Nam quod ad basim testiculi vehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest. Itaq; ibi relinquendum est. Idem in ima quoq; tunica, si læsa est, faciendum est. Sed non à summa inguinis plaga, verum infra paulum ea abscindenda, ne læsa abdominis membrana inflammationes moueat. Neq; tamen nimium ex ea sursum relinquendum est,
ne possit

ne postea sinuetur, & sedem eidem malo præstet. Purgatus ita testiculus per ipsam plagam, cum venis & arterijs, & nervo suo leuiter demittendus est, videndumq; ne sanguis in scrotum descendat, ne' re concretus aliquo loco maneat. Quæ ita fiunt, si venis rinciendo medicus prospexerit: lina quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debebunt, quæ pure orto sine ullo dolore excident. Ipsi autem plagæ injiciende duæ fibulae sunt, & insuper medicamentum quo glutinentur. Solet interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix maior & latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super non fulcienda, sed leuiter tantum ponenda sunt, supraq; ea quæ inflammationem repellant, id est, ex aceto vellana succida vel spongia. Cætera eadem quæ ubi pus moueri debet, adhibenda sunt. At cum infra incidi oportet, resupinato homine subijcienda sub scroto sinistra manus est, deinde id vehementer apprehendendum, et incidendum. Si parvulum est quod nocet, modice, ut tertia pars integra ad sustinendum testiculum infra relinquatur. Si maius est, etiam amplius, ut paulum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus, quamleuissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat. Tum inclinandus mucro est, ut transversa membrana secet, quæ inter summam mediamq; tunicam sunt. At si vitium in proximo est, mediam

tunicam

tunicam attingi non oportet. Si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est, sic ut tertia quoque, si illa vitium tegit. Vbiq; repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet, medicum digito, manubriolo, vel scalpello diductam inferiorem partem tunica extra collocare: deinde eam ferramento, quod ad similitudinem curuum vocant, incidere, sic ut in eandem intrare duo digiti, index & medius possint. His deinde coniectis, excipienda reliqua pars tunicae, & inter digitos scalpellus immittendus est, eximendumq; aut effundendum quicquid est noxium. Quancumq; autem tunicam quis violauit, illam quoque debet excidere, ac mediam quidem (ut supra dixi) quam altissime ab inguine, unam autem paulo infra. Ceterum antequam excidantur, haec quoque vinciri lino summe debent, & eius lini capita extra plagam relinquenda sunt, sicut in alijs quoque venis, quae id requisierint. Eo facto testiculus intus reponendus est, oraq; scroti futuris inter se committenda, neque paucis, ne parum glutinentur, et longior fiat curatio, neque multis, ne inflammationem augeant. Atque hic quoque videndum est, ne quid in scroto sanguinis maneat. Tum imponenda glutinantia sunt. Si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidve concretum ex eo decidit, incidi subter id debet, purgatoq; eo spongia acri aceto madens circumdari. Deligatur autem vulnus omne, quod ex his causis factum est. Si
dolor

dolor nullus est, quinque primis diebus non est resoluendum, sed bis die tantum aceto irroranda lana vel spongia. Si dolor est, tertia die resoluendum, & ubi fibulae sunt, haec incidenda, ubi linamentum, id mutandum est: rosaque & vino madesaciendum id, quod imponitur. Si inflammatio increfcit, adijciendum prioribus cataplasma ex lenticula et melle, vel ex malicorio, quod in austero vino coctum sit, vel ex his mistis. Si sub his inflammatio non conquiescit, post diem quintum multa calida aqua vulnus fouendum, donec scrotum ipsum & extenuetur, & rugosius fiat. Tum imponendum cataplasma ex triticea farina, cui resina pinea adiecta sit. Quae ipsa si robustus curatur, ex aceto si tener, ex melle coquenda sunt. Neque dubium est, quodcumque initium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quae prius movent, imponenda sint. Quod si prius in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus datur. Linamentumque eatenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter vernos priore cataplasmate, dein cerato utendum est. Haec proprie ad eiusmodi vulnera pertinent. Cetera & in curatione, & in victu similia his esse debent, quae in alio quoque vulnerum genere praecipimus.

De Intestini curatione.

C A D. XX.

His propositis ad singulas species veniendum est, ac si cui paruulo puero intestinum descendit ante scapillum experienda iunctura est,

est. Fascia eius rei causa fit, cui imo loco pila as-
suta est ex panniculis facta, quæ ad repellendum
intestinum ipsi illi subijcitur, deinde reliqua fa-
scie pars arte circumdatur, sub quo sæpe & in-
tus compellitur intestinum, & inter se tunica
glutinantur. Rursus si ætas processit, multumq;
intestini descendisse ex tumore magno patet, ad-
ijciunturq; dolor & vomitus, quæ ex stercore,
& ex cruditate eò delapso ferè accidunt, scal-
pellum adhiberi sine perniciæ non posse mani-
festum est. Levandum tantummodo malum, &
per alias curationes extrahendum est. Sanguis
mitti ex brachio debet, deinde, si vires patiun-
tur, imperanda tridui abstinentia est: si minus,
certe pro vi corporis quamlongissime. Eodè verò
tempore supèr habendum cataplasma ex lini se-
mine, quod antè aliquis ex mulso decoxerit. Post
hec & farina hordeacea cum resina injicienda,
& is demittendus in solium aquæ calidæ, cui o-
leum quoq; adiectum sit, dandumq; aliquid cibi
lenis calidi. Quidam etiam aluum ducunt. Id du-
cere aliquid in scrotum potest, educere ex eo nō
potest. Per ea verò, quæ suprà scripta sunt, leua-
to malo, si quando aliàs dolor reuerterit, eadem
erunt facienda. Sine dolore quoq; si multa inte-
stina prolapsa sunt, secari superuacuum est, non
quòd excludi à scroto non possint, nisi tamen id
inflammatio prohibuit, sed quò repulsa inguini-
bus immorentur, ibiq; tumorem excitent, atque
ita fiat mali non finis, sed mutatio. At in eo quò
scalpello

scalpello curari oportebit, simulatq; ad mediam tunicam vulnus in inguine factum peruenerit, duobus hamulis ea iuxta ipsas oras apprehendi debet, dum eductis omnibus membranulis medicus eam liberat. Neq; enim cum periculo leditur, quæ excidenda est, cum intestinum esse nisi sub ea non possit. Vbi deducta autem erit, ab inguine usq; ad testiculum incidi debet, sic, ne ipse ledatur, tum excidi. Ferè tamen hanc curationem puerilis ætatis, & modicum malum recipit. Si vir robustus est, maiusq; id vitium est, extrahi testiculus nõ debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione usq; ad mediam tunicam scalpello aperitur, eaq; tunica eodem modo duobus hamis excipitur, sic ut à ministro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat: tñ ea tunica deorsum versus scalpello inciditur. sub eaq; index digitus sinistrae manus ad imum testiculum demittitur, eumq; ad plagam cõpellit. Deinde dextra manus duo digiti pollex atq; index, venam & arteriam & neruum, tunicamq; eorum à superiore tunica diducunt. Quod si aliquæ membranule prohibent, scalpello resoluuntur, donec ante oculos tota iam tunica sit. Excisis quæ excidenda sunt, repositoq; testiculo, ab ora quoq; eius vulneris, quod in inguine est: demenda habenula paulò latior est, quo maior plaga sit, & plus creare carnis possit.

De

AT si omentum descendit, eodē quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen, diducendaq; tunicae sunt. Cōsiderandum autē est, maior'ne is modus, an exiguus sit. Nam quod parvulum est, super inguen in aluum vel digito vel auerso specillo repellendum est. Si plus est, sinere oportet dependere, quantum ex vtero prolapsum est, idq; adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur & excidat. Quidam hic quoq; duo lina acu trañciunt, binisq; singulorum capitibus diuersas partes astringunt. Sub quo aequae, sed tardius emoriatur. Adycitur tamen hic quoq; celeritati, si omentum super vinculum illinitur medicamentis quae sic exedunt, ^{*οκασία.} ne erodant, ^{οκασία} Græci vocant. Fuerunt etiā qui omentum forfice præciderent, quod in parvulo non est necessarium. Si maius est, potest profusionem sanguinis facere. Siquidem omentum quoq; venis quibusdam etiam maioribus illigatū est. Neq; verò si discusso ventre id prolapsum forfice præciditur, cum & emortuum sit, & aliter tutius auelli nō possit, inde huc exemplum transferendum est. Vulnus autem curari, si relictum omentum est, sutura debet. Si id amplius fuit, & extrā emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est. Si verò humor intus est, incidendum est, in pueris quidem inguen, nisi in his quoq; liquoris eius maior modus prohibet: in viris verò & ubicunq; multus humor subest,

subest, scrotum. Deinde si inguen incisum est, eò protractis tunicis humor effundi debet. Si scrotum, & sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quàm humor est effundendus, abscindendæq; membrane sunt, si quæ eum cōtinuerūt: deinde eluendum id ex aqua, quæ vel salem adiectū, vel nitrum habeat: si sub media, ima'ue tunica, totæ hæ extra scrotum collocandæ, excidendæq; sunt.

De Ramicis curatione.

CAP. XXII.

Ramex autem, si super ipsum scrotum est, radurendus est tenuibus & acutis feramentis, quæ ipsis uenis insigantur, cum eo ne amplius quàm has vrant, maximeq; vbi inter se implicatæ glomerantur, eò ferrum id admouendum est, tum supèr farina ex aqua frigida subacta iniicienda est, vtendumq; eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui. Tèrtio die lenticula cum melle imponenda est, pòst eiectis crustis vlcera melle purganda, rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. Quibus uero super mediam tunicā uenæ tument, incidendū inguen est, atq; tunica promouenda, ab eaq; uenæ digito vel manubriolo scalpelli separanda. Quā parte uerò inhierebunt, & ab superiore & ab inferiore parte lino vincienda, tum sub ipsis vinculis pracidenda, reponendusq; testiculus est. At vbi supra tertiam tunicam ramex insedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si due tres'ue uenæ tument, & ita pars aliqua obsidetur, vt maiore vitio vacet, idem facien-

F dum

dum quod supra scriptum est, ut ab inguine & à testiculo deligatae venae praecidantur, isq; con-
datur. Sin totum id ramex obsederit, per pla-
gam demittendus digitus index erit, subijci-
endusq; venis, sic ut paulatim protrahat aequè ad-
ducendo, donec is testiculus par alteri fiat. Tum
fibulae oris sic vinciendae, ut simul eas quoq; ve-
nas comprehendant. Id hoc modo fit: Acus ab
exteriore parte oram vulneris perforat. Tum
non per ipsam venam, sed per membranam eius
immittitur, per eamq; in alteram oram compul-
latur. Venae vulnerari non debent, ne sanguinem
fundant. Membrana semper inter has venas est,
ac neque periculum affert, & filo comprehensas
illis abunde tenet. Itaque etiam satis est, duas
fibulas esse: tum venae quaecunq; protractae sunt
in ipsum inguen, aduerso specillo comprehendi
debent: soluendi fibulas tempus inflammatione
finita & purgato vulnere est, * ut una simul &
orae & venas cicatrix deuinciat. Vbi verò
inter imam tunicam & ipsam testiculum ner-
uumq; eius ramex ortus est, una curatio est, quae
totum testiculum abscindit. Nam neq; ad gene-
rationem quicquam is confert, & omnibus inde-
core, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed
tum quoque inguen incidendum, media tunica
promenda, atque excidenda est, idem in ima fa-
ciendum, nervusq; ex quo testiculus dependet,
praecidendus. Post id venae & arteriae ad in-
guen lino deligandae, & infra vinculum abscin-
denda

dende sunt.

De Carne quæ Inter tunicas testiculorum con-
creuit, & de neruo indurato. CAP. XXIII.

CAro quoq; si quando inter tunicas concre-
uit, nihil dubij est, quin eximenda sit, sed
id ipso scroto inciso fieri comodius est. At si ner-
uus induruit, curari res neq; manu neq; medica-
mento potest. Urgent enim febres ardentes, &
aut virides aut nigri vomitus: præter hæc in-
gens sitis, & linguæ aspritudo, fereq; à die ter-
tio spumās bilis aluo cum rosione redditur. Atq;
neq; assumi facile cibus, neq; cōtineri potest, neq;
multo post extremæ partes frigescent, tremor ori-
tur, manus sine ratione extenduntur, deinde in
fronte frigidus sudor, eumq; mors sequitur.

De Ramice inguinis. CAP. XXIII.

Vbi verò in ipso inguine ramex est, si tu-
mor modicus est, semel incidi: si maior
duabus lineis debet, ut medium excidatur: de-
inde non extracto testiculo, sicut intestinis quoq;
prolapsis interdum fieri docui, colligendæ venæ
vinciendæq; ubi tunicis inhærebunt, & sub his
nodis præcidendæ sunt. Neq; quicquam novi cu-
ratio vulneris eius requirit.

Ad tegendam glandem colis, si nuda est.

CAP. XXV.

A his ad ea transcendendum est, quæ in cole
ipso sunt, in quo si glans nuda est, vultq;
aliquis eam decoris causa tegere, fieri potest, sed
F 2 exped

expeditius in puero quàm in viro. In eo cui id naturale est, quàm in eo, qui quarundam gentiù more circumcisisus est. In eo cui glans parua iuxtaq; eam cutis, spatiosior uerò ipse coles est, quàm in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, quibus id naturale est, eiusmodi est: Cutis circa glandem apprehenditur & extenditur, donec illam ipsam condat, ibiq; deligatur. Deinde iuxta pubem in orbem tergitur inciditur, donec coles nudetur, magnaq; cura cauetur ne vel urinae iter, vel venae, quae ibi sunt, incidantur. Eo facto cutis ad vinculum inclinatur, nudaturq; circa pubem velut circulus, eoq; linamēta dantur, ut caro increseat & id impleat, satisq; velamenti supra latitudo plagae praestat. Sed donec cicatrix sit, vinctum esse id debet, in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. At in eo qui circumcisisus est, sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab interiore cole est. Non ita dolet, quia summo soluto, deduci deorsum vsque ad pubem manu potest. Neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem. Tum multa frigida aqua fouetur, emplastrumq; circa datur, quod valentem inflammationem reprimat, proximisq; diebus ut propè à fame uictus est, ne forte eam partem satietas excitet. Vbi iam sine inflammatione est, deligari debet à pube vsq; circulum. Super glandem autem aduerso emplastro imposito induci. Sic enim fit, ut inferior pars glutinetur, superior ita sanescat,

nescat, ne inhereat.

Quomodo glans penis conteſta aperiri poſſit.

Contra ſi glans ita conteſta eſt, vt nudari non poſſit, quod vitium Greci *φύμωσις* appellant, aperienda eſt. Quod hoc modo fit: Subter à ſumma ora cutis inciditur recta linea vſq; ad frenum, atque ita ſuperius tergus relaxatum cedere retro poteſt. Quod ſi parum ſic proſectum eſt, aut propter anguſtias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda eſt, ſic vt vertex eius ad frenum baſis in tergo extremo ſit. Tum ſuperdanda linamenta ſunt, aliaq; medicamenta quæ ad ſanitatem perducant. Neceſſarium autem eſt donec cicatrix ſit conquieſcere. Nam ambulatio atterendo ulcus ſordidum reddit.

Inſibulandi ratio.

Inſibulare quoq; adoleſcentulos interdum uocis, interdum valetudinis cauſſa quidam conſuerunt. Eiusq; hæc ratio eſt. Cutis quæ ſuper glandem eſt extenditur, notaturq; vtrinq; à lateribus atramento quâ perforatur, deinde remittitur. Si ſuper glandem notæ reuertuntur, nimis apprehenſum eſt, & vltra notari debet. Si glans ab his libera eſt, is locus idoneus ſibulæ eſt. Tum quâ notæ ſunt, cutis acu filum ducente tranſiitur, eiusq; fili capita inter ſe deligantur, quotidieq; id mouetur, donec circa foramina cicatrice fiant. Vbi hæc confirmatæ, exempto filo ſibula additur, quæ quo melior, eo leuior eſt. Sed

F 3 hoc

hoc quidem sapius inter superuacua, quàm inter necessaria est.

De urinae reddendae difficultate, & de Calculo,
rationibusq; eorum. CAP. XXVI.

REs verò interdū cogit emoliri manu vrinam, cum illa non redditur, aut quia senectute iter eius collapsum est, aut quia calculus, vel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit. At mediocris quoque inflammatio saepe eam reddi naturaliter prohibet. Idq; non in viris tantummodo, sed in sœminis quoque interdum necessarium est. Ergo ane fistulae fiunt, quae ut omni corpori ampliori minoriq; sufficiant, ad maiores tres, ad sœminas duae medico habendae sunt. Ex uirilibus maxima decem & quinque est digitorum: media, duodecim: minima, nouem. Ex muliebribus, maior nouem: minor, sex. Incuruas verò esse eas paulum, sed magis viriles oportet, leuesq; admodum: ac neq; nimis plenas, neq; nimis tenues. Homo tum resupinus, eo modo quo in curatione ani figuratur, super subsellium aut lectum collocandus est. Medicus autem à dextro latere sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra verò fistulam demittere in iter urinae debet. Atq; ubi ad cervicem vesicae ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamq; urina reddita recipere. Sœmina breuius urinae similiter & rectius iter habet, quod mammula simile interimas oras super naturale positum, non minus saepe
auxil

auxilio eget, aliquanto minus difficultatis exigit. Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, qui subinde ea extenuatur, non longè ab exitu inherescit. Eum si fieri potest, oportet vellere, vel oriculario specillo, vel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema quamplurimum attrahenda, & condita glande lino vincienda est, deinde à latere recta plaga coles incidendus, & calculus eximendus est, tum cutis remittenda. Sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, & urina naturaliter profluat.

Quæ curatio calculosis adhibeatur.

Cum vesicæ verò calculi; facta mentio sit, locus ipse exigere videtur, ut subiiciam, quæ curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam festinare, cum præceptis sit, nullo modo convenit: ac neq; omni tempore, neq; in omni ætate, neque in omni vitio id experiendū est, sed solo vere, in eo corpore, quod iam novem annos, nondum quatuordecim excessit, & si tantum mali subest, ut neq; medicamentis vinci possit, neq; etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat, sed quo sepius utiq; in hoc fallat, in quo plura & genera & tempora periculi sunt. Quæ simul cum ipsa curatione proponam. Igitur ubi ultima experiri statutū est, antè aliquot diebus victu corpus præparandum est, ut modi-

cos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi verò inter hæc exercitatione utatur, quo magis calculus ad vesicæ cervicem descendat. Quod an inciderit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Vbi eius rei fides est, pridie is puer in ieiunio continendus est, & tum loco calido curatio adhibenda, quæ hoc modo ordinatur: Homo prævalens & peritus in sedili alto confidit, supinumque eum & aduersum super genua sua coxis eius collocatis comprehendit, reductisque eius cruribus, ipsum quoque iubet manibus ad suos poplites datis eos quam maxime possit attrahere, simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus eius est qui curatur, duobus sedilibus iunctis duo valentes insidunt, quo & sedilia & interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint. Tum is super duorum genua eodem modo collocatur, atque alter prout confedit sinistrum crus eius, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Siue autem unus, siue duo continent, super humeros eius suis pectoribus incumbunt. Ex quibus euenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extentus, & in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Præter hæc etiamnum à lateribus duo valentes obijciuntur, qui circumstantes leuare vel unum vel duos, qui puerum continent, non sinunt. Medicus deinde diligenter unguibus circuncisis, atque sinistra manu duos eius digitos,

tos, indicem et medium, leniter prius unum, deinde alterum in anum eius demittit, dextraq; digitos super imum abdomen leniter imponit, ne si utrinq; digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam ledant. Neq; verò festinanter in hac re, ut in plerisq;, agendum est, sed ita, ut quammaxime id tuto fiat. Nam lesa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primum circa cervicem queritur calculus. Ibi repertus minore negotio expellitur. Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc indicij suis cognitum est. Si verò aut ibi non fuit, aut recessit retro, digiti ad ultimam vesicam dantur, paulatimq; dextra quoque manus eius ultra translata subsequitur. Atque ubi repertus est calculus, qui necesse est in manus incidat, eo curiosius deducitur, quo minor leniorq; est, ne effugiat, id est, ne sepius agitanda vesica sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus eius opponitur, sinistree digiti deorsum eum compellunt, donec ad cervicem pervenitur. Inquam si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat: si planus, sic, ut transversus sit: si quadratus, ut duobus angulis sedeat: si altera parte plenior, sic ut prius ea, qua tenuior sit, euadat. In rotundo nihil interesse ex ipsa figura patet, nisi si lenior altera parte est, ut ea antecedeat. Cum iam eò venit, ut incidi super vesicæ cervicē iuxta anum cutis plaga lunata usq; ad cervicem vesicæ debeat, cornibus ad coxas

F 5 spectan

spectantibus paulum, deinde ea parte qua stri-
 ctior ima plaga est, etiamnum sub cute altera
 transversa plaga facienda est, qua ceruix ape-
 riatur, donec urine iter pateat, sic ut plaga pau-
 lo maior, quam calculus sit. Nam qui * metu fi-
 * *χορὶ ἀδὰ* stula, quam illo loco * *ἐκὸς ἀπὸ* Græci vocant, pa-
 * *ῖον* rum patefaciunt, cum maiore eodem periculo re-
 * *δα* noluntur, quia calculus iter, cum vi promitur,
 facit, nisi accipit. Idq; etiam perniciosius est, si
 figura quoque calculi vel asperitudo aliquid eò
 contulit. Ex quo & sanguinis profusio, & dis-
 sentio nervorum fieri potest. Quæ si quis evasit,
 multo tamē patientiorem fistulam habiturus est,
 rupta ceruice, quam habuisset incisa. Cum verò
 patefacta est, in conspectum calculus venit, in
 cuius corpore nullum discrimen est. Ipse si exi-
 guus est, digitis ab altera parte propelli, ab alte-
 ra protrahi potest. Si maior, inciendus à supe-
 riore ei parte vncus est, eius rei causa factus.
 Is est ad extremum tenuis, in semicirculi speciem
 rectus latitudinis, ab exteriori parte levis qua
 corpori iungitur, ab interiori asper, qua calcu-
 lum attingit. Isq; longior potius esse debet. Nam
 brevis extrahendi vim habet. Vbi iniectus est,
 in utrumque latus inclinandus est, ut appareat
 calculus, & teneatur, quia si apprehensus est,
 ille simul inclinatur. Ideoq; eo minimo opus est,
 ne cum adduci vncus cœperit, calculus intus
 effugiat, hic in oram vulneris incidat, eamq;
 convulneret. In qua re quod periculum esset, iam
 supra

Suprà proposui. Vbi satis teneri calculum patet, eodem penè momento triplex motus adhibendus est, in vtrunque latus, deinde extra, sic tamen, vt leniter id fiat, paulumq; primo calculus attrahatur: quo factò, attollendus vncus extremus est, vt intus magis maneat, faciliusq; illum producat. Quod si aliquando à superiore parte calculus parum commode comprehendatur, à latere crit apprehendendus. Hec est simplicissima curatio. Sed varietas rerum quasdam etiamnum animaduersiones desiderat. Sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spinosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cernicem, sine vllò periculo eximuntur. In vesica verò non tuto vel hi conquiruntur, vel attrahuntur, quoniam vbi illam conuulserunt, ex distentione nervorum mortem maturant: multoq; magis, si spina aliqua vesicæ inhaeret, eamq; cum ducere-
tur, duplicauit. Colligitur autem eo, quòd difficilius vrina redditur, in cernice calculum esse: eo quòd cruenta destillat, illum esse spinosum, maximeq; id sub digitis quoque experiendum est, neq; adhibenda manus, nisi id constitit. Ac tum quoq; leniter intus digiti obijcendi, ne uolenter promouendo conuulserent, tum incidendū. Multi hic quoq; scalpello vsi sunt. Nolentes (quoniam is infirmior est, potestq; in aliqua prominentia incidere, incisoq; super illam corpore, quā cauum subest, non secare, sed relinquere, quod iterū incidi necesse sit) ferramentum fecit rectum, in sum-

ma

ma parte labrosum, in ima semicirculatum acutumq;. Id receptum inter duos digitos indicem ac medium super pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret. Quo cum sequebatur, ut semel quantum satis esset, aperiret. Quocunque autem modo ceruix ea parte facta est, leniter extrahi, quod asperum est, debet, nulla propter festinationem vi admota.

Signa calculorum, vel arenosorum,
vel mollium.

AT calculus arenosus, & ante manifestus est, quoniam & urina quæ redditur, arenosa est: & in ipsa curatione, quoniã inter subiectos digitos neq; æque leniter renititur, & insuper dilatatur. Item mollis calculus, & ex pluribus minutisq;, sed inter se parum astriclis compositus indicatur, in se attrahens quasdam quasi squamulis. Hos omnes leniter permutatis subinde digitorum vicibus sic oportet abducere, ne vesicam ledant, ne ue intus aliqua dissipata reliquæ maneant, quæ postmodum curationi difficultatem faciãt. Quicquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis vel unco eximendum est. At si plures calculi sunt, singuli protrahi debent, sic tamen, ut si quis exiguus supererit, potius relinquatur. Siquidem in vesica difficulter inuenitur, inuentusq; celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica leditur, excitatq; inflammationes

tiones mortiferas, adeo ut quidam secti, cum diu frustra; per digitos vesica esset agitata, decesserint. Quibus accedit etiā quod exiguus calculus, ad plagam urina postea promouente, excidit. Si quando autem is maior, non videtur, nisi rupta ceruice extrahi posse, findendus est. Cuius reperor Ammonius, ob id Lithotomos cognominatus est. Id hoc modo fit. Vincus iniicitur calculo, sic ut facile eum concussum quoque teneat, ne is retro reuoluatur. Tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicæ, prima parte tenui, sed retusa, quod ad motū calculum ex altera parte ictum findit: magna cura habita, ne aut ad ipsam vesicam per ferramentum perueniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

De Calculis fœminarum.

Hæc vero curationes in fœminis quoque similes sunt, de quibus tamen parum proprie quedam dicenda sunt. Siquidem in his ubi paruulus calculus est, scalpellus superuacuus est, quia is urinam in ceruicem non compellit, quæ & breuior, quam in maribus, et laxior est. Ergo & per se saepe excidit, & si in primo quod est angustius inhaeret, eodem tamen vinco sine vlla noxa educitur. At in maioribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subijci digiti tanquam masculo: mulieri per naturalia eius debet. Tum virgini quidem sub ima sinistiore ora. Mulieri verò inter urine iter & os pubis incidendū est, sic ut utroque loco pla-

ga

ga transuersa sit: neq; terreri conuenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

Quæ curatio calculo euulso habenda sit.

Calculo euulso, si valens corpus est, neque magnopere vexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur. Atq; ingredi quoq; eum paulum non alienum est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus ne vis omnis intereat, suppressi debet. Idq; protinus in imbecillioribus ab ipsa curatione faciendum est. Siquidem ut distentione neruorum periclitatur aliquis, dum vesica eius agitur: sic alter metus excipitur remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat ut occidat. Quod ne incidat, desiderare is debet in acre acetum, cui aliquantum salis sit adiectum. Sub quo & sanguis fere conquiescit, & astringitur vesica, ideoq; minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est & inguinibus & coxis, & super pubem. Vbi iam satis vel euocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est, sic ut caput humile sit, coxæ paulum excitentur: ac super vlcus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto madens. Deinde interpositis duabus horis in solum is aquæ calidæ resupinus demittendus est, sic, ut à genibus ad umbilicum aqua teneat, cætera vestimentis circumdata sint, manibus tantummodo pedibusq; nudatis, ut & minus digeratur, & ibi diutius maneat.

maneat. Ex quo sudor multus oriri solet, qui
 spongia subinde facile detergendus est, finisq;
 eius fomenti est, donec infirmando offendat. Tum
 multo is oleo perungendus, inducendusq; *hapsus
 lanæ mollis, tepido oleo repletus, qui pubem &
 coxas & inguina, & plagam ipsam contactā
 eodem ante se lintedlo protegat, isq; subinde oleo
 tepido madefaciendus est, ut neq; frigus ad ve-
 sicam admittat, & nervos leniter molliat. Qui-
 dam cataplasmatibus calefacientibus utuntur. Ea
 plus pondere nocent, quæ vesicam urgendo vul-
 nus irritat, quàm calore proficiunt. Ergo ne vin-
 culum quidem ullum necessarium est. Proximo
 die, si spiritus difficiliter redditur, si urina non
 excedit, si locus circa pubem mature intumuit,
 scire licet in vesica sanguinem concretum reman-
 sisse. Igitur demissis eodem modo digitis leniter
 pertractanda vesica est, & discutienda si qua
 coierunt. Quo fit, ut per vulnus postea proce-
 dant. Non alienum etiam est, oriculario clystere
 acetum nitro mistum per plagam in vesicā com-
 pellere. Nam sic quoq; discutiuntur, si qua cruen-
 ta coierunt. Eaq; facere etiam primo die conue-
 nit. Si timemus, ne quid intus sit, maximeq; ubi
 ambulandoid elicere imbecillitas prohibuit, cæ-
 tera eadem facienda sunt: ut demittatur in so-
 lium, ut eodem modo panniculus, eadem lana
 superinijciatur. Sed neque sæpe, neque tandiu in
 aqua calida puer habendus, quàm adolescens
 est: infirmus, quàm valens: levis, quàm gra-
 viore

*Hapsus id
 latinis di-
 ci videtur,
 Græcis
 πλῆμα,
 quod Sui-
 das expo-
 nit σάπασ-
 μα, Hesy-
 chius ὥ-
 θηρ signifi-
 cat autem
 vel saccu-
 lum, crume-
 nā, vel hu-
 iusmodi ali-
 quid, aut
 rectoriū,
 aut vela-
 men, aut
 cingulum,
 sacculi, aut
 crumenæ
 modo fa-
 ctum.

uiore inflammatione adfectus : is cuius corpus
digeritur, quàm is cuius astrictum est. Inter hæc
verò si somnus est, & æqualis spiritus, & ma-
dens lingua, & sitis modica, & venter imus,
sed & mediocris est cum febre modica dolor, sci-
re licet recte procedere curationem. Atq; in his
inflammatio fere quinto vel septimo die finitur.
Qua leuata, solium superuacuum est. Supini tan-
tummodo vulnus aqua calida fouendum est, vt
si quid vrinæ rodet, abluatur. Imponenda autem
medicamenta sunt pus mouentia, & si purgan-
dum vlcus videbitur melle linendum. Id si rodet,
rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum
videtur Enneapharmacum emplastrum. Nam
& seuum habet ad pus mouendum, & mel ad
vlcus repurgandum : medulla etiam maximeq;
vitulina, quod in id ne fistula relinquatur, præ-
cipue proficit. Linamenta verò tum super ul-
cus non sunt necessaria, super medicamentum ad
id continendum, recte imponuntur. At vbi ul-
cus purgatum est, puro linamento ad cicatricem
perducendum est. Quibus temporibus tamen, si
felix curatio non fuit, varia circa pericula oriun-
tur. Quæ præagire protinus licet, si continua vi-
gilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida
est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vul-
*trans- nus hiat, si *transiliens vrina id non rodit, si
fluens similiter ante tertium diem quædam liuida ex-
cidunt, si is aut nihil, aut tarde respondet, si ve-
hementes dolores sunt, si post diem quintum ma-
gne

gne febres urgent, & fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem iocundius est. Nihil tamen prius est distentione nervorum, & ante nonum diem vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinentia, modicis & tempestivis cibis, inter hæc fomentis, de quibus supra scripsimus, oportet.

De cancro qui excisa vesica nascitur, & qua curatione uti debeat.

C A P. XXVII.

Proximus canceri metus est: is cognoscitur, si & per vulnus, & per ipsum colem fluit sanies mali odoris, cumq; eo quædam à concreto sanguine non abhorrentia, tenuesq; caruncule lanulis similes: præter hæc si oræ vulneris aride sunt, si dolent inguina, si febris non defuit, eaq; in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est, in quam partem cancer is tendat. Si ad colem, indurefcit is locus, & rubet, & tactu dolorem excitat, testiculiq; intumescunt. Si in ipsam vesicam, ani dolor sequitur, coxæ durefcunt, non facile crura extendi possunt. At si in alterutrum latus, oculis id expositum est, paresq; utrinque easdem notas, sed minores habet. Primum autem ad rem pertinet, corpus recte iacere, ut superior pars semper eadem sit, in quam vitium fertur: ita si ad colem it, supinus is collocari debet: si ad vesicam, in ventrem: si in latus, in id quod integrius est. Deinde ubi rētum fuerit ad curationem,

G nem,

nem, homo in aquam demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus aut myrtus, idemque humor clystere intus adijcietur. Tum super ponetur lenticula cum malicorio mista, quæ utraq; ex vino decocta sint: vel rubus aut olea folia, eodem modo decocta, aliaque medicamenta, quæ ad cohibendos purgandosque cancri proposimus, ex quibus, si qua erunt arida, per scriptorium calammum inspirabuntur. Vbi stare coeperit cancer, mulso vulnus eluetur. Vitabiturque eo tempore ceratum, quod ad recipiendum id malum corpus emollit, potius plumbum elotum cum vino inungetur, superque idem linteolo illitum imponetur. Sub quibus perueniri ad sanitatem potest, cum eo tamen quod non ignoremus, orto Cancro sæpe affici stomachum, cui cum vesica quoddam consortium est, ex quo eo fieri, ut neque retineatur cibus, neque si quis retentus est, concoquatur, neque corpus alatur: ideoque ne vulnus quidem aut purgari, aut ali possit, quæ necessario mortem maturant: sed ut his succurri nullo modo potest, sic à primo tamen diu tenenda ratio curationis est. In qua quædam observatio ad cibum quoque potionemque pertinens necessaria est. Nam cibus interpretatur principia non nisi humidus dari debet. Vbi vlcus purgatum est, ex media materia olera et salsamenta semper aliena sunt. Potione opus est non modica. Nam si parum bibitur, accenditur vulnus, et vigilia urget, et vis corporis minuitur. Si plus æquo assumitur, subinde vesica implet

impletur, eoq; irritatur. Non nisi aqua autem bibendam esse manifestius est, quam ut subinde dicendum sit. Solet verò sub eiusmodi victu venire, ut alius non reddatur. Hac aqua ducenda est, in qua vel fœnum græcū vel malua decocta sit. Idem humor rosa mistus in ipsum vulnus oriculario clystere agendus est, ubi id rodit urina, neque purgari patitur. Fere verò primo per vulnus exit hæc, deinde eo sanescēte diuiditur, & pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur, quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoq; anno fit. Neq; desperari debet solida glutinatio vulneris; nisi ubi aut vehementer rupta ceruix est, aut ex cancro multæ magnæq; caruncule, simulq; nervosa aliqua exciderunt. Sed ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo cum iam ad cicatricē vulnus * tendit ex- *intendit tentis iacere seminibus, & cruribus oportet, nisi tamen molles, arenosiue calculi fuerunt. Sub his enim tardius vesica purgatur. Ideoq; diutius plagam patere necessarium est, & tum demum ubi iam nihil tale extrahitur, ad cicatricem perducitur: quod si antequam vesica purgata est, ore se glutinarunt, dolorq; & inflammatio redierunt, vulnus digitis vel aduerso specillo deducendum est, ut torquentibus exitus detur, hisq; effusis tum diutius pura urina descendat. Tum demum quæ cicatricē inducant, imponenda sunt,

G 2

extend

extendiſq; , vt ſuprà docui, pedes quàmmaximè
vincti. Quòd ſi fiſtula metus ex his cauſis, quas
propoſui, ſubeſſe videbitur, quo facilius clauda-
tur ea, vel certè coangustetur, in anum quoque
danda plumbea fiſtula eſt: extentiſq; cruribus,
femina taliq; inter ſe deligāda ſunt, donec qua-
lis futura eſt, cicatrix ſit.

Si naturalia fœminarum concubitus non ad-
mittunt, quomodo curari conueniat.

C A P. XXVIII.

ET hoc quidem commune eſſe maribus &
fœminis poteſt. Proprie verò quædam ad
fœminas pertinent, vt in primis quòd earū natu-
ralia nonnunquā inter ſe glutinatis oris, cōcubi-
tum non admittunt. Idq; interdū euenit protinus
in vtero matris, interdum exulceratione in his
partibus facta, & per malam curationē his oris
ſaneſcendo iunctis. Si ex vtero eſt, membrana ori-
vulvæ oppoſita eſt. Si ex vlcere, caro id reple-
uit. Oportet autem membranā duabus lineis in-
ter ſe tranſuerſis incidere ad ſimilitudinē literæ
X, magna cura habita, ne vrine iter violetur.
Deinde vndiq; eam membranam excidere: ac ſi
caro increuit, neceſſarium eſt recta linea pateſa-
cere. Tum ab ora vel voſſella vel hamo apprehen-
ſam, tanquam habenulā excidere: & intus im-
plicitum in longitudinē linamentum, *καμνισκόν*
Græci vocant, in aceto tinctū demittere, ſupràq;
ſuccidam lanam aceto madētem deligare. Tertio
die ſoluere vlcus, & ſicut alia vlcera curare.
Cumq;

Cumq; iam ad sanitatē tendet, plumbeā fistulam medicamēto cicatricem inducente illinere, eamq; intus dare. Supraq; idem medicamentum inijcere, donec ad cicatricem plaga perueniat.

Qua curatione partus emortuus ex utero excutitur.

CAP. XXIX.

Vbi concipit autem aliqua, si iam propè maturus partus intus emortuus est, neq; excidere per se potest, adhibēda curatio est, quæ numerari inter difficilimas potest. Nam et summā prudentiam moderationemq; desiderat, & maximum periculum affert. Sed ante omnia vulvæ natura mirabilis, cum in multis alijs, tum in hac re quoq; facile cognoscitur. Oportet autem ante omnia resupinā mulierem trāsverso lecto sic collocare, ut feminibus eius ipsius ilia comprimantur. Quo fit, ut & imus venter in cōspectu medici sit, & infans ad os vulvæ compellatur, quæ emortuo partu id comprimit, ex intervallo verò paulum dehiscere. Hac occasione vsus medicus, vinctæ manus indicem digitum primum debet inferere, atque ibi continere, donec iterum ad os aperiatur, rursusq; alterum digitum demittere debebit, & per easdem occasiones alios, donec tota esse intus manus possit. Ad cuius rei facultatem multum confert, & magnitudo vulvæ, & vis nervorum eius, & corporis totius habitus, & mentis etiam robur, cum præsertim intus nonnunquā etiam duæ manus dari debeant.

Pertinet etiam ad rem quamcalidissimum esse
 *dum in- inum ventrem, & extrema corporis, neq; *cum
 flamma- inflammatione incepisse, sed recenti re protinus
 tionē cœ- adhiberi medicinam. Nam si corpus iam intus
 pisse, mult, neq; demitti manus, neq; educi infans, nisi
 ægerrime potest, sequiturq; sæpe cum vomitu
 & cum tremore mortifera nervorum distentio.
 Verū intus emortuo corpori manus iniecta, pro-
 tinus habitum eius sentit. Nam aut in caput aut
 in pedes conuersum est, aut in transuersum ia-
 cet, fere tamen sic vt vel manus eius vel pes in
 propinquo sit. Medici verò propositū est, vt eum
 *manus manu dirigat, vel in*caput, vel etiam in pedes,
 si fortē aliter compositus est: ac si nihil aliud est,
 manus vel pes apprehensus, corpus rectius red-
 dit: nam manus in caput, pes in pedes eum con-
 uertet. Tum si caput proximum est, demitti de-
 bet vncus vndiq; lauis, acuminis brevis, qui vel
 oculo, vel auri, vel ori, interdū etiam fronti re-
 cte inijcitur, deinde attractus infantem educit,
 neq; tamen quolibet is tempore extrahi debet.
 Nam si compresso vuluæ ore id tentatum est,
 non emittente eo infans abrumpitur, & vnci
 acumen in ipsum os vuluæ delabitur, sequiturq;
 nervorum distentio, & ingens periculum mor-
 tis. Igitur compressa vulua, conquiescere: hiantē,
 leniter trahere oportet, & per has occasiones
 paulatim eum educere. Trahere autem dextra
 manus vncum, sinistra intus posita infantem
 ipsum, simulq; dirigere eum debet. Solet etiam
 euenire,

evenire, ut is infans humore distendatur, ex quo
eo profluat foedi odoris sanies. Si quid tale est,
indice digito corpus illud forandum est, ut effu-
so humore extenuetur. Tum id leniter per ipsas
manus recipiendum est, nam uncus iniectus
facile hebeti corpusculo eleuabitur. In quo quid
periculi sit, supra positum. Sed in pedes quoque con-
uersus infans non difficulter extrahitur, quibus
apprehensis per ipsas manus commode educi-
tur. Si vero transversus est, neque dirigi potuit,
uncus alae iniiciendus, paulatimque attrahendus
est. Sub quo fere ceruix replicatur, retroque caput
ac reliquum corpus spectat. Remedio est, ceruix
precisa, ut separatim utraque pars auferatur. Id
unco fit, qui priori similis in interiorem tantum
partem per totam aciem exacuitur. Tum id agen-
dum est, ut ante caput, deinde reliqua pars au-
feratur, quia fere maiore parte extracta, caput
in vacuam vuluam prolabitur: extrahi que sine
summo periculo non potest, si tamen id incidit,
super ventrem mulieris duplici panniculo inie-
cto, valens homo non imperitus a sinistro latere
eius debet assistere, & super imum ventrem e-
ius duas manus imponere, alteramque alteram pre-
mere. Quo fit, ut illud caput ad os vulvae com-
pellatur. Idque eadem ratione quae supra posita est,
unco extrahitur. At si pes alter iuxta repertus
est, alter retro cum corpore est, quicquid pro-
tractum est, paulatim abscindendum est: & si
clunes os vulvae urgere ceperunt, iterum retro

repellende sunt, conquisitusq; pes eius adducendus. Aliæq; etiamnum difficultates faciunt, ut qui solidus non exit, cōcisus eximi debeat. Quoties autem infans protractus est, tradendus ministro est. Is cum supinis manibus sustinere, medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita ne abrumpat, dextraq; eum sequi vsq; ad eas, quas secundas vocant, quod velamentum infantis intus fuit, hisq; ultimis apprehensis venulis membranulasq; omnes eadem ratione manu diducere à vulua, totumq; illud extrahere, & si quid intus præterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in vnum feminibus, illa in cōclavi collocanda est, modicum calorem sine ullo perlatu habente. Super imum ventrem eius imponenda lana succida in aceto & rosa tinctæ. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, & in his vulneribus, quæ in nervosis locis sunt, adhibeatur.

De Ani vitijs, & eorum curatione.

C A P.

X X X.

ANi quoque vitia ubi medicamentis non vincuntur, manus auxilium desiderant. Ergo, si qua scissa in eo vetustate induruerunt, iamq; callum habent, commodissimum est ducere alium, tum spongiam calidam admovere, ut relaxentur illa, & foras prodeant. Vbi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, & vlcera*removere*renouare, deinde imponere linamentum molle, et supèr linteolum illitum melle, locumq; eum molli

molli lana implere, & ita vincire altero die, deincepsq; ceteris lenibus medicamentis uti, quæ ad recentia eadē vitia necessaria esse aliās proposui, & utiq; per primos dies sorbitionibus eū sustinere, paulatim deinde cibis adijcere aliquid, generis tamen eius: quod eodem loco præceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit, incidendum est, ne anus ipse suppuret. Neq; tamen antè properandum est: nam si crudum incisum est, inflammationis multum accedit, et puris aliquanto amplius concitatur. His quoq; vulneribus, lenibus cibis, iisdemq; medicamentis opus est.

De condylomatum curatione.

AT tubercula, quæ condylomata appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur: Aluus ante omnia ducitur, tum velfella tuberculum apprehensum iuxta radices exciditur. Quod ubi factum est, eadem sequuntur, quæ supra post curationem adhibenda esse proposui. Tantummodo si quid increscit, squama aris coercendum est. Ora etiam venarum fundentia sanguinem sic tolluntur: Vbi sanguini qui effluit, sanies adijcitur, aluus acrius ducitur, quo magis ore promoveantur. Eoq; fit, ut *omnia vela, *omnes quasi capitula conspicua sint. Tum si capitulum venæ exiguum est, basimq; tenuem habet, astringendum lino paulum supra est quàm ubi cum ano committitur. Imponenda spongia aqua calida est, donec id libeat. Deinde aut vngue, aut scal-

G 5 pello

pello supra nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur, interdum etiam urinae difficultas. Si id maius est, & basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est, paulumq; supra basim incidendum, neq; relinquendum quicquam ex eo capitulo, neque quicquam ex ano demendum est. Quod consequitur is, qui neq; nimium, neq; parum hamos ducit. Quia incisum est, acus debet immitti, infraq; eam lino id capitulum alligari: si duo tria ve sunt, imum quodq; primum curandum est. Si plura, non omnia simul, ne tempore eodem vndiq; tenerae cicatrices sint: si sanguis profluit, excipiendus est spongia, deinde linamentum imponendum. Ungenda femina & inguina, et quicquid iuxta vlcus est, ceratumq; superdandum est. Farina hordeacea calida implendus is locus est: sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemq; cataplasmate foveri. Ac bis die, & ante curationem, & post eam, ceruices ac femina liquido cerato perungenda sunt, tepidoq; is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda. Si capitula simul non exciderunt, digito promouenda. Tum lenibus medicamentis, ysdemq; quae alibi posui, vlcera ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, iam alias superius exposui.

A De varicum curatione. CAP. XXXI.
 B his ad crura proximus transitus est, in quibus

quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. Huc autem & earum venularum quæ in capite nocent, & eorum varicum qui in ventre sunt, curationem distuli: quoniam ubiq; eadem est. Igitur vena omnis, quæ noxia est, aut adusta tabescit, aut manu exciditur. Si recta est, si quavis transversa, tamen simplex, si modica est, melius aduritur. Si curua est, & velut in orbes quosdam implicatur, pluresq; inter se inuoluuntur, vtilius eximere est. Adurendi ratio hæc est: Cutis superinciditur, tum patefacta vena tenui & retuso ferramento candente modice premitur, vitaturq; ne plagæ ipsius oræ adurantur, quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit, & tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur. At exciditur hoc modo: Cute eadē ratione super venam incisa, hamulo oræ excipiuntur, scalpelloq; vndiq; à corpore vena deducitur, caueturq; ne inter hæc ipsa ledatur, eiq; retusus hamulus subijcitur, impositoq; eodem fere spatio quod supra positum est, in eadem vena idem fit, quæ quò tendat, facile hamulo extento cognoscitur. Vbi iam idem, quacunq; varices sunt, factum est, vno loco adducta per hamulum vena præciditur, deinde quæ proximus hamus est, attrahitur & euellitur, ibi rursus abscinditur. Ac sic vndiq; varicibus crure liberato, tum plagarum oræ committuntur, & super emplastrum glutinans inijcitur.

Curatio

AT si digiti vel in utero protinus, vel propter communem exulcerationem postea cohaeserunt, scalpello diducuntur, dein separatim uterq; non pingui emplastro circumdatur. Atq; ita per se uterq; sanescit. Si verò sit ulcus in digito, posteaq; male inducta cicatrix curum eum reddit, primum malagma tentandum est. Dein, si id nihil prodest (quod & in veteri cicatrice, & ubi nervi laesi sunt, evenire cōsuevit) videre oportet, nervi'ne id vitium, an cutis sit. Si nervi est, attingi non debet, neq; enim sanabile est: si cutis, tota cicatrix excidenda est, quae ferè callosa efficit ut extendi digitum non patiatur, tum rectus sic ad novam cicatricem perducendus est.

De Gangraenae curatione. CAP. XXXIII.

GAngrena inter ungues alasq; aut inguina nasci, & si quando medicamenta vincuntur, membrum praecidi oportere, alio loco mihi dictum est. Sed id quoq; cum periculo summo fit. Nam saepe in ipso opere, vel profusione sanguinis, vel animae defectione moriuntur. Verum hic quoq; nihil interest an satis tutum praesidium sit, quod unicum est. Igitur inter sanam vitiatamq; partem incidenda scalpello caro usq; ad os est: sic ut neq; contra ipsum articulum id fiat: & potius ex sana parte aliquid excidatur, quam ex agra relinquatur. Vbi ad os ventum est, reducenda ab eo sa

eo sana caro, & circa os subsecanda est, ut ea quoq; parte aliquid os nudetur: dein id ferrula præcidendum est, quàm proxime sanæ carni etiam inhaerenti: actum frons ossis quam ferrula exasperavit, leuanda est, supraq; inducenda cutis, quæ sub eiusmodi curatiõe laxa esse debet, ut quàm maxime undiq; os contegat. Quò cutis induta non fuerit, id linamentis erit contegendũ, & super id spongia ex aceto deliganda. Cetera postea sic facienda, ut in vulneribus, in quibus pus moueri debet, præceptum est.

LIBER VIII.

De positu & figura totius humani corporis. CAP. I.

SUPEREST ea pars quæ ad ossa pertinet, quæ quo facilius accipi possit, prius positus, figur. usq; eorum indicabo. Igitur caluaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinq; leui, & quæ cerebri membranam contegit, & quæ cute capillũ gignente contegitur. Ea q; simplex ab occipitio & tēporibus, duplex usq; in verticē à fronte est. Ossa q; eius ab exterioribus partibus dura, ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt. Interq; ea venæ discurrunt, quas his alimentum subministrare credibile est: rarò autem caluaria solida sine suturis est. Locus tamen æstuosis facilius inuenitur. Et id caput firmissimum, atq; à dolore tutissi-

tutissimum est: ex ceteris, quo suturae pauciores sunt, eo capitis valetudo comodior est. Neq; enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem. Ferè tamen duæ super aures, tempora à superiore capitis parte discernunt. Tertia ad aures per verticem tendens occipitium à summo capite diducit. Quarta ab eodem vertice per medium caput ad frontem procedit, eaq; modo sub imo capillo desinit, modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his ceteræ quidem suturae in unguem committuntur. Hæ verò quæ super aures transversæ sunt, totis oris paulatim extenuantur, atq; ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Crassissimum verò in capite os post aurem est, quia capillus, ut verisimile est, ob id ipsum nõ gignitur. Sub his quoq; musculus, qui tempora connectunt, os medium in exteriorem partem inclinatam positum est. At facies suturam habet maximam, quæ à tempore incipiens, per medios oculos naresq; transversa pervenit ad alterum tempus. A qua breves duæ sub interioribus angulis deorsum spectant. Et mala quoq; in summa parte singulas transversas suturas habent. A medijsq; naribus aut superiorum dentium gingivis per medium palatum una procedit, aliaq; transversa idem palatum secat. Et suturae quidem in plurimis hæ sunt. Foramina autem intra caput maxima oculorum sunt, deinde narium, tum quæ in auribus habemus. Ex his quæ oculorum sunt, recta simpliciaq; ad cerebrum tendunt. Narium duo

duo foramina osse medio discernuntur. Siquidem hæc primum à supercilijs angulisq; oculorum osse inchoantur ad tertiam fere partem: deinde in cartilagine versæ quo propius ori descendunt, eo magis caruncula quoq; molliuntur. Sed ea foramina, quæ à summis ad imas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera diuiduntur. Aliaq; ex his ad fauces peruia spiritum & reddunt et accipiunt, alia ad cerebrum tendunt. In vltima parte in multa & tenuia foramina dissipantur, per quæ sensus odoris nobis datur. In aure quoq; primo rectum & simplex iter procedendo flexuosum fit, quod ipsum iuxta cerebrum in multa & tenuia foramina diducitur, per quæ facultas audiendi est: iuxta ea duo paruuli quasi sinus sunt, superq; eos finitur os, quod transversum à genis tendens ab inferioribus ossibus sustinetur, iugale appellari potest, ab eadem similitudine, à qua id Græci *συγώδες* appellant. Iugale.

Maxilla verò est molle os, eaq; una est, cuius eadem & media & etiam ima pars mentum est, à quo vtrinq; procedit ad tempora, solaq; ea mouetur. Nam mala cum toto osse, quod superiores dētes^{*} exigit, immobiles sunt. Verum ipsi^{*excipit} us maxillæ partes extremæ quasi bicornes sunt.

Alter processus intra latior, vertice ipso tenuatur, longiusq; procedens sub osse iugali subit & super id temporum musculus illigatur. Alter breuior & rotundior, & in eo finis qui iuxta foramina auris est cardinis modo fit: ibiq; huc & illuc

illuc se inclinās maxillæ facultatem motus præstat. Duriores ossē dētes sunt, quorum pars maxillæ, pars superiori ossi malarum heret. Ex his
 *τεμνι- quaterni primi quia secant, *τομνοὶ à Græcis
 νοὶ nominantur, hi deinde quatuor caninis dentibus
 Canini. ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinq; fe-
 Maxilla- re maxillares quaterni sunt, præterquam in his
 res. in quibus tres ultimi qui sero gigni solent, non increuerunt. Ex his priores singulis radicibus, maxillares utiq; binis, quidā etiam ternis quaternis' ve nituntur. Fereq; longior radix breviorē dentem edit, rectiq; dentis recta etiam radix, curvi flexa est: ex eadem radice in pueris novus dens subit, qui multo sæpius priorem expellit, interdum tamen supra infra' ve eum se ostendit. Caput autem spina excipit. Ea constat ex vertebra quatuor & viginti. Septem in cervice sunt, duodecim ad costas, reliquæ quinque sunt proximæ costis. Hæ teretes brevesq; ab utroq; latere, processus duos exigunt: mediæ perforatæ, quæ spine medulla cerebro commissa descendit, circā quoq; per duos processus tenuibus cauis peruiæ, per quæ à membrana cerebri similes membranule deducuntur. Omnesq; vertebrae exceptis tribus summis à superiore parte in ipsis processibus parvū deficientes sinus habent, ab inferiore alios deorsum versus processus exigunt. Summa igitur protinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis eius processibus. Quo fit, ut caput sursum deorsum versus tuberibus
 exasper

exasperetur, secunda superiori parti inferiore.
 Quod ad circuitum pertinet, pars summa angu-
 stiore orbe finitur. Itaque superior summa cir-
 cundata, in latera quoque caput moueri finit. Ter-
 tia eodem modo secundam excipit. Ex quo faci-
 lis ceruici mobilitas est. Ac ne sustinere quidem
 caput posset, nisi utrinque recti valentesque; nerui
 collum continerent, quos **καρπας* Græci appel- **Sic quidē*
 lant. Siquidem horum inter omnes flexus alter *hos neruos*
 semper intentus ultra prolabi superiora non pa- *Ludouicus*
 titur. Iamque; vertebra tertia tubercula que infe- *Cælius di-*
 riori inserantur, excipit. Ceteræ processibus de- *condos esse*
 orsum spectantibus, in inferiores insinuuntur, *contendit,*
 ac per sinus quos utrinque; habent, superiores ac- *tamē Her-*
 ciunt, multisque; neruis & multa cartilagine *mo. Barb.*
 continentur. Ac sic vno flexu modico in prom- *Tenōtas ap-*
 ptum dato ceteris negotijs homo & rectus insi- *pellandos*
 stit, & alioquin ad necessaria opera curuatur. *putauit.*
 Infra ceruicem verò summa costæ contra hume-
 ros sita est, inde undecim inferiores vsque ad
 inum pectus perueniunt, hæque; primis partibus
 rotundæ & leniter quasi capitulatæ, vertebra-
 rum transuersis processibus ibi quoque; paulum in-
 sinuatis inhaerent. Inde pateſcunt, & in exterior-
 rem partem recuruatæ, paulatim in cartilaginem
 degenerant. Eaque; parte rursus in interiora leni-
 ter flexæ committuntur cum osse pectoris. Quod
 valens ac durum à faucibus incipit, ab utroque
 latere lunatum, & à præcordijs iam ipsum quo-
 que cartilagine mollium terminatur: sub costis

H

verò

**ρῶς* verò prioribus quinque, quas *Νόθας* Græci nominant, breues tenuioresq; atq; ipsæ quoq; paulatim in cartilaginem versæ, extremis abdominis partibus inhaerescunt, imaq; ex his maiorem iam parte nihil nisi cartilago est. Rursus à ceruice duo lata ossa utrinque ad scapulas tendunt, nostri *scoptula operta* *ὠμοπλάτας* Græci nominant. Ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula, paulatimq; late scientia ad spinam tendunt, & quo latiora quaque parte sunt, hoc hebetiora. Atq; ipsa quoque in imo cartilaginosa, posteriore parte velut immatant, quoniam nisi in summo nulli ossi inhaerescunt. Ibi verò validis musculis nervisq; constricta sunt. At à summa costâ paulo interius quàm ubi ea media est, os excrescit, ibi quidem tenue, procedens verò quo propius lato scapulari ossi fit, eo plenius latiusq; & paulatim in exteriora curuatur: quod propius altera verticis parte modice intumescens, sustinet iugulum. Id autem ipsum recuruum ac neque inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit: paulumq; motu brachij mouetur, & cum lato osse scapularum infra caput eius, nervis & cartilagini connectitur. Hinc humerus incipit, extremis utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla, cartilaginofus: medius teres, durus, medullosus, leniter gibbus, & in priorem & posteriorem, interiorem, & anteriorem partem. Prior autem pars est, quæ à pectore

pectore est, posterior quæ ab scapulis, interior
 quæ ad latus tendit, exterior quæ ab eo recedit,
 quod ad omnes articulos pertinere in vltiori-
 bus patebit. Superius autem humeri caput ro-
 tundius, quàm cætera ossa, de quibus adhuc dixi,
 * verticulatis scapularum ossibus paruo excessu * verticil-
 inseritur, ac maiore parte ex transitu nervi de-
 ligatur. At inferius duos processus habet, inter
 quos quod mediū est, magis etiam extremis par-
 tibus sinuatur. Quæ res sedem brachio præstat,
 quod constat ex ossibus duobus. Radius, quem
 n. *ῥαδια* Græci appellant, superior breuiorq; Radius.
 primo tenuior, rotundo & leniter cauo capite
 exiguum humeri tuberculum recipit, atque ibi
 nervi & cartilagine continetur. Cubitus infe-
 rior longiorq; & primo plenior in summo capi-
 te, duobus quasi verticibus extantibus in sinu
 humeri, quem inter duos processus eius esse pro-
 posui, se inserit. Primo verò duobus radijs bra-
 chij ossa iuncta paulatim dirimuntur, rursusq;
 ad manum coeunt, modo crassitudinis mutato.
 Siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum
 tenuis est. Dein radius in caput cartilagosum
 consurgens, in verticem eius sinuatur. Cubitus Cubitus.
 rotundus in extremo, parte altera paulum pro-
 cedit. Ac ne sæpius dicendum sit, illud ignorari
 non oportet, plurima ossa in cartilaginem * desi- * desinere
 dere, nullum articulum non sic finiri. neque enim
 aut moveri posset, nisi leui inniteretur, aut cum
 carne nervisq; coniungi, nisi ea media quedam

materia committeret. In manu verò prima palme pars ex multis minutisq; ossibus constat, quorū numerus incertus est. Sed oblonga omnia & triangula structura quadam inter se connectuntur, cum inuicem superior alterius angulus, alterius planities sit, eoq; fit ex his vnus ossis paulum in interiora concaui species. Verum ex manu duo exigui processus in sinus radij coniunguntur. Tum ex altera parte recta quinque ossa ad digitos tendentia palmam explent, à quibus ipsi digiti oriuntur, qui ex ossibus ternis constant, omniumq; eadem ratio est. Interius os in verticem sinuatur, recipitq; exterioris exiguum tuberculum, neruiq; ea continent, à quibus orti ungues indurescunt. Ideoq; non ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent. Ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt. Ima verò spina in coxarū osse desinit, quod transuersum longeq; valentissimum, vuluam, vesicam, rectum intestinum tuetur, idq; ab exteriori parte gibbum, ad spinam resupinatum, à lateribus, id est, in ipsis coxis sinus rotundos habet: à quibus oriuntur os, quod pectinem vocant, idq; super intestina sub pube transuersum uentrem firmat: rectius in viris, recuruatum magis in exteriora in foemina, ne partum prohibeat. Inde femina oriuntur, quorum capita rotundiora etiam quam humerorum sunt, cum illa ex ceteris rotundissima sint. Infra verò duos processus à priore & à posteriore parte habent. Dein dura, & medullosa

Et ab exteriori parte gibba: rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt. Superiora in sinus coxae, sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, coniunguntur, tum infra introrsus leniter tendunt, quo aequalius superiora membra sustineant. Atque in eo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi à cruribus possint. Quae commissura, osse paruo, molli, cartilaginoso tegitur, patellam vocant. Hæc su- Patella.
 pèr innatans, nec ulli ossi inhaerens, sed carne et nervis deligata, pauloq; magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus iuncturam tuetur. Ipsum autem crus est ex ossibus duobus. Etenim per omnia femur humero, crus uerò brachio simile est: adeo ut habitus quoq; et decor alterius ex altero cognoscatur, quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. Verum alterum os ab exteriori parte supra positum est, quod ipsum quoq; Sura rectè nominatur. Id brevius, supraq; tenuius ad ipsos talos intumescit. Alterum à priore parte positum, cui Tibia nomen est, longius et in superiore parte plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur, sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa infra supraq; coniuncta media, ut in brachio deliſcunt. Excipitur autem crus infra ossa ex transverso talorum, idq; ipsum super os calcis situm est, quod quadam parte sinuatur, quadam excessus habet, et procedentia ex talo recipit, et in sinum eius inseritur. Idq; sine medulla durum, magisq; in
 H 3 poster

posteriorem partem proiectum, teretem ibi figuram representat. Cetera ossa pedis ad eorum quae in manu sunt, similitudinem instructa sunt. Plantae palmis, digiti digitis, ungues unguibus, respondent.

Ossa vitata & corrupta quibus signis cognoscantur, & qua ratione curentur. CAP. I I.

Ostine autem os, ubi iniuria accessit, aut vitatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut colliditur, aut loco mouetur. Id quod vitatum est, primo fere pingue fit, deinde vel nigrum uel cariosum. Quae super natis grauius ulceribus aut fistulis, hisque; vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis eueniunt. Oportet ante omnia os nudare ulcere exciso: & si latius eius vitium est, quam ulcus fuit, carnem subsecare, donec integrum os undique pateat: tum id quod pingue est, semel iterum ne satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo statu secedat: aut eradere donec iam aliquid cruoris ostendatur, quae integrioris nota est. Nam necesse est aridum sit, id quod vitatum est. Idem in cartilagine quoque; lesa faciendum est. Siquidem ea quoque; scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquatur. Deinde si vel os, siue cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. Neque alia facienda sunt ubi caries, nigrities, ue in summo osse est. Siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum vel radendum est. Qui radit haec, audacter imprimere ferramentum debet, ut

¶

Et agat aliquid, et maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum uentum est. Albo finire ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie manifestum est. Accedere etiam cruoris aliquid integro, supra dictum est. Si quando autem altius descenderit, utrumlibet dubium est. In carie quidem expedita cognitio est. Specillum tenue in foramen demittitur, quod magis minusue intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse testatur. Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore et ex febre. Quae ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen adaesta terebra fit. Nam finis vitij est, ubi scobis nigra esse desit. Igitur si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est, quae altitudine vitium aquent. Tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec inde siccum os ex toto fiat. Simul enim post haec et resoluetur ab inferiore osse, quodcumque vitiatum est, et is sinus carne replebitur: et humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Atque idem in carie quoque ad alteram partem ossis penetrante fieri potest. Sed quod totum vitiatum, totum eximendum est. Si inferior pars integra est, eatenus quod corruptum est, excidi debet. Item siue capitis, siue pectoris os, siue costae cariiosa est, inutilis vitio est, et excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui osse nudato,

H 4 diem

diem tertium expectant, ut tunc excidant. Ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque quantum fieri potest, eodem momento et cutis incidenda est, et os detegendum, et omni vitio liberandum est. Longeque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est: quia uix etiam si recte cessit, curatio veram sanitatem reddit.

Quomodo os excidatur: & de Modiolo, & Terebra, ferramentis ad id paratis. CAP. III.

EXciditur verò os duobus modis. Si parvulum est, quod laesum est, modiolo, quem *χοι-
vίσιον* Græci vocant: Si spatiosum, terebris. Vtriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum concavum teres est, imis oris ferratū, per quod medium clauus ipse quoque interiore orbe cinctus demittitur. Terebrariū autem duo genera sunt: Alterum simile ei, quo fabri utuntur. Alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit, atque iterū ab alio principio paulo minus quam equaliter sursum procedit. Si vitium in angusto est, quod comprehendere modiolus possit, ille potius aptatur. Et si caries subest, medius clauus in foramen demittitur. Si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clauum recipiat, ut eo insistente circumactus modiolus delabi non possit. Deinde is habena quasi terebra cōuertitur. Estque quidam premendi modus, ut et foretur, et circumagatur, quia si leniter imprimitur, parum proficit: Si grauius, non mouetur. Neque alienum est instillare paulum

paulum rose, vel lactis, quo magis lubrico cir-
 cumagatur. Quod ipsum tamen si ^{*}obtusius est, ^{*}copiosius
 aciem ferramenti hebetat: at ubi iam iter mo-
 diolo pressum est, medius clauus educitur, & ille
 per se agitur. Deinde cum sanitas inferioris
 partis scobe cognita est, modiolus remouetur: at
 si latius vitium est, quàm ut illo comprehenda-
 tur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso
 fine vitiosi ossis atq; integri, deinde alterum non
 ita longè, tertiumq; donec totus is locus qui ex-
 cidendus est, his cauis cinctus sit, atque ibi quoq;
 quatenus terebra agenda sit, scobis significat.
 Tunc excisori scalper ab altero foramine ad
 alterum malleolo adactus, id quod inter vtrumq;
 medium est, excidit: ac sic ambitus similis ei fit,
 qui in angustiore orbem modiolio imprimitur.
 Vtro modo verò id circumductum est, idem ex-
 cisori scalper in osse corrupto planius summam
 quanq; testam læsit, donec integrum os relinqua-
 tur. Vix vnquam nigrities integrum, caries per
 totum os perrumpit, maximeq; ubi vitiosa cal-
 uaria est. Id quoq; signi specillo significatur, qui
 depressus in id foramen, quod infra solidam se-
 dem habet, & ob id renitens aliquid inuenit, &
 madens exit. Si peruium inuenit, altius descen-
 dens inter os & membranam nihil oppositum
 inuenit, educiturq; siccus, non quo non subsit ali-
 qua vitiosa sanies, sed quoniam ibi ut in latiore
 sede diffusa sit. Sive autē nigrities, quam terebra
 detexit, sive caries, quam specillum ostendit, os
 H 6 transit,

transit, modiolus quidē vsus fere superuacuis est,
quia latius pateat necesse est, quod iam alte pro-
cessit. Terebra verò ea, quam secundo loco posui,
utendū, eaq; ne nimis incalēscat, subinde in aquā
frigida demittēda est. Sed tum maiore cura agen-
dū est, tum iam aut simplex os dimidiū perforatū
est, aut in duplici, superius. Illud, spatiū ipsum:
hoc, sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda
habena suspendendaq; magis sinistra manus est,
& sepius attollēda, & foraminis altitudo con-
sideranda: ut quandocumq; os perumpitur, sen-
tiamus; neq; periclitemur, ne mucrone cerebri
membrana ledatur. Ex quo graues inflammati-
ones cum periculo mortis oriuntur. Factū forami-
nis eodem modo media saepe, sed multo circun-
spectius excidendū sunt, ne forte angulus scalpri
eandē membranam violet, donec fiat aditus, per
quem membranae custos immittatur *μλω*, *μλω*-
πιδνα Graeci vocant. Lamina aenea est, firma,
paulum resina ab exteriori parte lauis, quae de-
missa est, ut exterior pars eius cerebro propior
sit, subinde ei subiicitur, quod scalpro discutiendū
est: ac si excipit eius angulū, ultra transire non
patitur, eoq; & audacius et tutius scalpri mal-
leolo subinde medicus ferit, donec excisum vi-
diq; os eundē lamina leuetur, tolliq; sine ulla noxa
cerebri potest. Vbi totū os erectum est, circumtra-
denda leuandaq; sunt ora, & si quis scobis mem-
brae infodit, colligendum. Vbi superiori parte
sublatā, inferior relinqua est, non ora tantum, sed

os quoq; totum lauandum est, vt sine noxa postea cutis increseat, quæ aspero osse innascēs protinus non sanitatē, sed nouos dolores mouet. Patefacto cerebro, quæ ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa peruenero. Si basis aliqua seruata est, super imponēda sunt medicamenta non pinguia, quæ recentibus vulneribus accommodantur, supraq; imponēda Luna succida oleo atq; aceto madens. Vbi tempus processit, ab ipso ore caro increscit, eaq; factū manu sinum complet. Si quod etiam os aduētum est, à parte sana recedit: subitq; inter integram atque emortuam partem caruncula, quæ quod abscessit, expellat, eaq; fere quia testā tenuis & angusta est, squama est, id *λεπίς* à Grecis nominatur. Potest etiam euenire, vt ex ictu neq; findatur os, neq; perfringatur, sed summū tamē collidatur, exaspereturq;. Quod ubi incidit, radi & lauari satis est. Hæc quæuius maxime fiunt in capite, tamē ceteris quoq; ossibus communia sunt, vt ubicunque idem incidet, eodem remedio sit vtendum. Atq; cum ea fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt. De quibus protinus dicam, initio ab eadem caluaria accepto.

De caluariæ curatione.

CAP. IIII.

Igitur ubi ea pertusa, protinus requirendum est, num bilem is homo vomuerit, num oculi eius obcecati sint, num obmutuerit, num per nares aures'ue sanguis ei effluerit, num cōciderit,

num

num sine sensu quasi dormiēs iacuerit. Hac enim non nisi osse fracto eueniunt. Atque ubi inciderunt, scire licet necessariam, sed difficilem curationē esse. Si verò etiam torpor accessit, si mens non constat, si neruorum vel resolutio vel distentio secuta est, verisimile est etiam cerebri membranam esse violatam, eoq; in angusto magis spes est. At si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari, an os fractum sit. Et protinus considerandum est, lapide an ligno, an ferro, an alio telo percussum sit, & hoc ipso leni an aspero, mediocri an vastiore, vehementer an leniter. Quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est, quam certiore id nota explorare. Ergo quā plaga est, demitti specillum oportet, neq; nimis tenue, neq; acutum, ne cum in quosdam sinus naturales inciderit opinionē, fracti ossis frustra faciat, neq; nimis plenum, ne paruula rimule fallant. Vbi specillum ad os venit, nihil nisi lene & lubricum occurrit, integrum id videri potest. Si quid asperi est, utiq; quā suturæ non sunt, fractum os esse testatur. A suturis se deceptum esse, Hippocrates memoriæ prodidit, more scilicet magnorum virorum, & fiduciā magnarum rerum habentium. Nam leuia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt. Magno ingenio, multaq; nihilominus habituro, conuenit et iā simplex veri erroris confessio, precipueq; in eo ministerio quod utilitatis causā posteris traditur,

tur, ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis antè deceptus est. Sed hæc quidem alioquin memoria magni professoris, uti interponeremus, effecit. Potest autem sutura eo nomine fallere, quæ æque aspera est, ut aliquis hanc esse, etiam si rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet, sed os aperire tutissimum est. Nam neque utiq; certa sedes, ut supra posui, suturarum est, & potest idem, & naturaliter commissum, & ictu fissum esse, iuxta'ue aliquid fissum habere. Quin aliquid etiam, ubi ictus fuerit vehementior, quamvis specillo nihil inuenitur, tamen aperire commodius est. At si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde scalpro id detrahendum. Nigritiem enim continet, si quid fissum est. Solet etiam euenire, ut altera parte fuerit ictus, & os altera fiderit. Itaq; si grauitèr aliquis percussus est, si mala indicia subsequuta sunt, neq; ea parte qua cutis discussa est, rima reperitur, non incommodum est parte altera considerare, nunquis locus mollior sit, & tumeat, eumq; aperire. Siquidem ibi fissum os reperietur, nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiam si frustra defecta est. Os fractum nisi succursum est, grauib; inflammationibus afficit, difficiliusq; postea tractatur. Raro, sed aliquando tamen euenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus verò ex ictu vena aliqua in cerebri membrana rupta
aliquid

aliquid sanguinis mittat, isq; ibi concretus magnos dolores moueat, oculos quibus obcæcet. Sed fere contra id dolor est, & eo loco cute incisa pallidum os reperitur. Ideoq; id quoque os excidendum est. Quacumq; autem de causa curatio hæc necessaria est: si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec quicquid lesum est in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa membranula quæ sub cute caluariam cingit, super os relinquatur. Siquidem hæc scalpro terebris'ue lacerata, vehementes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam commodius est ex toto ab osse diduci. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus. Si manu facienda est, ea fere commodissima est, quæ duabus transversis lineis literæ x figurâ accepit, ut deinde à singulis procedentibus* singulis cutis subsequatur. Inter quæ
 * alij, lingulis: alij, si sanguis fertur, sponsia subinde in aceto tincta
 ligulis le- cohibendus est, occupandusq; obiectis linamen-
 gunt. tis, & caput altius excitandum. Neque id vitium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, adfert, sed ibi quoq; nihil tutius fit. In omni verò fisso fracto'ue osse protinus antiquiores medici ad ferramenta veniebant, quibus id excideret. Sed multo melius est, antè emplastra experiri, quæ caluariae causa componuntur. Eorumq; aliquid oportet ex aceto molitum, per se super fissum fractum'ue os imporre, deinde super id aliquatò latius quàm vulnus est,

est, eodem medicamento illitum linteolum, & præterea succidam lanam aceto tinctam. Tunc vulnus deligare, & quotidie resolvere, similiterq; curare vsq; ad diem quintum. A sexto die, etiam vapore aquæ calidæ per spongiam fouere, cætera ex eadem facere. Quod si carūcula incre-
scere cœperit, et febricula aut soluta erit, aut le-
uior, & cupiditas cibi reuerterit, satisq; somni
accedet, in eodem medicamento erit perseveran-
dum. Procedente deinde tempore, emollicendum
id emplastrum adiecto cerato ex rosa facto, quo
facilius carnem producat. nam per se reprimen-
di vim habet. Hac ratione sepe rimæ callo quo-
dam implentur, estq; ea ossis velut cicatrix, &
latius fracta ossa, si qua inter se non cohærebāt,
eodem callo glutinantur, estq; aliquanto melius
velamentum cerebro, quàm caro quæ exciso osse
increscit. Si verò sub prima curatione febris in-
tenditur, breuesq; somni & ijdem per somnia
tumultuosi sunt, vlcus madet, neque alitur, &
in ceruicibus glandulæ oriuntur, magni dolores
sunt, cibiq; super hæc fastidium increscit, tum
demum ad manum scalprumq; veniendum est.
Duo verò sub iclu calvaria pericula sunt, ne
vel findatur, vel medium defidat: si fissum est,
possunt ora esse compressa, vel quia altera super
alteram excessit, vel etiam quia vehementer
rursus se commiserunt. Hæc quo euenit, ut humor
ad membranam quidem descēdat, exitum verò
non habeat, ac sic eam irriter, et graves inflama-
tiones

tiones moueat. Vbi medium defedit, eandē cere-
bri membranā os vrget, interdum etiam ex fra-
ctura quibusdam velut aculeis pungentibus. His
ita succurrendum est, vt tamen quā minimum
ex osse dematur. Ergo si ora alteri insedit, satis
est id quod eminet, plano scalpro excidere, quo
sublato iam rima hiat quantum curationi satis
est. At si ora inter se comprimuntur, à latere
eius interposito digiti spatium terebra foramē fa-
ciendum est, ab eoq; scalper duabus lineis ad ri-
mam agendus ad similitudinem C literæ, sic vt
vertex eius à foramine basis ad rimas sit. Quod
si rima longius patet, ab altero foramine rursus
similis sinus fieri debebit, & ita nihil latens in
eo osse concavum est, abundeq; exitus datur in-
tus la dentibus. Ne si fractum quidē os defedit,
totum excidi necesse est. Sed siue totum perfra-
ctum est, & ab alio ex toto recessit, siue circum-
positæ caluariæ inheret exigua parte, ab eo quod
naturaliter se habet, scalpro diuidendum est: de-
inde in eo quod defedit iuxta rimam quam fe-
cimus, foramina addenda sunt. Si in angusto no-
xa est, duo: si latius patet, tria: septaq; eorum
excidenda: & tum scalper utrinque ad rimam
agendus, sic vt luna tum sinum faciat, ima q; pars
eius intus ad fracturam, cornua ad os integrum
spectent. Deinde, si qua labent, & ex facili re-
moueri possunt, forfice ad id facta colligenda
sunt, maximeq; ea quæ acuta membranam inse-
stant. Si id ex facili fieri non potest subiicienda
lamina

lamina est, quam custodem eius membrana esse
proposui, et super eam quicquid spinosum est, &
intus eminet, excidendum est: eadē lamina quic-
quid deorsum insedit attollendum. Hoc genus cu-
rationis efficit, ut qua parte fracta ossa tamē in-
herent, solidentur: qua parte abrupta sunt, sine
ullo tormento sub medicamento tēpore excidant,
spatiumq; inter hæc satis illi magnū ad extrahen-
dam sanie relinquatur, plusq; in osse propugna-
culi cerebrum habeat, quā habiturum fuit eo
exciso. His factis, ea membrana acri aceto resper-
genda est, ut siue aliquid sanguinis ex ea pro-
fluit, cohibeatur: siue intus concretus cruor rema-
net, discutiatur. Tum idem medicamentū eodem
modo, qui suprapositus est, mollitum, ipsi mem-
brana imponendū est. Ceteraq; eodem modo fa-
cienda sunt, quæ ad linteolum illitum & lanam
succidam pertinent, collocandusq; is loco in tepi-
do, & curandum quotidie vulnus, bis etiā astate.
Quod si membrana per inflammationem in-
tumuerit, infundenda erit rosa tepida. Si vsq; eò
tumebit, ut super ossa quoq; emineat, coërcebit
eam benetrita lenticula, vel folia vitis contrita,
& cum recenti vel butyro vel adipe anserino
mixta, ceruixq; molliri debet, liquido cerato
ex irino facto. At si parū pura membrana vi-
debitur, par modus eius emplastri & mellis mi-
scendus erit, idq; sup̄ infundendū, eiusq; conti-
nendi causa unū aut alterū linamentū inycien-
dum, & super linteolo cui emplastrū illitum sit,

I conteg

contegendum. Vbi plus pura membrana est, eadem ratione adijciendū emplastro ceratū, vt carnem producat. Quod ad abstinentiā verò & primos vltioresq; cibos potionesq; pertinet, eadē quæ in vulneribus præcepi, seruāda sunt: eò magis, quò periculosius hæc pars afficitur. Quinetiā cum iam non solum sustineri, sed ali his quoque apparebūt, tamen erunt vitanda quæcunq; mandanda sunt, item famus, & quicquid excitat sternutamentū. Spem verò certam faciunt membrana* mobilis ac sui coloris, caro increscens rubicunda, facilis motus maxillæ atq; cernicis. Nota signa sunt, membrana immobilis, nigra, vel liuida, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, neruorū vel resolutio, vel distentio, caro liuida, maxillariū rigor, atq; cernicis. Ceteraq; quæ ad somnū, cibi desiderii, febrem, puris colorem attinent, eadem quæ in cæteris vulneribus, vel salutaria vel mortifera sunt: vbi bene res cedit, incipit ab ipsa membrana: vel si os eo loco duplex est, inde quoque caro increscere, eaq; id quod inter ossa vacuum est, replet, nonnunquam etiam super caluariam excrecit. Quod si incidit, inspergenda squama æris est, vt id reprimat, cohibeatq; ea carni superdādo, quæ ad cicatricem perducant. Omnibusq; ea locis commode inducitur, excepta frontis ea parte, quæ paulum super id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, vt per omnem ætatem sit exulceratio, quæ linteolo medicamentum habente contegenda sit.

fit. Illa utiq; capite fracto seruanda sunt, ut donec iam valida cicatrix erit, soluenda vitentur, frequens balneum, maior vini modus.

De narium fractarum curatione. CAP. V.

IN naribus verò & os & cartilago frangi solet, & quidem modo aduersa, modo à latere si aduersa facta sunt, alterumue ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur: si à latere os fractum est, is locus cauus est: si cartilago, in alteram partem nares declinatur. Quicquid in cartilagine incidit, excitandū leniter est, aut subiecto specillo, aut duobus digitis utrinque compressis. Deinde in longitudinem implicata linamenta & molli pellicula cincta circumfusaq; , intus adijcienda sunt. Aut eodem modo compositū aliquid ex arido penicillo. Aut grandis pinna, gummi vel sabrili glutine illita, & molli pellicula circumdata, quæ desidere cartilaginem non sinat. Sed si aduersa ea fracta est, æqualiter utraq; naris implenda est. Si à latere, crassius esse debet ab ea parte in qua nasus iacet, ab altera tenuius, id quod inseritur. Extrinsecus autem circumdanda habena est mollis, media illita mistis inter se similia & thuris fuligine, eaq; ultra aures ducenda, & fronti duobus capitibus agglutinanda est. Id enim corpori quasi gluten inhaerescit, & cum induruit, nares comode continet. Sin quod intus inditum est ledit, sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excicatæ nares eadē tantūmodo habena

continendæ sunt. Deinde, post quatuordecim dies idipsum demendum est. Resolvitur autem aqua calida, eaq; tum is locus quotidie fouendus est. Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est; atq; ubi aduersum id ictum est, utraque naris implenda est: ubi à latere, ea inquam os impulsum est, imponendumq; ceratum, et paulo vehementius deligandum est, quia callus eo loco non ad sanitatē tantummodo, sed etiam ad tumorē increscit. A tertio die fouendum id aqua calida est, tantoq; magis, quanto propius esse sanitati debet. Quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda, imponendaq; extrinsecus eadem habena, et super eam ceratum, neque ultra fascia adhibenda est. At si quod fragmentum undique resolutum cum ceteris non glutinabitur, intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere fereatur, velsella verò extrahetur. Finitisq; inflammationibus, imponetur aliquod medicamentum ex ijs, quæ leniter reprimunt. Peius est, ubi aut ossi, aut cartilagini fracta, cutis quoque vulnus accessit. Id admodum raro fit: si incidit illa quidem, nihilominus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt. Cuti verò superimponendum emplastrum aliquod ex his, quæ recentibus vulneribus accommodata sunt, sed insuper nullo vinculo deligandum est.

De aurium fractarum curatione. C A P. VI.
In

IN aure quoq; interdum rumpitur cartilago: quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentū est. Sape enim suppurationem prohibet, & aurem cōfirmat. Illud & in hac, & in naribus ignorari non oportet: non quidem cartilaginem ipsam glutinari, circa tamen carnem increfcere, solidariq; eum locum. Itaq; si cum cute cartilago rupta est, cutis vtrinq; sutur. Nunc autē de ea dico, quæ cute integra frangitur. In ea vero si iam pus natum est, aperienda altera parte cutis, & ipsa cartilago contrā lunata plaga excidenda est. Deinde utendum est medicamento leniter supprimente, quale lyciū est aqua dilutū, donec sanguis fluere desinat. Tum imponendum linteolum cum emplastro: sic ut pingue omne vitetur, & à parte posteriore lana mollis auri subijcienda est, quæ quod est inter hanc & caput compleat. Tum ea leniter deliganda est, & à tertio die vapore, ut in naribus posui, fouenda. Atq; in his quoq; generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec inflammatio finiatur.

De maxillæ fractæ curatione, deq; quibusdam ad omnia ossa pertinentibus. C. A. P. VII.

AB his ad maxillā vēturus, indicanda quædam puto cōmuniter ad omnia ossa pertinentia, ne sæpius eadē dicenda sint. Omne igitur os modò rectum ut lignum in longitudinē finditur, modò frangitur transversum, interdum obliquum: atq; id ipsum nonnunquā retusa habet ca-

pita, non nunquam acuta. Quod genus pessimum est, quia neque facile committuntur, quæ nulli retuso innituntur, & carnem vulnerat, interdum nervum quoque aut musculum. Quinetiam aliquando plura fragmenta à fragmento fiunt. Sed in alijs quidem ossibus ex toto sepe fragmentum à fragmento recedit. Maxilla verò semper aliqua parte etiam vexata, ossa inter se coheret. Igitur in primis digitis duobus utrinque prementibus, et ab ore, & ab cute omnino ossa in suam sedem compellenda sunt. Deinde si transversa maxilla fracta est, sub quo casu ferè dens super proximum dentem excedit, ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes: aut si hi labant, ulteriores inter se seta deligandi sunt. Id in alio genere fracturæ superuacuum est. Cetera eadem facienda sunt. Nam linteolum duplex madens vino & oleo superiniiciendum, cum eadem simila, & eadem thuris fuligine est. Deinde aut fascia, aut mollis habena media in longitudinem incisa, ut utrinque mentum cõplectatur, & inde capita eius supra caput adducta ibi deligantur. Illud quoque ad omnia ossa pertinens dictum erit, famem primum esse necessariam: deinde à die tertio humidum cibum, sublata inflammatione paulo plenior, eumque qui carnem alat: per omne tempus vinum esse alienum. Deinde tertio die resolui debere: foverique per spongiam vapore aque calidæ, eademque quæ primo fuerunt superdari. Idem die quinto fieri, et donec inflammatio finiatur, quæ vel octavo die, vel

vel septimo fere resolvitur. Ea sublata rursus ossa esse tractanda, ut si quod fragmentum loco suo non est, reponatur. Neq; id esse soluendum, nisi due partes eius temporis, intra quod quæq; ossa conferunt, transierint. Fere verò intra quartumdecimum & unum & vigesimum diem sanescunt, maxilla, mala, iugulum, pectus, latus, os scapularum, costæ, spina coxarum, os tali, calx, manus, planta. Inter vigesimum & trigesimum diem crura, brachiaq;. Inter septimum & vigesimum & quadragesimum, humeri & femina. Sed in maxilla illud quoq; adijciendum est, quod humidus cibus diu assumendus est. Atq; etiã cum tempus processit, in lagano, similibusq; alijs perseverandum, donec ex toto maxillã callus firmarit. Item utiq; primis diebus habendum silentium.

De Iuguli fracti curatione. CAP. VIII.

Iugulum verò si transversum fractum est, nunquam per se rursus recte coit, & nisi movetur, sanari sine iunctura potest. Nonnunquam verò, maximeq; ubi motum est, elabitur, fereq; id quod à pectore sub id quod ab humero est, in posteriorem partem inclinatur. Cuius ea ratio est, quod per se non movetur, sed cum humeri motu consentit. Itaq; eo subsistente, sub id humerus agitur. Raro verò admodum in priorem partem iugulum inclinatur, adeo ut magni professores nunquam se vidisse memorie mandarint. Sed locuples tamen eius rei autor Hippocrates est. Verum ut dissimilis uterq; casus est, sic quedam

disimilia requirit. Vbi ad scapulas iugulum tendit, simul extra manu plane propellendus in posteriorem partem humerus est, & illud in priorem attrahendum. Vbi ad pectus conuersum est, ipsum quidem retro dandum, humerus autem in priorem partem adducendus est. Ac si is inferior est, non id quod à pectore est, deprimendus est, quia immobile est, sed humerus ipse attollendus. Si casu superior est, id quod à pectore est, implendum lanna, et humerus ad pectus deligendus est. Si acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet: ex ossibus ea, quæ carnem vulnerant, præcidenda sunt: tunc reclusa ossa committenda sunt. Si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est, in vino & oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemque intus incerato, ne fascia diducatur, quæ iugulo composito circumdanda est sæpius potius, quam valentius. Quod ipsum quoque in omnibus ossibus fractis perpetuum est. A dextro vero iugulo, si id fractum est, ad alam sinistram, à sinistro ad dexteram. Rursusque sub ala sua fascia-ri debet. Post hæc si iugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus: si in partem priorem, ad ceruicem deligandum est. Supinusque homo collocandus, cæteraque eadem facienda, quæ supra comprehensa sunt. Sunt verò plura ossa fere immobilia, vel dura, vel cartilaginosa, quæ vel franguntur, vel forantur, vel colliduntur, vel finduntur, ut mala, pectus, latus, os scapularum costæ,,

costæ, spina costarum, os tali, calx, manus, plantæ. Horum omnium eadem curatio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est. Quo sanescente rimas quoque ossis, aut si quod ferrumen est, callus implet. Si cutis integra est, & os læsum esse ex dolore colligimus, nihil aliud, quam quiescendum, imponendumque ceratum est, & leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

De costarum fracturarum curatione. CAP. IX.

Propriè tamen quadam de costa dicenda sunt, quia iuxta viscera est, grauioribusque periculis is locus expositus est. Hæc quoque igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars eius, quæ rara est, lædatur: interdum sic, ut eam totam is casus pertrahat. Si tota fracta non est, nec sanguis expuitur, nec febricula sequitur, nec quicquam suppurat, nisi admodum raro, nec dolor magnus est, tactu tamen is locus leniter indolescit, abunde est eadem quæ supra scripta sunt, facere, & à media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem hæc cutem inclinet. Ab vno vero & vigesimo die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum. Cibis vberioribus est utendum, ut corpus quam plenissimum fiat, quo melius os vestiatur, quod illo loco teneram adhuc iniuriæ sub tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, pulvis, & quicquid

quid vel tussim vel sternutamentum mouet, ne spiritum quidem magnopere continere expedit. At si tota costa perfracta est, casus asperior est. Nam & graues inflammationes, & febris & suppuratio, & sæpe vitæ periculum sequitur, & sanguis spuitur. Ergo si vires patiuntur, ab eo brachio quod super eam costam est, sanguis mittendus est. Si nō patiuntur, alius tamen sine ullo acri ducēda est, diutiusq; inedia pugnandum. Panis verò ante septimum diem nō assumendus, sed vna sorbitione viuendum, imponendumq; ei loco ceratum ex lino factum, cui cocta quoq; resina adiecta sit, aut Polyarchi malagma, aut pannaces ex rino & rosa & oleo, superq; imponenda lana succida mollis, & due fasciæ à medijs orsæ, minimeq; astrictæ. Multo verò magis omnia vitanda, quæ suprā posui, adeo, vt ne spiritus quidem sæpius mouendus sit. Quod si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, vel ex trixagine, vel ex ruta, vel ex herba stæchade, vel ex cumino & pipere. Grauioribus verò doloribus vrgentibus, cataplasma imponi quoq; conueniet vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adiecta. Et id quidem interdium superiacebit. Noctu verò idem aut ceratum, aut malagma, aut panni, quia potest cataplasma * quæq; decidere. Ergo quotidie * quoq; resoluetur, donec iam cerato aut malagmate possumus esse contenti, et decem quidē diebus extenuabitur fame corpus, ab undecimo verò alii incipiet. Ideoq; etiam

etiam laxior quàm primo fascia circumligabitur, fereq; ea curatio ad quadragesimū diem perueniet: quæ si modus erit suppurationis, plus malagma quàm ceratum ad digerendū proficiet. Si suppuratio vicerit, neque per quæ suprà scripta sunt discuti potuerit, omnis mora vitanda erit, ne os infrà vitietur: sed qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perueniat, idq; effundēdū. Si nusquam caput se ostendit, ubi maxime pus subit, sic intelligimus: creta similia totum locum illinimus, & siccari patiemur: quo loco maxime humor in ea perseverauit, ibi pus proximum erit, eaq; vri debeat. Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandū, demittendū erit linimentum, aut aliquid ex penicillo, quod summum lino sit deuinctum, vt facile educatur. Reliqua eadem, quæ in cæteris aduētis facienda sunt. Vbi purum erit vlcus, ali corpus debeat, ne tabes perniciofa futura id malum subsequatur. Nonnunquam etiam leuius ipso osse adfecto, & inter initia neglecto, nō pus, sed humor quidam muccis similis, intus coit, mollescitq; contrà cutis, in qua simili vstione vtendum est.

De spinæ curatione.

IN spina quoq; est quod proprie notemus. Nā si id ex vertebra excidit, aliquo modo fractum est, locus quidem concauus fit, punctiones autem in eo sentiuntur, quia necesse est ea fragmenta spinosa esse. Quo fit, vt homo in interio-

rem

rem partem subinde nitatur. Hec noscendæ rei causa sunt. Medicamentis verò iisdem opus est, quæ plurima parte huius capitis exposita sunt.

De humerorum, brachiorum, femorum, crurum, digitorum fractorum vel euulso-
rum, communibus curationibus.

C A P. X.

Similes rursus ex magna parte casus curationesq; sunt humeris & femoribus. Comuni etiam quædam humeris, brachijs, femoribus, cruribus, digitis. Siquidem ea minime periculose media franguntur. Quo propior fractura capiti vel superiori vel inferiori est, eo peior est. Nam & maiores dolores adfert, & difficilius curatur. Ea maxime tolerabilis est simplex, transversa: peior, ubi fragmēta, atq; ubi obliqua: pessimum ubi eadē acuta. Nonnunquam aut fracta in his ossa in suis sedibus remanent: multo sæpius excidunt, aliudq; super aliud effertur. Idq; ante omnia considerari debet, & sunt notæ certæ. Si suis sedibus mota, resima, pūctionisq; sensum repræsentant, tactu inæqualia sunt. Si verò non aduersa, sed obliqua iunguntur, quod fit ubi loco suo non sunt, membrum id altero latere breuius est, & musculi eius tument. Ergo si hoc depressum est, protinus id mēbrum oportet extendere. Nam nervi, musculiq; intenti per ossa contrahuntur, neq; in suū locum veniunt, nisi illos per vim aliquis intendit. Rursus, si primis diebus id omissum est, inflammatio oritur. Sub qua & difficile & periculose vis nervis adhibetur. Nam distentio

disfentio neruorum, vel cancer sequitur, vel certum, ut ^{et} diutissime alatur, pus. Itaq; si antè re-^{mitissimè}posita ossa non sunt, postea reponenda sunt. Intendere autem digitū vel aliud quoq; membrum, si adhuc tenerū est, etiam vnus homo potest, cum alteram partē dextra, alteram sinistra prendit. Valentius membrum duobus eget, qui in diuersa contendunt. Si firmiores nerui sunt, ut in viris robustis, maximeq; eorum feminibus & cruribus euenit, habent quoq; vellinteis fascijs vtrinq; capita articularum deliganda, et per plures in diuersa ducenda sunt. Vbi paulò longius quàm naturaliter esse debet, membrum vis fecit: tum demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt, indiciumq; ossis repositi est, dolor sublatu. Et membrum alteri parti equatum inuoluendum duplicibus triplicibusve pannis, & in vino & oleo tinctis, quos linteos esse commodius est. Ferè verò fascijs sex opus est. Prima breuissima adhibenda, quæ circa fracturam teruoluta sursum versum feratur, & quasi in cochlea serpat, satisq; est eam ter hoc quoq; modo circuire. Altera dimidio longiore, eaq; qua parte os eminet, ab ea si totum æquale est, vndelibet super fracturam debet incipere priori aduersa, deorsumq; tendere, atq; iterum de fractura reuersa in superiore vltra priorem fasciam desinere. Super has injiciendum latior linteus ceratum est, quod eas contineat, ac si qua parte os eminet, triplex ea pannis obijciendus, eodem vino &

no & oleo madens. Hac tertia fascia comprehendenda sunt, quartaq; sic ut semper insequens priori aduersa sit, & tertia tantum in inferiore *faciant parte, tres in superiore *finiant, quia satius est sepius circuire, quàm adstringi. Siquidem id quod adstrictum est, alienatur, & cancro opportunum est: articulum autem quàmminime vincire opus est. Sed si iuxta hunc os fractum est, necesse est. Deligatum verò membrum in diem tertium continendum est. Eaq; iunctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non tamen laxa visa sit, secundo laxior, tertio iam penè resoluta. Ergo tum rursus id membrum deligandum, adyiciendaq; prioribus quinta fascia, iterumq; quinto resoluendum est, et sexto fascijs inuoluendum, sic ut tertia & quinta infra, ceteræ supra finiantur. Quotiescūq; autem soluitur membrum, calida aqua fouendū est. Sed si iuxta articulis fractura est, diu instillandū vinum est, exigua parte olei adiecta, eadēq; omnia facien-
 * adeò da donec * ab eo inflammatio soluatur, vel leuius quoq; quàm ex consuetudine id membrum fiat. Quod si septimus dies nō dedit, certè nonus exhibet. Tum facillime ossa tractantur. Rursus ergo si parum commissa sunt, committi debent. Si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponēda sunt. Deinde eodē modo membrum deligādū, ferulaq; superaccommodāda sunt, quæ fissæ circumpositæq; ossa in sua sede contineant: & in quam partem fractura inclinat, ab ea latior, valentiorq; ferula impon

imponenda est. Easq; omnes citra articulum esse oportet resimas, ne hūc ledant, nec ultra astringi, quā ut ossa contineant: & cum spatio laxentur, tertio quoq; die paulū habenis suis coartari: ac si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere donec duæ partes eius temporis quod os quoq; conseruet compleantur, postea leuius aqua calida fouere, quia primo digeri materiam opus est, tum euocari. Ergo cerato quoque liquido id *leniter est vngendū, perfricandaq; summa cu- *pleniter tis est, laxiusq; id deligandum est. Tertio quoq; die soluendum sic, ut remota calida aqua, cetera eadem fiant. Tantummodo singule fasciæ quoties resolute fuerint, subtrahantur.

De fracti humeri curatione.

HAec communia sunt. Illa propria. Siquidem humerus fractus, non sic, ut mēbrum aliud intenditur. Sed homo collocatur alto sedili, medicus autem humiliore aduersus. Vna fasciæ brachium amplexa ex ceruice ipsius qui laesus est, id sustineat. Altera ab altera parte super caput data, ibi accipit nodū. Tertia iuncto imo humero deorsum demittitur, ibi quoq; capitibus eius inter se iunctis. Deinde ab occipitio ipsius, minister sub ea fasciā quam secundo loco posui, correpto: si dexter humerus ducendus est, dextro: si sinister, sinistro brachio, demissum inter femina eius qui curatur baculum tenet: medicus super eam fasciā de qua tertio loco dixi *pal- *plamam inijcit dextrā: si sinister, sinistrā: si dexter humerus

humerus sumatur, simulq; alteram fasciam minister attollit, alteram premit medicus: quo fit, ut leniter humerus extendatur. Fascijs verò, si medium aut inum os fractum est, brevioribus opus est: si summum, longioribus, ut ab eo sub altera quoq; ala per pectus & scapulas porrigantur. Protinus verò brachium cum deligatur, sic inclinandum est id quod afficit, ut ante fascias quoq; sic figurandū sit: ne postea suspensum aliter, aliter cum deligabatur, humerū inclinet. Brachioq; suspenso, ipse quoq; humerus ad latus leniter deligandus est. Per quæ fit, ut minime moveatur, ideoq; ossa sic se habēt, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus esse earum longissimæ debent, à lacerto breviores, sed sub ala brevissimæ. Sæpius eæ resoluendæ sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est, ne ibi nervi rigescant, & inutile brachium efficiant. Quoties solutæ sunt, fractura manu continenda, cubitus aqua calida fovendus, & mollicerato perfricandus, ferulaq; vel omnino non imponenda cōtra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores sunt.

De brachij fracti curatione.

AT si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrunque comminutum sit, non quòd alia in eiusmodi casu curatio admouenda, sed primū, ut valentius extendatur, si utrunq; os fractum est: quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosq;

eosq; intendente. Deinde, vt curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam vbi alterum integrum est, plus opis in eo, quàm in fascijs, ferulisq; est. Deligari autem brachiū debet paulum pollice ad pectus inclinato. Siquidem is maxime brachij naturalis habitus sit, idq; inuolutum mitella commodissime excipitur, quæ latitudine ipsi brachio, per angustis capitibus collo inijcitur, atque ita commodè brachium ex ceruice suspensum est. Idq; paulum supra cubiti alterius regionē pendere oportet. Quod si ex summo cubito id factum sit, glutinare id vinciendo alienum est. Fit enim brachium immobile, ac si nihil aliud quàm dolori occursum est, idem qui fuit eius vsus est.

De crurum femorumq; fracturum curatione.

IN crure aequè ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. Commune verò ei femoriq; est, quod vbi deligatum est, in canalem coniiciendum est. Is canalus ab inferiori parte foramina habet, per quæ si quis humor excesserit, descendat: & à planta moram, quæ simul & sustineat eam, & delabi non patiatur: & à lateribus caua, per quæ loris datis mora quidem crus femurq; vt collocatum est, detineat. Esse etiam is debet à planta, si crus fractum est, circa poplitum: si femur, vsq; ad coxam: si iuxta superius caput femoris, sic vt ipsa quoq; ei coxa sit. Neq; tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri breuius, quia nunquam in antiquum statum

K reuert

reuertitur, summisq; digitis postea cruris eius insisti, sed multa tamen femori debilitas est, vbi fortune negligentia quoq; accessit.

De fracti digiti curatione.

*furculū **D** Igitum satis est ad unum*furunculum post inflammationem deligari.

Communes curationes ad humeros, brachia, crura, femina, digitosq; con fractos, pertinentes.

H Is proprie ad singula membra pertinentibus, rursus illa communia sunt: primis diebus fames: deinde tum, cum iam increfcere callum oportet, liberalius alimentum, longa à vino abstinentia, fomentum aquæ calidæ, dum inflammatio est, liberale, cum ea desit, modicum. Tum etiam longior vlterioribus è liquido cerato membris, & mollis tamen vinctio. Neq; protinus exercendum id membrum, sed ad antiquos vsus reducendum est. Grauius aliquanto est, cum ossis fracturæ carnis quoque vulnus accessit, maximeq; si id musculi femoris aut humeri senserunt. Nam & inflammationes multo grauiores & promptiores cancros habent. Ac semur quidem, si ossa inter se cesserunt, ferè præcidi necesse est. Humerus verò quoque in periculum venit, sed facilius conseruatur. Quibus periculis etiam magis id expositum, quod iuxta ipsos articulos ictum est. Curiosius igitur agendum est, & musculus quidem per mediam plagam transuersus præcidendus. Sanguis verò, si parum fluxit, mittendus: corpus inedia extenuandum, ac reliqua quidem

dem membra lentius intendenda, & lenius in
 his ossa in suam sedem reponenda sunt. His verò
 neq; intendi nervos, neq; ossa tractari satis ex-
 pedit. Ipsiq; homini permittendum est, vt sic ea
 collocata habeat, quemadmodum minime lædunt.
 Omnibus autē his vulneribus imponendum pri-
 mo linamentum est vino madens, cui rosæ paulum
 admodum adiectum sit: cetera eadem deligan-
 da fasciis sunt aliquanto quàm vulnus latiori-
 bus, laxius scilicet, quàm si ea plaga non esset,
 quanto facilius & alienari & occupari cancro
 vulnus potest, * numeris potius fasciarum id *numere
 agendum est, vt laxæ quoque æquè contineant.
 Quod in femore humeroq; sic fiet, si ossa forte re-
 ctè concurrerint: sin aliter se habebunt, eatenus
 circumdari fascia debet, vt impositum medicā-
 mentum contineat. Cetera eadē quæ suprà scripsi,
 facienda sunt, præterquam quòd neq; ferulis, neq;
 canalibus, inter quæ vulnus sanescere non potest,
 sed pluribus tantummodo & latioribus fasciis
 opus est, ingerendumq; subinde in eas est cali-
 dum oleum & vinum, magisq; in * principio fa- * prima
 me vtendum, vulnus calida aqua fouendum, frigusq;
 omni ratione vitandum est, & transeundum ad
 medicamenta, quæ puri mouendo sunt, maiorq;
 vulneri quàm ossi cura agenda. Ergo quotidie
 soluendum nutriendumq; est. Inter quæ si quod
 paruulum fragmentum ossis eminet, id si retu-
 sum est, in suam sedem dandum: si acutum, antè
 acumen eius longius est præcidendum: si bre-
 uius,

uius, limandum, & utrinq; scalpro limandum,
tum ipsum recondendum est: ac si id manus fa-
cere non potest, volsella, quali fabri utuntur, in-
ijcienda est, recte se habenti capite ab ea parte
qua sima est, ut ea parte qua gibba est, eminens
os in suam sedē compellat. Si id maius est, mem-
branulisq; cinguntur, sinere oportet ea sub medi-
camentis resolui, idq; os, ubi iam nudatum est,
abscindere: quod maturius scilicet faciendum est,
prodestq; ea ratione & os coire, & vulnus sa-
nescere. Illud suo tempore, hoc prout se habet.
Nonnunquam etiam in magno vulnere euenit,
ut fragmenta quadam velut emoriantur, neque
cum ceteris coeant. Quod hic quoque ex modo
fluentis humoris colligitur. Quo magis necessa-
rium est, sepius vlcus soluere atq; nutrire. Se-
quitur vero, ut id os per se post aliquot dies ex-
cidat, cum tam misera antea conditio vulneris sit,
tamen id interdum maius diutiusq; facies. Sape
enim integra cutis ossē abrumpitur, protinusq;
prurigo & dolor oritur. Quae soluere, si accidit,
maturius oportet, & fouere aqua per astatē fri-
gida, per hyemem egelida: deinde ceratum myr-
teum imponere. Interdum fractura quibusdam,
velut aculeis carnem vexat, quo à prurigine &
punctionibus cognito, aperire id melius, eosq;
aculeos præcidere necesse habet. Reliqua verò
curatio in utroque hoc casu eadem est, quae ubi
ictus protinus intulit puro iam vlcere. Cibus hic
quoque utendum est carnem producentibus, si
breuius

breuius adhuc membrum est, & ossa loco suo non sunt, paxillus tenuis quam leuissimi generis inter ea demitti debet, sic ut capite paulum supra vlcus emineat, isq; quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus remouendus, vulnus sanandum est, cicatrix inducta fouenda frigida aqua est, in qua myrtus, hederæ, aliæ'ue similes verbenæ sint: illinendumq; medicamentum quod siccet, et magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur. Si quando verò ossa non confuerunt, quæ sæpe soluta, sæpe mota sunt, in aperto deinde curatio est: possunt enim coire. Si vetustas occupauit, membrum extendendum est, ut aliquid ledatur. Ossa inter se manu diuidenda, ut concurrendo exasperentur, ut si quid pingue est, eradatur, totumq; id quasi recens fiat. Magna tamen cura habita, ne nerui musculi'ue ledantur. Tum vino fouendum est, in quo malicorium decoctum sit, imponendumq; id ipsum oui albo mistum. Tertio die resoluendum, fouendumq; aqua, in qua verbenæ, de quibus supra dixi, decoctæ sint. Quinto die idem faciendum, feruleq; circundandæ. Cætera & antè & post eadem faciendæ, quæ supra scripsi. Solent tamen interdum diuersa inter se ossa * cohærere. Eoq; * conferuere breuius membrum & indecorum fit: & si re: vel co- capite acutiora sunt, adsidue punctiones sentiuntur. Ob quam causam frangi rursus ossa & dirigendi debent. id hoc modo fit: Calida aqua multa

membrum id fouetur, & ex cerato liquido perfricatur, intenditurq; & inter hæc medicus pertractans ossa: vt adhuc tenero callo manibus ea diducit, compellitq; id, quod eminet in suam sedem: & si parum valuit, ab ea parte, in qua os se inclinat, inuolutam lana regulam obijcit. Atq; ita deligando assuescere iterum vetustæ sedi cogit. Numquam autem recte quidem ossa cœperunt, superincreuit verò nimius callus, ideoq; locus intumuit. Quod vbi incidit, diu leniterq; id membrum perfricandum est ex oleo & sale & nitro, multumq; aqua calida salsa fouendum, & imponendum malagma quod digerat, astringensq; alligandum, oleribusq; & præterea vomitu vtendum. Per quæ cum carne callus quoq; extenuatur, confertq; aliquid de sinapi, quod cum ficu in alterum pariter membrum impostum, donec id paulum erodat, eoq; euocet materiam. Vbi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitæ reuertendum est.

De luxatis ossibus.

CAP. XI.

AC de fractis quidem ossibus hætenus dictum sit. Mouentur autem ea sedibus suis duobus modis. Nam modò quæ iuncta sunt inter se dehiscunt, vt cum latum scapularum os ab humero recedit, & in brachio radius à cubito, & in crure tibia à sura, interdum à saltu, calcis os à talo, quod raro tamen fit. Modò articuli suis sedibus excidunt. Antè de prioribus dicam. Quorum vbi aliquid incidit, protinus is locus cauus est,

est, depressusq; digitus sinum inuenit. Deinde
grauis inflammatio oritur, atque in talis præci-
pua. Siquidem febres quoque & caneros &
neruorum vel distentiones vel rigores, qui ca-
put scapulis annectunt, mouere consuevit. Quo-
rum vitandorum causa facienda eadem sunt,
quæ in ossibus mollibus læsis: ubi aliquid inci-
dit, protinus his locis proposita sunt, ut dolor tu-
morq; per ea tollantur. Nam diducta ossa nun-
quam rursus inter se iunguntur, & ut aliquid
decoris eo loco sit, nihil usus admittitur. Maxil-
la verò & vertebra omnesq; articuli cum vali-
dis nervis comprehendantur, excidunt: aut vi
expulsi, aut aliquo casu nervis vel ruptis vel in-
firmatis: faciliusq; in pueris & adolescentulis,
quàm in robustioribus: hiq; elabuntur in prio-
rem & in exteriorem partem, quidam omnibus
modis, quidam certis. Suntq; quedam communia
omnium signa, quedam propria sunt cuiusq;. Si-
quidem semper ea parte tumor est, in qua os pro-
rumpit: ea sinus, à qua recessit. Et hæc quidem
in omnibus deprehenduntur, alia verò si in singu-
lulis. Quæ simulatq; de quoq; dicam, proponen-
da erunt. Sed ut excidere omnes articuli non
possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim
nonnunquam compellitur, neque in spina verte-
bra, neq; ea maxilla quæ utraq; parte prolapsa
antequam reponeretur, inflammationem mouit.
Rursum qui nervorum vitio prolapsi sunt, com-
puli quoque in suas sedes iterum excidunt. At

K 4 quib

quibus in pueritia exciderunt, neq; reposita sunt, minus quam ceteri crescunt. Omniumq;, quæ loco suo non sunt, caro ea increscit, magisq; in proximo membro, quam in vltiore. Vt puta si humerus loco suo non est, maior in eo ipso fit, quam in brachio: maior in hoc, quam in manus acie. Tum pro sedibus & pro casibus qui inciderunt, aut maior aut minor vsus eius membri relinquitur: quoq; in eo plus vsus superest, eo minus id extenuatur. Quicquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa occupauit, tum conquiescat, lacescendum non est: vbi finita est, tentandum est in his membris, quæ id patiuntur. Multum autem eo confert & corporis & neruorum habitus. Nam si corpus tenue, si humidum est, si nerui infirmi, expeditius os reponitur. Sed & primo facilius excidit, & postea minus fideliter continetur. Quæ contraria his sunt, melius continent. Sed id quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem leuare, super succida lana ex aceto imposita. A cibo, si valentioris articuli casus est, triduo: interdum etiam quinque diebus abstinere debet. Bibere aquam calidam dum sitim finiat. Curiosiusq; hæc facere his osibus motis, quæ validis plenisq; musculis continentur: si verò etiam febris accessit, multo magis: deinde ex die quinto fouere aqua calida, remotaq; lana ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoque adiecto donec omnis inflammatio

matio finiatur. Tunc infriktionem ei membro adhibere, cibis uti bonis, uti vino modice, iamq; ad usus quoque suos id membrum promouere: quia motus ut in dolore pestifer, sic aliàs saluberrimus corpori est. Hæc communia sunt, nunc de singulis dicam.

De maxillæ luxatæ curatione. CAP. XII.

Maxilla in priorem partem propellitur, sed modò altera parte, modò utraque. Si altera, in contrariam partem ipsa, mentumq; inclinatur, dentes paribus non respondent, sed sub his qui secant canini sunt. At si utraque, totum mentum in exteriorem partem promouetur, inferioresq; dentes longius quàm superiores excedunt, intentiq; super musculi apparent. Primo quoque tempore homo in sedili collocandus est, sic ut minister à posteriore parte caput eius contineat: vel sic, ut iuxta parietem is sedeat, subiecto inter parietem & caput eius scorteo puluino duro: eoq; caput per ministrum vrgeatur, quo sit immobilis. Tum medici digiti pollices linteolis vel fascijs, ne dilabantur, inuoluti in os eius coniungendi: ceteri extrinsecus admo- uendi sunt. Vbi vehementer maxilla apprehensa est, si vna parte procidit, concutiendum mentum, & ad guttur adducendum est. Tunc simul & caput apprehendendum, & excitato mento maxilla in suam sedem compellenda, & os eius comprimendum est, sic ut omnia penè vno momento fiant. Si in utraq; parte prolapsa est, eadem

K 5 dem

dem omnia facienda, sed equaliter retro maxilla agenda est. Reposito osse, si cum dolore oculorum & cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus verò quorum ossa mota sunt, primo liquidior cibus conveniat, tum his precipue, adeo ut sermo quoque frequenti motu oris per nervos ledat.

De capite luxato.

CAP. XIII.

CApud duobus processibus in duos sinus summae vertebrae demissis, super cervicem contineri in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt, quo fit, ut nervus sub occipitio extendatur, mentum pettori adglutinetur, neque bibere, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat. Quibus celerrime mors superuenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio eius rei ulla sit, sed ut res indicijs cognosceretur, & non putaret sibi medicum defuisse, si qui sic aliquem perdidissent.

De spina luxata.

CAP. XIII.

Idem casus manet eos, quorum in spina vertebrae exciderunt. Id enim non potest fieri, nisi ex medulla, quae per medium, & duabus membranulis, quae per duos à lateribus processus feruntur, & nervis, qui continent, ruptis. Excidunt autem & in posteriorem partem, & in anteriorem, & supra septum transversum, & infra. Si in utranque partem exciderint, à posteriore parte vel tumor, vel sinus oritur. Si super septum
id

Id incidit, manus resolvitur, vomitus aut distensio nervorum insequitur, spiritus difficulter movetur, dolor urget, & aures obtusae sunt. Si sub septo, femina resolvuntur, urina supprimitur, interdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex eiusmodi casibus, ut tardius quam ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. Nam quod Hippocrates dixit, vertebra in exteriorem partem prolapsa, pronum hominem collocandū esse, & extendendū, tum calce aliquem super ipsum debere consistere, id intus impellere: in his accipiendum est, quae paulum excesserunt, non in his, quae toto loco mutatae sunt. Nonnunquam enim nervorum imbecillitas efficit, ut quamvis non exciderit vertebra, paulum tamen in priorē partem promineat. Id non iugulat, sed ab interiore parte non contingit quidem posse: ab exteriori si propulsum est, plerumque iterum redit: nisi, quod admodum rarum est, vis nervis restituta est.

De humero luxato.

C A P. X V.

Humerus autem modò in alā excidit, modò in partem priorē. Si in alā delapsus est, & victus cubitus recedit ab latere, rursum iuxta eiusdem partis aurem cum humero porrigi non potest, longiusque altero id brachium est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen quam naturaliter, difficiliusque in priorem partem quam in posteriorē cubitus porrigitur. Igitur si in alā humerus excidit, & vel puerile adhuc est corpus vel molle, certe

certe & imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili, & ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat, alteri ut brachium extendat: ipsum posteriore parte residentem humerum sub ala eius cogere, simulq; & latum os, & altera manu brachium eius ad latus impellere. At si vastius corpus nerviue robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, & quæ crassitudinem duorum digitorum habet, & longitudine ab ala ad digitos peruenit. In qua summa capitulum est rotundum, & leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In ea binæ foramina tribus locis sunt inter se spatio distantibus, inq; ea lora mollia coniunguntur. Eaq; spathula fascia inuoluta, quo minus tactu laedat, ad alam à brachio dirigitur, sic ut caput eius summa ala subiiciatur. Deinde, loris suis ad brachium deligatur, vno loco paulum infra humeri caput, altero paulum supra cubitum, tertio supra manum. Cui rei protinus intervalla tunc quoque foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum super scale gallinariae gradum traicitur, ita alte, ut consistere homo ipse non possit, simulq; in alteram partem corpus demittitur, in alteram brachium intenditur. Eoq; fit ut capite ligni caput humeri impulsus, in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas alias esse rationes scire facile est vno Hippocrate lecto, sed non alia magis usu comprobata est.

ta est. At si in priorem partem humerus excidit, supinus homo collocandus est, fasciaq; aut habena media ala circundanda est, capitaq; eius post caput hominis ministro tradenda, brachium alteri: precipiendumq; ut ille habenam, hic brachium extendat. Deinde, medicus caput quidem hominis sinistra debet repellere, dextra verò cubitum cum humero attollere, & os in suam sedem compellere, faciliusq; id in hoc casu, quàm in priore reuertitur. Reposito humero, lana alæ subijcienda est. Si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur. Si in priore parte, ut tamen commodius deligetur. Tum fascia primum sub ala obvoluta, caput eius debet comprehendere, deinde profectus ad alteram alam, ab eaq; ad scapulum, rursusq; ad eiusdem humeri caput tendere. Sapiusq; ad eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. Vinctus hac ratione humerus commodius continetur. Si adductus ad latus sit, ad id quoque fascia deligatur.

De Cubiti luxati curatione. CAP. XVI.

IN cubito autē tria coire ossa, humeri, & radij & cubiti ipsius, ex his quæ prima parte huius voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus qui innexus humero est ab hoc excidit, radius qui adiunctus est, interdum trahitur, interdum subsistit. In omnes verò quatuor partes excidere cubitus potest: sed si in priorem prolapsus est, extantum brachium est, neq; recuruatur. Si in posteriorem, brachium curuum est, neque
extend

extenditur, breuiusq; altero est. Interdum febrem vomitumq; bilis mouet. Si in exteriorē interiorē uē brachium porrectum est, sed paulum in eam partem à qua os recessit recuruatum, quicquid incidit, reponendi ratio una est. Neq; in cubito tantum est, sed in omnibus quoq; mēbris longis, quæ per articulum longa testā iunguntur. Vtrunq; membrū in diuersas partes extendere, denec spatium inter ossa liberum sit. Tum id os quod excidit ab ea parte, in quā prolapsus est, in cōtrariam impellere. Extendendi tamen alia atq; alia genera sunt, prout nerui valent, aut ossa huc illuc uē sederunt. Ac modò manibus solis vtendum est, modò quedam alia adhibēda. Ergo si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duas manus, interdum etiam habenis iniectis satis est. Deinde rotundum aliquid à lateris parte penēdum est, & super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in alijs casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quæ fracto cubito suprā posita est, & tum ossa reponere. Reliqua curatio eadem est, quæ in omnibus. Celerius tantum & sepius id resoluendum est, multoq; magis aqua calida fouendum, diutius ex oleo & nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius, quàm in illo alio articulo, siue extra remansit, siue intus reuertit, callus circumdatur, isq; si per quietem increuit, flexus illius postea prohibet.

De Manu luxata.

C A P. XVII.

Manus

Manus quoque in omnes quatuor partes prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi digiti non possunt: si in priorē, non inclinantur: si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut pollicem, aut ad minimum digitum cōuertitur. Reponi non difficilime potest. Super durum locum & renitentē ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet, sic ut prona sit: si in posteriorem partem os excidit, supina: si in priorem, si in interiorem exteriorē, ue, in latus. Vbi satis nerui diducti sunt, si in alterutrum latus procidit manus, brachium in contrarium repellendum est. At his, quæ in priorem posteriorem, ue partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid, idq; supra prominens os manu urgendum est, per quod vis adiecta facilius in suam sedem compellit.

De Palma.

CAP. XVIII.

IN palma quoq; ossa interdū suis sedibus promouentur, modo in priorem partem, modo in posteriorem. In latus enim moueri paribus ossibus oppositis non possunt. Signum id solum est, quod omnium commune est, tumor ab ea, in quam os venit: sinus ab ea, a qua recessit. Sed sine intentione digitorum, tantummodo bene pressum os in suam sedem reuertitur.

De digitis.

CAP. XIX.

AT in digitis totidem ferè casus, eademq; signa sunt, quæ in manibus. Sed in his extendendis non æque vi opus est, cum & articuli breuior

breuiiores, & nervi minus validi sint. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem, vel in posteriorem partem exciderunt, tum iam palma compelli, atque id quod in latus elapsum est, digitis restitui.

De Femore.

CAP. XX.

Cum de his dixerim, de his quoque quæ in cruribus sunt, videri possum dixisse. Si quidem etiam in hoc casu quædam similitudo est femori & humero, & tibiæ & cubito, pedi & manui. Quædam tamen separatim quoque de his dicenda sunt. Femur in omnes quatuor partes promouetur, sæpius in interiorem, deinde in exteriorē, raro admodum in priorem, aut posteriorem. Si in interiorem partem prolapsum est, crus longius altero & vastius est: extra enim pes ultimus spectat. Si in exteriorē, breuius rarumque fit, & intus inclinatur, calx ingressu terram non contingit, sed planta ima, meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu fert, minusque baculo eget. Si in priorē crus extensum est, implicarique non potest, alteri cruri ad calcem par est: sed ima planta minus in priorē partem inclinatur, dolorque in hoc casu præcipuus est, & maxime vrina supprimitur. Vbi cum dolore inflammatio quieuit, commode ingrediuntur, totusque eorum pes est. Sed & si in posteriorē extendi non potest crus, breuiusque est, ubi constitit, calx quoque terram non contingit. Magnū autem femori periculum est, ne vel difficulter

ter reponatur, vel repositū rursus excidat. Quidā iterum semper excidere contendunt, sed Hippocrates & Diocles, & Philotimus, & Nileus, & Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriae prodiderūt. Neq; tot genera machinamentorum quoque ad extendendum in hoc casu femur, Hippocrates, Andreas Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, Faber quoq; quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut hac falsa opinio est, sic illud verum est. Cum ibi valentissimi nerui, musculiq; sint, si suum robur habent, vix admittere: si non habent, postea non continere. Tentandum igitur est, & si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab inguine, alterā à genu intendi. Si validius, melius adducent, qui easdem habenas ad valida bacula deligarint: tumq; eorum fustium imas partes oppositae morae obiecerint, superioresq; ad se utraq; manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrū super scamnū, cui ab utraq; parte axes sunt, ad quos habenae illae deligantur, qui ut in torcularibus conuersi, rumpere quoq; si quis perseuerauerit, non solum extendere nervos & musculos possunt. Collocandus autem homo super id scamnum est, aut pronus, aut supinus, aut in latus: sic ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsus est: ea etiam inferior, à qua recessit. Nervus extentis in priorem os venit, rotundum aliquid super inguen ponendum, subitoq; super id,

L genu

genu adducendum est eodem modo, eademq; de causa, qua idem in brachio fit, protinusq; si complicari femur potest, intus est. In ceteris vero casibus, ubi ossa per vim paulum inter se recesserunt, medicus debet id quod eminet, retro cogere, minister contra inde coxam propellere. Posito osse, nihil aliud novi curatio requirit, quam ut diutius is in lecto detineatur, ne si motum adhuc nervis laxioribus femur fuerit, rursus erumpat.

De Genu.

CAP. XXI.

CEnu quoq; & in exteriorem, & in interiorem, & in posteriorem partem excidere notissimum est, in priorem non prolabi pleriq; scripserunt. Potestq; id verò proximum esse: cum idem opposita patella, ipsa quoq; caput tibiae contineat. Medici tamen eum cui in priorem partem excidisset, à se curatum esse memorie prodidit. In his casibus intendi nervi rationibus ipsdem quas in femore retuli, possunt. Et id quidem quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoq; eo crure reconditur. Cetera verò manibus simul, tum ossa in diuersas partes compelluntur.

De Tal.

CAP. XXII.

Talus in omnes partes prolabitur. Vbi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in exteriorem partem convertitur. Vbi huic contrarius talus, contrarium etiam signum extat. Si in priorem partem erumpit, à posteriore latus nervus durus & insanus est, minusq; is opus est: si
in

in posteriorem, calx penè conditur, plaga maior fit. Reponitur autem is quoq; per manus, prius in diuersa pede & crure diductis. Et in hoc quoq; casu diutius in lectulo perseverandum est, ne is talus, qui totum corpus sustinet, parum cōfirmatis nervis ferendo oneri cedat, rursusq; prorumpat. Calceamētis quoq; humilioribus primo tempore vtendum, ne iunctura talum ipsum lædat.

De Planta.

CAP. XXIII.

Planta ossa iisdem modis quibus in manu, prodeunt, iisdemq; conduntur. Fascia tantummodo calcem quoq; debet comprehendere: ne cum mediam plantam imumq; eius vinciri necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorē recipiat, ideoq; suppuret.

De Digitis.

CAP. XXIIII.

In digitis nihil vltra fieri debet, quàm quod in his qui sunt in manu, positum est. Potest tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo cōtineri. Hæc faciendæ sunt in his casibus, vbi sine vulnere ossa exciderūt. Hic quoq; & ingens periculum est: & eo grauius, quo maius membrum est, quo'ue validioribus nervis aut musculis continetur. Ideoq; humeris, femoribusq; metus mortis est, ac si reposita ossa sunt, spes nulla est. Non repositis tamen, nonnullum periculum est. Eoq; maior in utroque timor est, quo propius vulnus articulo est. Hippocrates nihil tuta reponi posse, præter digitos & plantas & manus dixit, atque in his quoq;

L 2

dilig

diligenter esse agendum, ne præcipitarent. Quidam brachia quoq; & crura reposuerunt. Et ne cancri, distentionesq; nervorum orirentur, sub quibus in eiusmodi casu fieret mors matura, sanguinem ex brachio miserunt. Verum ne digitus quidem in quo minimum ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet ante inflammationem, aut postea cum iam vetus res est. Si reposito quoq; osse nervi distenduntur, rursus id protinus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neq; repositum est, sic iacere convenit, ut maxime cubantem iuvet, tantum ne moveatur, ne'ue dependeat. In omniq; tali morbo magnum ex longa fame præsidium est. Deinde ex curatione eadem quæ proposita est, ubi ossibus fractis vulnus accessit. Si nudum os eminet, impedimento semper futurum est. Id quod excedit, abscindendum est. Imponendaq; super arida linamenta sunt & medicamenta non pingua, donec quæ sola esse in eiusmodi re sanitas potest, veniat. Nam & debilitas sequitur, & tenuis cicatrix inducitur, quæ necesse est facile noxa postea pateat.

FINIS.

533
Q. SERENI
SAMONICI
VITA.

Q. Serenus Samonicus Gordiani iunio-
ris praeceptor fuit: cuius meminit Spar-
tianus in Caracalla, his verbis: Occisi sunt & in
balneis plures, & in cœnis: inter quos Samoni-
cus Serenus, cuius libri plurimi ad doctrinam
extant. Macrobius quoq; Saturnalium ter-
tio, carmina quadam de urbibus de-
nouendis in libro quinto Recondi-
torum Samonici Sereni repe-
rissè se ait. Supersunt ho-
die hi hexametri,
praecepta Me-
dicinae con-
tinen-
tes.

L 3

Q. SERENI SA-
MONICI DE ME-
DICINA PRAE-
CEPTA SALV-
BERRI-
MA,

Antonij Molinij Matifconensis opera, di-
ligenter emaculata.



EMBRORV M series certo de-
ducta tenore

Vt stet, & assimilis medicina de-
fluat ordo,

Principio celsa de corporis arce loquamur.

Phæbe salutiferū, quod pangimus, asserere carnē,

Inuentumq; tuum prompto comitare fauore.

Tuq; potens artis, reduces qui tradere vitas

Noſti, & in cælum manes reuocare sepultos,

Qui colis Aegeas, qui Pergama, quiq; Epidaurū,

Qui quondam placidi tectus sub pelle draconis,

*teſta Tarpeias arces, atq; inclyta*templa petiſti,

Depellens tetros præſenti numine morbos,

*locutus Huc ades, & quicquid cupido mihi ſepe*rogati

Firmaſti, cunctum teneris expone papyris.

Capiti medendo.

B Alſama ſi geminis inſtillans auribus ad-
dis,

Tum poteris alacrem capitis reparare vigorem.

Vel

*Vel quæ septenis censentur gramina nodis,
 Vtiliter vectis, vel corno ex arbore sertum,
 Pulegium' re potens vna super aure locabis,
 Aut illud misto* recoquens clementer aceto, *coctum
 Cautam nare trahes: seu visco lintea nexo
 Induces fronti: seu tritæ gramina mentæ.
 Spōgia cum tepidis annexa liquoribus hymbris
 Profuit: aut hedera ex oleo* colata vetusto. *decocta
 Profuit & cochleis frontem tractare minutis.
 Si nocuit cerebro violentia solis aperto:
 Sape chelidonia ex acido perducta liquore
 Sanant: profunt & amica papauera somno,
 Si prius in lento madesacta* terantur oliuo. *coquantur*

Hemicranio medendo.

Portio si capitis morbo tentetur acuto,
 Allia diuersam lana contecta per aurem
 Inducta profunt, & eodem balsama pacto.
 Allia vel ternis piperis terna addita granis,
 Trita lines: certam dabit hæc tibi cura salutem.

Porrigini depellendæ.

Est insensibilis morbus, sed noxia forma.
 Cum caput immensa pexu porrigine ningit,
 Copia farris vti frendentibus edita saxis.
 Hanc poterit malue radix decocta leuare.
 Aut tu fœniculum, nitrumq; & sulphura viua
 Contere, deinde caput permistiis ablue cunctis:
 Furfuribus' re nouis durum miscebis acetum,
 Ut varios crines tali des vngvine puros.
 Prodest & tarda demptus testudine sanguis.

L 4

Et

Et prodest cedro demissus ab arbore succus.
 Desinet interea glomerari farrea nubes,
 Cessabitq; grauis crebra porriginis hymber.

Capillo tingendo.

Quos pudet etatis longa, quos scilicet senectus
 Offedit, cupiunt properos abscondere canos,
 Et nigrum crinem fucō simulare dolo,
 His prodest acri contrita cupressus aceto,
 Vel frons lentisci, vel tristia poma sabuci:
 Lumbrici quoq; terre stercus miscentur oliuo,
 Et iuuenem praestant rediuiuo flore capillum.
 Praeterea niueum poterit depellere crinem,
 Resina ex facili cara viscoq; coacta.
 Ad rutilam speciem nigros flauescere crines,
 Unguento cineris praedixit Tullius autor.
 Si pragnans artus captiui soricis edit,
 Dicuntur foetus nigrantia lumina fingi.

Phibituali arcenda.

Noxia corporibus quaedam de corpore nostro
 Progenit natura, volens abrumpere somnos
 Sensibus, et monitis vigiles incendere curas.

Plin. li. 7. Sed quis non paueat Pherocydis fata tragædi,
 cap. 31. Qui nimio sudore fluens animalia tetra

Eduxit, turpi miserum quæ morte tulerunt.

Plin. li. 7. Sylla quoq; infelix tali languore peresus
 cap. 44. Corruit, et foedo se vidit ab agmine vinci.

Sæpius ergo decet mordax haurire sinapi,
 Vel nitro ac sale permistis, acidoq; liquore
 Laxatis (ut sint simul allia) tangere corpus,

Aut

*Aut lacrymis hederæ, aut succo*perducere cedri *perfun-
 Quin etiam furfur misto medicatur aceto. dere
 Vnda maris lendes capiti deducit iniquas,
 Et quicquid cerebri defendit sylua capilli.*

Prurigini, papulis, ac scabiei arcendis.

Illotus sudor, vel copia nobilis escæ
 Sæpe graui scabie correptos asperat artus.
 Ergo lutum prodest membris adhibere fricatis,
 Quod facit ex asino siccatus corporis humor.
 Nec pudeat tractare finum, quem bucula fudit.
 Stercoris ex porco cinerem confundito lymphis,
 Sic pauidum corpus dextra parcente foueto.
 Proderit ox oleo puluis, quem congerit alte
 Dulcibus ex latebris patiens formica laborum.
 Conuenit hinc tepido lita tradere corpora soli.
 Feruentes papulas*oleo curato liquenti, *papyro
 Aut acido Baccho miscebis farræ lupini,
 Atq; hinc in calido percurres membra lauacro,
 Pruritus autem salso leuat humor aceti,
 Siue maris*rabidi sudor, cochleæq; minutæ, *anidi
 Quarum contactu perimetur acerba libido.

Phrenesi, & capiti purgando.

EX vitio cerebri Phrenesis furiosa mouet,
 Amissasq; resert frendens amētia vires,
 Siue calens febris iactatos exedit artus,
 Siue meri gustus, seu frigoris efficit aura,
 Conueniet calidis pecudum pulmonibus aptè
 Tempora languentis medica redimire corona.
 Illotis etiam lanis suffire memento.

L 5 Ceritum

Ceritum sæpe horrendi medicantur odores,
 Atq; ideo sanos etiam curarier est par.
 Purgatur cerebrum mansa radice pyrethri,
 Ungitur & succis, dederit quos parua sabucus,
 Expressusq; hederæ mandatur naribus humor.
 Aut mistum rutæ cerebro instillatur acetum.
 Non semper præsens dolor est sanabilis: ergo
 Cura magis prodest venturis obuia morbis.

De fluore capillorum, & maculis
 capitis tollendis.

D Efluit expulsus morbo latitante capillus,
 Si raro lauitur, seu vis epota veneni,
 Seu salamandra potens, nullisq; obnoxia flâmis,
 Eximium capitis tactu deiecit honorem.
 Nonnunquã variant maculæ, paruisq; parumper
 Orbibus aspersum ducit noua vulnere tempus,
 Vipereæ pellis cinerem his* addito rebus,
 Robore as' ve pilis vsino iungito sæno,
 Vel testudineo mala permulceto cruore.

*apponi-
to

Humoribus, & perfrictionibus
 medendis.

S Acpe ita puadit vis frigoris, ac tenet artus,
 Vt vix quasito medicamine pulsa recedat.
 Si ranam ex oleo decoxeris, abijce carnem,
 Membra foue: parili sanat ratione rigorem
 Vrticæ semen, perceptaq; frigora vincit.
 Et ceruina potest mulcere medulla rigorem.
 Decoctum raphani semen cum melle vorabis,
 Siue fel vsinum tepesacta dilue lymphæ.

Proderit

Proderit hoc potu, seu cassis ostreatestis
 Vsta dabit cinerem, qui pro sale sumptus in escis
 Decutiet gelidum calefacto vertice virus.
 Nonnullus liquidum sumit mulsumq; sinapi,
 Atq; palato agitat retinensq; vomensq;.
 Allia nonnulli mandunt, olei'ue liquore
 Perfundunt calido cerebrum, nasiq; latebras.
 Quidam lactucæ credunt prodesse sapes,
 Curandi modus hic & suavis & utilis idē est.

Elephantiasis propellendæ.

Est elephas morbus tristi quoq; noīe dirus,
 Non solum turpans infandis ora papillis,
 Sed cita præcipitans funesto fata veneno.
 Huic erit aduersus cedri de cortice succus,
 Mustelaq; cinis, vel fusus sanguis ab illa.
 Nonnulli dixerē serum prodesse bibendo.
 Mentastri folium potu, apposituq; salubre est.
 Nec frustra bulbos & sulphura iungu aceto.
 Præterea nitrum debes cum melle iugatum
 Spargere lacte bouis, varias sic ungere frontes.
 Cerussam, & chartā, quā gens Aegyptia mittit,
 *Thure simul misceq; oleū, quod flore rosarum *Tunde
 Conditum est: line sic faciem, sic redde salutem.

Cutis & faciei vitijis propellendis.

Inuida si maculet faciem lentigo decoram,
 Nec prodesse valent naturæ dona benigne,
 Erucam atq; acidum laticem simul illine malis.
 Proderit & bulbis mellis dulcedine victus,
 Cruda' re dulcacido miscebis rapa liquori.

Sanguis

Sanguine vel leporis morbus delabitur oris.
 Frons salicis cum flore suo contrita medetur.
 sanant Sepiolæ cineres ex ossibus omnia tollunt.
 Cygneos adipēs, hilari misceto Lyæo,
 Omne malum propere maculoso ex ore fugabis.
 Horrebit si liuor atrox, aut nigra cicatrix,
 Attrito saponē genas purgare memento
 Rugarum sulcos lentisci mastice tendens.
 Si verò vitium est quod ducit ab impete nomen,
 Hoc matutina poteris cohibere salina,
 Seu folio platani, quod mansum mane vorabis.
 Fæda fluunt curui quæ purgamenta cameli,
 Vrentur, cineremq; dabunt, iungentur aceto
 Mascula thura simul, diuinaq; cura valebit.

Aurium vitij succurrendis.

Cum saeuus teneras dolor alte sauciat aures,
 Fraxinea in flammis fundit quæ tales succi
 Instilles, siue obscænos ex virgine rores,
 Aut succum ex folio, dederit quæ populus alba.
 Sæpe chelidonia rapidum sociatur acetum,
 Adiunctoq; nitro procedit cura salubris.
 Mentastri liquor expressus conducere fertur,
 Infectum violis oleum bene consulit auri.
 Annosa rubros si legeris arbore vermes,
 Ex oleo tere, sic tepidos infunde dolenti.
 moriēt Si verò obtusa sensus remoretur in aure,
 Lumbricos terræ, seuumq; ex anserē rauco
 Excoque: sic veterem poteris depellere morbum.
 Felq; bonis surdis etiam prodesse loquuntur,
 Si iun

Si iungas olide graue quod minxere capelle.
Si vero*incantus animal penetrauerit aures, *in patu-
Proderit admisto pauidi fel muris aceto. lus
At si lymphia nocens peruaserit, anseris aptus
Immittetur adeps ceparum non sine succo:
Qui grauis est oculis, sensum tamē auribus auget.
Vus & Phœbigene diuinam discere curam,
Sitq; vel annosis confecta doloribus auris,
Allia tum septem numero, septemq; lupinos
Cretaceam dabis in testam: tum delphica frondis
Addatur, misto totum seruescat aceto,
Doctus eris tepidos illinc immittere rores.

Oculorum dolori mitigando.

Summa boni est alacres hominum contingere visus,
Quos quasi custodes, defensoresque periculi
Prospiciens summa natura locavit in arce:
Sic tamen ut nullos paterentur desuper ictus,
Atque supercilio pauidi tegerentur opaco.
Sed dolor immeritum lumen si forte lacescit,
Lana madens oleo noctu connectitur apte,
Viventis' ve nepae lumen gestatur amicum.
Ex folio caulis cineres, confractaque thura
Et laticem Bacchi sortae cum lacte capellae
Desuper induces, atque una nocte probabis.
Hyblaei mellis succi cum felle caprino
Subveniunt oculis dira caligine pressis.
Vettonica mansus siccabit lumina succus.
Si tenebras oculis obducit pigra senectus,
Expressae marathro gutta cum melle liquenti
Deter

Detergere malum poterunt, vel vulturis atrī
 Fella, chelidonie fuerint quīs gramina mista,
 Hæc etiam annosis poterunt succurrere morbis.
 Fel quoq; de gaillo mollitum simplice lymphā
 Exacuet pueros dempta caligine visus.
 Siue columbarum fimus miscetur aceto,
 Seu fel perdicis parili cum pondere mellis.
 Vina Chelidonie simili ratione iugantur,
 Efficiuntq; suo præclaros vngvine visus.
 Aspera quinetiam mulcent & rupta reducunt.
 Si genus est morbi, miserū quod lumen adurit,
 Hic calor infuso mitescit lacte canino.
 Anguibz ereptos adipēs ærugine misce,
 Hi poterunt ruptas oculorum iungere partes.
 *plūbum Si verò horrēdum ducent glaucomata *peplum,
 Spiritus alterius prodest, qui grana cumini
 Pallentis mandens visus exhalat in ipsos.
 *infestat, Si tumor *insolitus typho se tollat mani,
 rufos & Turgentes oculos vili circumline cæno.
 gliscit in
 orbes,

Dentium vitio, & oris fœtori
 medendo.

H Aud facile est acrē dentis tolerare dolorē,
 Quo magis ē æquū medicā p̄noscere curā.
 Cum Baccho violas decoxeris, ore teneto,
 Nolanus item prodest succis oleaster acerbis:
 Hinc oscedo fugit, linguae quoq; vulnera cedunt.
 Cum vino piper & nitro tepidum inde dolenti.
 Sæpe chelidonie succo vel lacte capellæ
 Sanescunt dentes, aut tauri felle iuuantur.

Aut

*Aut acidi latices clauso voluntur in ore.
 Manditur apta rubus gingiuis, & bona labris.
 Lentiscus myrtusq; emendant oris odorem.
 Quod verò assumpsit nomen de dente fricando,
 Cernuo ex cornu cinis est, aut ungula porcæ
 Torrida, vel cinis ex ouis, sed non sine vino,
 Muricis aut tostis, vel bulbi extincta favilla.
 Ambitiosa putas, sunt ista salubria cunctis.
 Exesos autem dentes si forte querêris,
 Vre finum muris, patulis & hiatibus adde,
 Vel cinerem dentis cernui extingueret aceto
 Conuenit, atq; cauis immittere partibus apte.
 Prodest & pulvis lumbrici corpore tosto.
 Ora ambusta cibo sanabis lacte canino.
 Sæpe etiam gelida gingiuas collue lymphæ,
 Dentibus ut firmum possis seruare vigorem.
 Si verò infandum proserpit ad intima vulnus,
 Permisceto salem parili cum pondere thuris,
 Hinc tractato locum, miram experiere medelam.
 Aut tu sume pilam quæ caudis hæret ouinis:
 Hæc siccata dabit molles, & fracta farinas,
 Huius & attritu tetrum mulcebitur vlcus.*

Vuæ, faucibus, collo, & quæ mollienda sunt, medendis.

A Egrescunt teneræ fauces, cū frigoris atris
 Vis subijt, vel cum ventis agitabilis ær
 Vertitur, atq; ipsas flatus grauis insicit undas:
 Vel rabidus clamor fracto cum forte sonore
 Planum radit iter sic est Hortensius olim.

Absump.

Absumptus causis. etenim confectus agendis
 Obtulit, cum vox domino viuente periret,
 Et nondum extincti moreretur lingua disert.
 Ergo omni studio quares inhibere dolorem.
 Simplicibus lymphis confunditur aërium mel,
 Additur excussus niuea similagine fursur,
 Decocta hæc clauso simul exercentur in ore.
 Præterea fauces extrinsecus ungere prodest
 Ursino & tauri seuo cerisq; remis,
 Omnia quæ geminis æquabis lancibus antè.
 Disce etiã miram ex humili medicamine curã.
 Aëliaco melli iungas agreste papauer.
 Decoctumq; simul mandes, mansumq; vorabis.
 Crinitæ porri radices quinq; coquantur,
 Hinc aqua non feruens voluatur fauce sonora,
 Nec tamẽ in stomachũ descendat gutta patentẽ.
 Si verò adflictam langor deiecerit vnam,
 Tunc horas aliquot pronus recubare memento,
 Aut illam pulvis tostus releuabit anethi,
 Aut cinis ex cochlea, vel torrida brassica flãmis.
 Verum angina sibi mistum sale poscit acetum,
 Quod refert clauso versatum agitare palato.

De rigore ceruicis.

AT si ceruices, duratq; colla rigeant,
 Mira loquar, geminus mulcebit vnguine
 Hic lögũ pariter nervos medicina seqt, (poples,
 Anseris aut pingui torpentia colla fouebis.
 Illinitur valido multum lens cocta in aceto,
 Aut caprae finus, et bulbi, aut ceruina medulla,
Hoc

Hoc etiam immotos flectes medicamine nervos.
 Quos autem vocitant tolles, attingere dextra
 Debebis, qua Gryllus erit pressante peremptus.

Tussi, & choleribus medendis.

Noxia si penitus cholerum scuire venena
 Perspicias, cocta lactucæ fronde leuabis.
 Proderit & caules assumere sæpe madentes.
 Interdum fauces tussi quatiuntur atroci,
 Alliatum sumes decocta, & melle peruncta,
 Semina vel raphani permixto dulcia melle.
 Aut si fraxinea semen de fronde reuellis,
 *Interiora vora retitus contingere dente. *Integrio
 Ouum melle teres domitum feruentibus undis, ra
 Marrubiiue potēs, hæc faucibus optima sumes,
 Franabisq; grauem facili medicamine tussim.

Digestioni, & stomacho medendo.

Qui stomachum regem totius corporis esse
 Contendunt, vera niti ratione videntur.
 Huius enim validus firmat tenor omnia mēbra:
 At contra eiusdem franguntur cuncta dolore.
 Quin etiam (nisi cura iuuat) vitare cerebrum
 Fertur, & integros illinc auertere sensus.
 Lactucæ semen nigrae quod lignea pila
 Triuerit, admixto ieiunus sumito melle,
 Sed cochlear trinum gustu tibi sufficit vno,
 Aut tritum semen raphani, mulsumq; iuuabit:
 Siue duæ partes absynthi, & tertia rutæ
 Decoctis potantur aquis, siliquæq; madentes,
 Semina vel marathri scætæ cum lacte capellæ.

M

Puleg

Pulgium quoq; decoctum curabit amicum.
 Et potu, & fotu stomacho conducit acetum.
 Seu cochleas undis calefactas ac propè victas
 Suppositis torre prunis, vinoq; garioq;
 Persusas cape, sed prodest magis esse marinas.
 At male digestis si crapula sauiet escis,
 Ex pipere, & calida florem de rore marino
 Ebibe, seu salibus piper adde, & tenue cumini.
 *tanges Quae coctis*tinges epulis, & rapta vorabis.
 *aceti Aut cubitum pergens succū cape tristis*anethi.
 Ventriculis mergi raptus sal tritus & vltus
 Tosto pane super, piperis quoq; puluere multo
 Miscentur, capies diuinum munus in istis.
 Proderit hoc stomacho, uictas & cōcoquet escas,
 Grana peregrini piperis diffundito quinq;
 Niliaco melli, quae mane inserta capeffes.

elli, vomitui, vel phthisi arcendis.

L Vicia si crescunt, & cunctis noxia sella,
 Allia parua nouē, piperis tot pmole grana,
 Quae cyatho diluta gari mandesq; bibesq;
 Haec iterum septena capis, post deniq; quina.
 Praeterea caules, frondet si parua sabucus,
 Decoctos sale permisces, ac iungis oliuo.
 Tunc capis, ac tali auxilio sella horrida purgas.
 Profunt & pelagi latices, quos pondere in isto
 Dulcibus associas lymphis, melliq; liquenti.
 Et niueus prodest ex vbere succus asellae,
 vinum Si tepido vino infundas, ac mella piperq;
 At vomitum radix narcissi pota mouebit.
 Si verò phthifis annofo sedet improba morbo,
 Intritat

Intritas vino cochleas hausisse iuuabit.
 Proderit & veteris seui pila sumpta suilli.
 Carne asinae seuoq; caprae medicina salubris.

Mammis sanandis, vel stringendis.

Vbera secundo multum lactantia succo
 Saepe sibi noxae nimium manando fuerunt:
 Fece igitur valida duri reprimuntur aceti.
 Post partu tumidas iniuste assurgere mammas
 Interdum aspicias, harum mala commemoratur
 Murinus finis ex pluuio sedare liquore.
 Sin autem clausas penitus dolor angit acerbis,
 Lumbricis terrae turgentes unge corymbos.
 Si castigatas studium est prestare papillas,
 Ex hedera fertis ambas redimire memento
 Protinus, & raptas fumis mandare coronas,
 Anseris aut seuum pariter cum lacte tepenti,
 Aut ouum* illinito tulerit quod garrula perdix. *aliàs, im
 Præterea piuuio decocta papauera rore posuitum
 Here scunt multis post* dissolucunda diebus. *absoluen
 Vis & Phœbigenæ cælestia sumere dona, da
 Vbera cum tectis laniata doloribus* horrent? *urgent
 Nauis ramētū, et quæ nomine præssior herba est,
 Et quæ vulgari sermone Insana vocatur,
 Grecos hyoscyamon propria scito dicere lingua,
 Nec non & calami radix, lapathi q; legumen
 Mistâ dabunt miras (experto crede) medelas.

Rejectioni cibi, aut sanguinis

*stringende.

*abstinen

SI stomachus nondum cōcoctas expuit escas, de.
 Et magis atq; magis vitis* reuomēdo ualescit, *recolēdo

M 2

Allia

Allia cedemus, crebrumq; trahemus odorem.
 fertur de Sin etiam rutulus confertur pectore sanguis,
Sorbitium mentæ, raphanus vel cocta iuuabit.
Sæpe lapis teritur (Specularem nomine dicunt)
Et mistis hauritur aquis, sistitq; cruorem.
 robore Vritur interdum raptus de subere cortex,
Et cinis ex calido prodest epota Lyæo,
 *pellis Quorum cinis, aut cochlearum, aut deniq; *melis,
 * Aut ci- * Aut mansus salicum fructus prodesse putatur,
 nis salicū Aut platani pilulis acri infundemus aceto,
 ramis Nullus erit sanguis, quæ non cibus iste moretur.

Iecoris, & lateris vitijis medendis.

ΕΛΕΙΣ-
 φανθ
 salvia. **S**I molles iecoris fibræ dolor hauriet acer,
Protin^o ex mulsâ potâda elelisphacus herba
Sumitur et semē, qd fraxinus alta pfudit, (est:
Vulturis atq; iecur vel ius perdiciæ apricæ.
Præterea simili drachma pix dura piperq;
Franguntur, sic in mollito puluere iuncta
Egelidis miscentur aquis, recreantq; bibentem.
Absynthi quoq; decocti potabitur humor,
Si latus immeritum morbo tentatur acuto,
Accensum tinges lapidem stridentibus vndis,
Hinc bibis, aut aceris radicem tundis, & vnâ
Cum vino capis. hoc præsens medicamē habetur.
 *cilonia *Quid referam multis composta* Philonia rebus?*
Quid loquar antidoti varijs? quis ista requirat?
At nos pauperibus præcepta feramus amica.
Nec non & iecoris quæretur fibra lupini,
Iungenturq; simul costum, foliumq; piperq;,
Quæ diluta mero dantur potanda Lyæo.

Est

*Est & vis morbi, quod telum commemoratur,
Cum subito dolor insanus furit incitus ictu,
Persicon huic potum è nuce traditur interiore,
Quæ mihi cura satis casu monstrante probata est.*

Spleni curando.

Q*Uædo lien tumido circūligat ilia uinclo,
Et plenus splenis demonstrat mēbra rigore,
Mollibus ex hedera tornantur pocula lignis,
Hinc trahet assuetos æger quoscunq; liquores,
Aut viridis coctorum holerum potabitur vnda.
Proderit exusto fluuiialis hirudo cruore,
Sive myrica potens, seu ros cum pane marinus,
Aut hederæ succus potu appositusq; iuuabit.
Nec non intactam ferro quam videris alnum,
Huic liber eripitur ferro sine, decoquiturq;
Donec victarum pars tertia subsit aquarum.
Hinc medico potu pulsus dolor omnis abibit.
Nonnulli memorant consumi posse lienem,
Eruum si semper ieiuno sumpserit ore.
Arida ficus item feruente domatur aceto,
Et trita illinitur, vel splen apponitur hædi.
Marrubium in vino potum prodesse loquuntur,
Præterea piper, ac nepetæ cum flore et anethum,
Capparis atq; apium, buglossaq; iungitur vnâ:
Horum decoctos latices potare salubre est.
Pulegium, abrotonū nitida cum massiche coctum
Ac thymbræ speciē (quam cōmemorat cephalotē)
Prædixit spleni Deus Idæ posse mederi.
Dulcia, Plautus ait, grandi munus apta lieni.
Splen tumidus nocet, et risum tamē addit ineptū,*

M 3 Vt

Vt mihi sardois videatur proximus herbis,
 Irrita quæ miseris permiscet gaudia fatis.
 Dicitur exelus faciles auferre cachinnos,
 Perpetuoq; auo frontem præstare seueram.

Præcordiis sanandis.

Languida si duro turgēt præcordia morbo,
 Mulsæ farris sextarius vnus,
 Nec non & lini tunsum, siliquaq; legumen.
 Hac decocta simul, nondumq; tepentia neçles.
 Aut quæ poma Cydon Cretæis misit ab oris
 *terres Cocta lines, durum vt possu mollire tumorem.
 Ocyma praterea, bulbi'ue linuntur amari.
 Proderit & lymphis corpus mersare marinis.
 Quin etiam catulum lactantē apponere membris
 Conuenit, omne malū transcurrere fertur in illū.
 Cui tamen extincto munus debetur humandi.
 Humanos quoq; contactus mala tanta sequitur,
 Et iunctus vitium ducit de coniuge coniux.

*irita iun Quod superest *thridaci iunges ramenta carina,
 ges Quod decem ex rebus *confit simul atq; uocatur,
 *decator- Mastichis addentur fractæ iam mollia farra.
 thoma ri- Talibus auxilijs præcordia tuta resident.
 re uocatur

Lumbis, & renibus sanandis.

Cum sauit penitis hærens iniuria lumbis,
 Igne lapis candēs datur exultatibus undis,
 Hoc poteris potus tristem superare dolorem,
 Aut pice cum melli nitrum sulphurq; et acetum
 Succida lana rapit contacta calentibus ijsilem,
 Proderit hanc agris crebro perducere membris.
 Aut caput asparagi cum vino sume vetusto,

Seu

Seu maior appone, modus conducit vterq;
 Aut adipi mistum lambis inducito sulphur.
 Sæpe chelidoniam cum succo Palladis addes,
 Farraq; que tremulis prosunt sudantia flammis.
 Fertur amygdaline succus nucis esse bibendus:
 Pinfitur, ac tepidis sorbebitur addita lymphis.
 Aut tres ex vino cochleas seruescere coges,
 Cumq; suis domibus franges, piperis quoq; grana
 Ter quinq; adijcias, potuq; iunaberis illo.
 Fursur item parca fuerit cum seruidus vnda,
 Post oleo madidus succis immittitur aptis,
 Quæ vix passuris vrentes addito membris.
 Prodest cerume* vehemens natura medulla,
 Nec nocuit ciceris coeli potasse liquorem;
 Aut mistam teneris* malua contundito porris,
 Contritumq; simul cum mastiche cõfer unctum, damq; ele
 Quodq; decẽ rebus componi ex nomine clarũ est, lissphacon
 His cõtinge locũ: Deus hæc mihi certa probauit. vndis

*succis
 *vrentia
 iungito
 *medicã
 *madi-

Ventris dolori mitigando.

SI dolor insanius tota defauit in alio,
 Heminis tribus in lymphæ tu decoque tritũ,
 In vino prius hyssopum, validam quoq; rutam,
 *Aut apium, donec pars duplex desit aquarum. * Atq;
 Potius erit medicus non detractante palato.
 Praterea niuei sterilis tostæ vritur oui.
 Quæ postquam in tetrâ fuerit conuersa farinam,
 Ex calidis potatur aquis, & pota medetur.
 Nec non iungenda est vtero noua virga myricæ,
 Illæsa hæc ferro terraq; intacta teratur.
 Aut medio ventris prodest aspergere terram,

M 4

Quam

Quam signauerunt vestigia pressa rotarum.
 Proderit & puluis facili sub cardine raptus.
 Quin etiam ex lymphis tritum potare cuminum
 Conueniet, quod iam nobis documenta probarunt.
 Menta quoq; hoc pacto medicos dabit hausta sa-
 Cæliacos autē recreabis pane salubri, (pores.
 Quem madido farre efficies, ac mollibus ouis:
 Quorum testa fero prius euanescere aceto
 Refert, & teretes bulbos mollire terendo,
 Cumq; his Lenæi durum potare fluentum.

Hydropisi depellendæ.

Corrupti iecoris vitio, vel splenis, acerbus
 Crescit hydrops, aut cū siccata febre medul-
 Atq; auidæ fauces gelidū traxere liquorē, (le
 Tum lymphæ interius vitio gliscente tumescit,
 Secernens miseram proprio de viscere pellem.
 Conueniet teneræ radix decocta sabuci
 In geminis calidi cyathis potanda Lyæi.
 Nec non & tepidis conuolues corpus arenis.
 Apposituq; lenes nepetæ, gustuq; inuabunt.
 Helleboro quoq; purgatur lymphaticus error.
 Aut huius vice quod fert semen lenta genista
 Miscetur, mulsis & cautis ducitur undis.
 Sæpe & scyllino pelluntur noxia Baccho.

nitro Est qui præualidum frixo sale miscet acetum.
 turgētia Atq; olei succo refricant albentia membra.
 Fraxineum semen cum Bacchi rore bibendū est.
 Nec non apposito curantur dropace membra,
 filicis Aut calido salicis radicem mollit Iaccho,
 Qui subito raptos ventos, succosq; reuellit.

Vnguine

Vingvine quo frangit vires languoris aquosi.

Ventri molliendo.

Saepe cibi specie, vitio vel corporis ipso,
 Potibus aut duris restricta morabitur aluus.
 Vincetur talis mora gramine Mercuriali,
 Cuius aquam coeli minimo cum melle bibemus.
 Prunæq; conueniunt, quæ mittit clara Damascus.
 Multos præterea medici componere succos
 Assuerunt: pretiosa tamen cum veneris emptum
 Falleris, frustra;q; immensa nomismata fundes.
 Quin age, & in tenui certam cognosce salutem.
 Aut igitur tectum lana supponis alumen,
 Aut edis in patinis teneræ decocta sabuci,
 Vel cum lacte capræ salsum mulsumq; capeffes.
 Crede tamen potum meliorem lactis equini.
 Dicitur hic validos asinæ peruincere succos.
 Syluestris fici lacrymam prodesse loquuntur.
 Quodq; satis melius verbis dicemus Horati
 Mugilis, & viles pellent obstantia conchæ.
 Sed cochleæ prius est vrtica aut fursure pasci,
 Purior hinc gustus noxa sine mouerit aluum.
 Sæpe thalassomeli* iunctu cumulauius hymbri,* adiecto
 Hæc purgant, parili fuerint si pondere mista.

Specie, id
 est quali-
 tate.

Solutioni ventris, & dysenterię
 compefcente.

TAm varij casus mortalia secla fatigant,
 Ut sint diuersis obnoxia corpora morbis.
 Sæpe etenim nimio cursu fluit impetus alui,
 Frenat commisso cum seruet brassica vino.
 Aut cerasi victum longo iam tempore pomum,

M S Succus

Succus aminæ vitis cum pane medetur,
 Vel bene permistum calida potatur acetum.
 Vile quidem, facile factu, tamen utile opinor.
 Si ledant medica data purgatoria dextra,
 Adiecto piperis medicatur pulvere calda.
 Sin autem longo decurrent intima fluxu,
 Atq; immane malum multo iam tempore gliscit,
 Torridus ex vino cortex potabitur oui.
 Ramentum niuei credunt prodesse elephantis.
 Arbore Pyramea cortex direpta coquetur
 Axe sub æthereo, sic nigro mista Lyæo
 Immensum poterit potu retinere fluorem.
 Numinis aut iussu cedrum cum mastiche mices,
 Mollitantiq; picæ, & rasum de navibus unguen,
 Languida quo fidens medicamine mēbra fouebis.
 Proderit & pueris quos dentis origo fatigat,
 Castaneas coxisse nuces, & sorba vetusta,
 Atq; apium, caulesq; rubus quos fundit acuta,
 Potio que fluidam consumpta morabitur aluum.

Lumbricis & tincis purgandis.

Quid nō aduersum miseris mortalib. addit
 Natura, interno cū uiscere tinea serpens,
 Et lumbricus edax uiuant inimica creanti?
 Quod genus assiduo laniat præcordia morsu.
 Sæpe etiam scandens oppletis faucibus hæret,
 Obsessasq; vias vitæ concludit anhelæ.
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus,
 Vel nepetæ tritum ex vino vel lacte capellæ,
 Nec non & succus medici potatur aceti.
 Prodest præterea cum Baccho persica frondis.

Democ

Democritus memorat mente conducere potum.
 Sumitur abrotonum, nec non et vile melanthum.
 Allia per sese sanant, aut ius coriandri.
 Quin & marrubiū decoctū haustumq; iuuabit,
 Pulegium'ue potens, & agreste iugatur anethū,
 Synthesis hac prodest vnda mollita calenti.

Colo sedando.

Cum colus inuisū morbi genus itima carpit,
 Mande galeritā volucrē quā noīe dicunt,
 Aut pauidi leporis madefacta coagula pota.
 Siue apio nepetas tereti cum mastiche iunges,
 Nec non & species ambas redolentis anethi,
 Quarum decoctos patiens haurito liquores.

Vesicę, & calculo purgando, & vring
 prouocandę.

Si cui vesicę tardus cunctabitur humor,
 Hec mora rumpetur vino peruncta uetusto,
 Predest ex paruis acinos potare sabucis,
 Aut hedere succum, aut lacrymosi trita sinapis.
 Nec non resinas ex oricia terebintho
 In speciem eruilię paruos glomerabis in orbes,
 Quos ternos tepida mistos hausisse medela est.
 Quondam etiam nimio præceptis vrina fluente
 Irrigat exuias, obscænoq; inficit hymbri:
 Ergo cinis cornu ceruini proderit haustus.
 Vel nepete ex vino tritum vel lacte capellę.
 Tum leporis cerebrum ex vino potare* decebit. *iuuabit
 Si dolor internam vesicę concoquit alium,
 Subueniet radix frondosę epota cypressi,
 Pulegium'ue potens domitū seruentibus vndis.

Si

Si vero in lapides densus conuertitur humor,
 Qui retinet cursus, gemitumq; dolore frequētat,
 *sphōgite Saxifragam seu*fontigenā succurrere credunt.
 Præterea semen myrti syluestris Iaccho,
 Atq; olco mistum bibitur, nec desit acetum,
 Vinaq; sumantur friclo condita cumino,
 Siue palumborum capitur finus acre ferorum
 Dulcacidis sparsum succis trituq; solutum,
 Necnon obscænus capræ potabitur humor.
 Obruit hic morbum, labefactaq; saxa remittit.

Conceptioni, & Partui.

IRrita coniugij sterilis si munera languent,
 Et sobolis spes est, multos iam vana per annos,
 Fæmineo fiat vitio res, nec ne, silebo:
 Hoc poterit quartus magni monstrare Lucreti.
 Sed natura tamen medicamine victa potenti
 Sæpe dedit fœtus studio curante paratos.
 Aut igitur leporis consumit fœmina vuluam,
 Aut ovis in stabulis fractas cū ruminat herbas,
 Pendentem spumam molli deducit ab ore,
 Atq; illam meminit misto potare salerno.
 Mercurialis item capitur communiter herba:
 Sic cubitum noctu coniunx festinet vterq;
 Atq; ubi iam certum spondet prægnatio fœtum,
 Ut facili vigeat seruata puerpera partu,

Qui, subau-
 di partus.

*Pulegio
 admixto ve-
 nit em-
 bryo nec
 aceto.

Dictamum bibitur, cochleæ manduntur edules,
 At qui olim menses minus octo moratus in aluo,
 Irrumpit thalamos, & nexus soluit inertes.
 *Pulegij quoq; purgati tunc conuenit humber,
 Cuius opem veram casus mihi sæpe probarunt.

Quin

Quinetiam stercus supponunt vulturis atri,
 Sētiat et minime partus quā proximus vrget. Sētiat, sub
 Oua etiam rutæ & fragili miscentur anetho, audi fœmi
 Quæ diluta simul vino, atq; exhausta medentur. na.

Profluuium cuiusq; sanguinis, & ma-
 trici subueniendæ.

SI modicus pleno manat de corpore sanguis,
 Subuenit: at nimius cū vita funditur ipsa.
 Quapropter multo naris completa cruore
 Cum fluit, attritus cimex conducit odore.
 Lana oleo madefit, sed nondum lauta rosato,
 Hæc datur in nares, vel claudet densius aures.
 Contritis prodest cochleis * perducere frontem, * obduce-
 Aut galli cerebro, vel sanguine tinge columbæ. re
 Quod nisi supprimit sanguis, potādus et ipse est.
 Præterea Pharijs caput emetire papyris.
 Detrahe quod superest, aliò genitalia nece.
 Fæmineas prodest illinc vincire mamillas,
 Menstruus immenso si profluit impete sanguis.
 Succida lana malos remoratur subdita cursus,
 Mortua quinetiam producit corpora partu.
 Sed quacunq; fluit vis immoderata cruoris,
 * Subereus cortex calidis potatur in vndis * Suber-
 Antè minutatim studio vincente terendus. nus
 Pulegij calido purgatur fœmina potu.
 Sed si forte cruor clausa cunctabitur aluo,
 Aut molles nepetæ, aut rutæ quæcūq; bibentur,
 Aut si puniceos fundit vesica liquores,
 Marrubium ex passō tritum perfunditur vndis,
 Hi poterunt haustus rutilum purgare colorem.

Reliq

*diclami Reliquias partus * eadem tibi detrahit herba.
 detr. Quod si sceminei properabit sanguinis hymber,
 Est qui frustra mole percussu decutit vno,
 Quorum aliquot lanis tectū ad praeordia neclit,
 Hæc simul incantans sisti debere cruorem,
 Et lapis ille viæ solitos iam destitit orbes.

Interneccandis, quæ oculos impediunt.

Mobilis hirsutæ horret lasciuiæ setas,
 Et gaudet raptō nudari flore pilorum.
 Sed bona nonnunquam vellendi causa videtur,
 Corpora cum releuat, ratio manifesta salutis.
 Namq; oculos infesta pilorum tela laceffunt,
 Quodq; illis dederat vallum natura tuendis,
 Inde inimica seges proprios desecuit in orbes.
 Ergo locum criminis vulsi continge cruore,
 Quæ dat aui, tremulis simulat quæ pellibus alæ.
 Præterea quasq; volēs auertere setas,
 Atq; in perpetuum rediuiua*occludere tela,
 Corporibus vulsis saniem porducito rana,
 Sed quæ parua sita est, & rauco garrula questu,
 Necnon quæ stagnis cessantibus hæsit hirudo
 Sumitur, & viuens samia terretur in olla,
 Hæc acidis iurgit permixta liquoribus artus,
 Anulsamq; retat rursus*percreescere syluam.

*obducc-
 re

*procre-
 scero

Omibus obscænis medendis.

Dicēdū, et quæ sit mēbris medicīa pudēdis.
 Languidus antiquo purgat penis Iaccho,
 Ac super illinitur fœcundæ felle capelle.
 Mane nouo myrti frondes commendare prodest
 Cui dolet, atq; illas in vulnus despuat ipsum.

Fecit

Fece etiam vini genitalia lauta lenantur,
 Et tumidos testes nereia lymphæ coërcet,
 Vel bulbi ex mulso, vel cæra immista cupresso.
 Aut saba cum tepidis Bacchi decocta fluentis.
 Ramicis immensum fertur cohibere tumorem
 Far madidum lymphæ, et serali fronde cupressi,
 Unde etiam potus frons hæc memoratur amica.
 Sin autem existit durū tibi glandibus inguen,
 Proderit induci coehleas cum melle minutæ.
 Obscænos si pone locos noua vulnera carpent,
 Horrentum mansa curantur fronde ruborum,
 At si iam veteri succedit fistula morbo,
 Mustele cinere immisso purgabitur vlcus,
 Sanguine seu ricini quem bos gestauerit antè.
 Herba chelidonia fertur cum melle mederi,
 Herbaq; cum seuo folijs de mille vocata.

Ischiæ, & articulari morbo.

Sæpius occultus victa coxendice morbus
 Perfurit, & gressus diro languore moratur,
 Populus alba dabit medicos de cortice potus,
 Necnon & teneræ gracili de fronde geniste.
 Arreptos caules, acidoq; liquore madentes
 Sumere conueniet, rubiam quoq; ducere potus,
 Aut in * amineo cochleas haurire Lyæo.
 Si verò articulos tabes mimica per omnes
 Hæserit, ex ficu betas ac melle ligabis,
 Vel pelagi latices simul & baccheia dona
 Sumere curabis, nimio sed pareito vino.
 Ennius ipse pater dum pocula siccat iniqui,
 Hoc vitio tales fertur mernisse dolores.

* alijs,
 Bithynæ
 vel irino

Furunc

Furunculo medendo.

Cum sanguis nimius puri comistus atroci
 Aestuat, & papulas altè susollit acutas,
 Resinam misces, & saxi ordea fracta.
 Consersa hæc tepidis apponere conuenit vndis.
 * hyoscyam. Vis & * hyoscyamum caræ seuoq; iugatum
 mi semen Neclere, nō minus hæc poterit medicina iuuare.
 seuumq; Prætereaq; fimum ex gallo quod legeris albo.
 Hymbribus ex acidis fidens appone dolenti.
 Auribus aut pecudum molles expromito sordes,
 Vngvine quo fōtis dabitur medicina papillis.

* tollendo

Carboni * medendo.

Horrēdus magis est, pimit q corpora, carbo:
 Vrit hic inclusus, vitalia rumpit acerbus:
 Hunc veteres quōdam varijs pepulere medelis:
 Tertia nanq; Titi simul & centesima Liui
 Charta docet ferro talem candente dolorem
 Exectum, aut poto raporum semine pulsum:
 Insecti dicens vix septem posse diebus
 Vitam produci: tanta est violentia morbi.
 * laticem Dulcacidum * laticemq; cumini semine iunges,
 cum lini Atq; fimum pariter Paphiæ compone columbæ.
 Hinc line disruptas partes, & clausa venena.
 * adoper- Præterea triti referant * & operta lupini.
 ta Nonnullus calcem viuam dissoluit aceto,
 Fumantemq; niuem papulis apponit acerbis.
 Est qui gallinæ perducatur stercore corpus.
 Allia vel piperi parce commista linuntur
 Pythagoræ cognata leui condita cumino.
 Proderit & madida fermentū polline turgens.
 Pani,

Pani, vomica, & strumæ depellendis.

Sunt alij quos dura^{*} mouet natura tumores ^{*vomit}
 Non minus horrendi, sed non ita perniciosi.
 Vomica qualis erit, vel eidem proxima quædam:
 Simplice resina miscbimus hordea tusa,
 Et mulso amnes, & purgamenta columbæ,
 His bene decoctis languentia membra fouentur,
 Mollis odorato faba iungatur coriandro.
 Proderit appositum, mollitq; aperitq; tumorem,
 Aut de phasgano radix decocta palustri,
 Quæ salis admisto tundetur condimento.
 Proderit & māsūm quod traxeris arbore visci.
 Gramen hyoscyami caræ seuoq; vetusto
 Concilia, mistisq; locos perduce dolentes.
 Exercere etiam corpus medicina potens est.
 Ouum defundes in fictile, deinde putamen
 Marrubij succo implebis, post melle liquenti
 Omnia consociata tepenti prospera potu
 Sumuntur, referantq; malum purgantq; leuantq;.

Igni sacro demouendo.

Et etiam morbi species, quæ dicitur ignis, ^{ἰγνιστέλας}
 Læguida quo multo torretur mēbra calore, ^{Grecis dici}
 Vel tu vicino seuum bovis igne remittis, ^{tur, vulgo}
 Mollitumq; limes, vel oloris fecibus oua, ^{ignis diui}
 Sed non cocta dabis, sic torrida membra fouebis. ^{Antonij.}
 Lumbricus terra misto inducetur aceto, ^{Fecibus, id}
 Aut parili noua ruta modo, sed iungis olium, ^{est, excre-}
 Quæq; cum betis prosunt sæpe illa tritu, ^{mētis, siue}
 Allia dant cinerem sociato oleoq; garoq;, ^{pinguibus,}
 Vngvine quo gliscens deponet flamma furorem, ^{hoc est ad-}
pe.

N Sæpe

Sape chelidonia pars candida iungitur oui.
 Quæ modico potu sed vili trita capeſſes,
 Admiſcere memor lymphas amnemq; ſalerni.

Podagræ depellende.

*trigemi
nas

Quædã ſunt rabide medicamina digna poda
 Cui ter^a tricenās ſpēs Epidauri^o ipſe (gra,
 Dixit ineſſe deus, requiem tamen indere morbo
 F. is crit, & triſtem ſaltem mulcere dolorem.
 Ergo age & arreptū ſaliciſ frondemq; librūq;
 Cum vino tere, ſic contrahos perline nervos.
 Aut cum pruna mali ſeſe oſtentabit origo,
 Feruida non timidis tolera cauteria plantis,
 Semineciſ'ue hirci reſerato pectore calces
 Inſere, ſic diræ reprimes primordia peſtis.
 Aut ſi corruptus perſederit altius humor,
 Trita cupreſſus ibi Baccho iungetur acerbo
 Panibus & teneris, colibebitq; addita queſtus
 Parua ſabucus item hircino collita ſeuo,
 Triticeaq; acido manantes amne farine,
 Aut nitidum ranæ decoctum viſcus oliuo,
 Siue chelidonia ſuccus ſale miſtus aceto.
 Sunt quibus appoſita ſiccatur hirūdine ſanguis.
 Non audita mihi ſit ſas, ſed lecta referre,

*ravidus
*merſit

Vide Plin.
lib. 22, cap.
25.

Hoc quidam *raptus morbo per tempora meſſis
 Vicino plantas frumenti *preſſit accruo,
 Euasitq; grauem caſu medicante dolorem.

Vulneribus ferro, aut verberibus factis.

Nature vitijs medicas obiecimur artes,
 Nunc & fortune iaculis obſiſtere par eſt.
 Si cui forte lapis teneros violauerit artus,

Necle

Necle adipēs vetulos & tritam chamæcissōn,
 Nec pudeat luteæ stercus perducere porcæ.
 Sin autem sauo laceratum est verberē corpus,
 Tum lixiua cinis ceras dissoluit & ova,
 Adnūstoq; oleo vibices comprimit atrās.
 Si verò infrēnus manat de vulnere sanguis,
 Purpura torretur conchyli perlita * succo,
 Huius & atra cinis currentem detinet undam.
 Ferruce quoq; desecta frenare cruorem
 Dicitur ambustus tyrio de vellere pulvis:
 Præterea nimios referati vulneris annes
 Peniculi cinis astringit vel simbria porri.
 Siue finis manni cum testis vritur oui,
 Et reprimunt fluidos miro medicamine cursus.

Vulneribus quibuscunque casti-
 bus factis.

TAm varia humanæ sūt vulnera cōditionē,
 Ut nequæ proprias cunctis ascribere curas.
 Iisdem igitur monitis casus* armabimus omnes, * sanabi-
 Sic tamen ut nullus medicinam clausert error. mis
 Ergo modus quicunq; obtingit vulneris atri,
 Contritus cum melle dabit medicamina bulbus:
 Herbaq; quæ felix nomen de mille recepit,
 Appositu prodest adipi permixta vetusto.
 Succida cum tepido nectetur lana Lyco.
 Ambusta'ue cinis complebit vulneris ora.
 Concludit verò vel frons vel ramus ab ulmo,
 * At succis hedera pulchrescit sæda cicatrix. * Ut

Hominis ac Simiæ morsui.

Siue homo, seu similis turpissima bestia nobis
 Vulnera dēte dedit, viris simul intulit atri,

*puro Betoniam ex *duro prodest assumere Baceha.
Necnon & raphani cortex decocta medetur,
Si trita admorsis fuerit circumlita membris.

*renenis

Serpentium moribus, & *vipetinis
excludendis

Cuspide nō quisquā lōge neq; eade carissā,
Fulmīe nō gladij, volucris nec selle sagittæ
Quā cito vipereo potis est affligier ictu.
Quare aptam dicamus opem, succosq; medētes.
Quem nocuit serpens, fertur caput illius apte
Vulneribus iungi, sanat quem sauciat ipsa:
Vtq; Larissæa curatus Telephus hastā.
Proderit & caulem cum vino haurire sabuci,
Aut coctum raphani librum tritumq; ligare,
Sive etiam excelsa folium de mole cupressi,
Aut tithymalius atrox vulnus cōtrita pungit.
Carduus est nondum doctis fullonibus aptus,
Ex illo radix tepido potatur in anni.
Cervino ex fœtu commista coagula vino
Sumuntur, quæ res membris agit atra venena.
Aut ferule radix potatur in hymbre Lyei
Betonica'ue leues, gallinae aut iura vetustæ.
Si verò horrendum vulnus fera fecerit assis,
Urinam credunt propriam conducere potu,
Varronis fuit ista senis sententia: necnon
(Plinius vt memorat) sūpti iuuat hymbes aceti.
Dicendū, et quæ sit præcox medicina timēti,
Cautio: nanq; potest diros præuerrere morsus,
Si iecur exectum tardo de vulture portes.
Erucis aut si totos perduxeris artus,

Plin. 28.
cap. 6.

Qu. 13

Quis prius attritus vehementi spargis aceto.
 Aut tu ceruina per noctem in pelle quiesces,
 Aut genere ex ipso dentem portabis amicum.
 Tóxica praterea qua sint pellenda medela,
 Expediam: sanguis poterit prodesse caninus,
 Qui facili potu antidotos imitatur honestas.
 Vis & mirificos cautius prædiscere odores,
 Accensis quibus arcetur teterrima serpens,
 Aut styracem torres, aut diri vulturis alam,
 Vel nepetā, aut frondē rigida stirpemq; myricæ.

Ictibus Scorpii, & moribus Muris
 cæci, vel Aranei.

Sunt minimæ species, sed diræ vulnere pestes,
 Quæ magis in tenui latitantes corpore fallāt,
 Scorpius ut grauis est et araneus, hæc mala semp
 Captant securos multa iam nocte sopores,
 Et documenta dedit nobis prostratus Orion,
 Magna quod exiguis perimātur* saepe venenis. *membra
 Et quum vulnus atrox incussit scorpius ardēs,
 Continuo capitur, tunc digna cæde retusus,
 Vulneribusq; aptus, fertur renocare venenum.
 Aut calidis pelagi lymphis loca lesa fouentur,
 Siue meri potu dissoluitur improba pestis.
 Ad cunctos autem morsus ictusq; minorum
 Caseus aptus erit *simæ de lacte capellæ, *pauide
 Cumq; hoc absumi debet origani herba:
 Hæc duo mirifici curabunt icta medelis.
 Necnon *peniculo calidum annectetur acetum, *fœnicu-
 Aut viuum sulphur sicci cum fece Lyei. lo
 Exiguo piperis cerebrum conspergito *galli, *melis

*Quo lita senescunt depulso membra dolore.
 Sin autem muris nocuit violentia caci,
 Quæ sola signavit voluendis orbita plaustris,
 Illinc, mira datur vili de puluere cura.*

*Subitaneo dolori, feбри, atque
 ostocopo.*

Nonnūquā existit subiti noua causa doloris
 Cuius origo latet, veris reprimēda medelis.
 Nanq; chelidonium misto sale nectere prodest,
 Velleraq; infuso recalentia sulphure sanant.
 Ostocopon lento conducit melle perungi.
 Sin autem calidæ depascent corpora febres,
 Tunc apij succus leni sociatur oliuo.
 Membra lines, fotuq; ferus mulcebitur ignis.
 Nec spernendus adeps, dederit quæ bestia melis.
 Seminecis cerui lacrymam miscere liquori
 *dolentes Conuenit, atq; artus illinc mulcere calentes:
 Sic lacerat morbum, bilemq; reuoluit in aluum.
 Præterea chymum stomacho desiccet iniquum,
 Quæ magis atq; magis promittunt corpora claudi.
 Febribus aut longis galli noua iura vetusti
 Subueniunt, etiā tremulis medicantia membris.

Quartanae typo medicando.

Nec tu crede leuem dilato tēpore febrem,
 Quæ spatium sibi dat, magis ut cessando
 Letali quæ grassat quartana calore, (calescat,
 *discam? Ni medicis adhibere manus curem? et herbas.
 Allia non pudeat terno cum cimice trita,
 Et diluta mero medijs haurire diebus.
 Aut facilem iecoris murini ducere fibræ,

Quat

Quattuor ut duri iungantur scrupula Bacchi.
 Mīra est absynhi cum simplice potio lymphæ.
 Sume tribus digitis apprensū semen anethi,
 Tantundem marathri, mulsū nec desit aceti,
 In cuius cyatho prædicta salubriter hauris.
 Meonie Iliados quartum suppone timenti.
 Aut leporis trepidi diluta coagula trade.
 Prodest & potus, * sed mulsus doridis humor. * vel
 Quidam etiam miranda ferunt veniente calore,
 Iurantes ludum Veneris munusq; petendum.
 Sed prius est oleo partus feruescere ranae,
 In triuijs, illoq; artus perducere succo.

Tertianæ typo medicando.

Est etiam alternis febris rediuiua diebus,
 Tēpora discernēs quasi iustæ pōdera libræ.
 Ut possis igitur talem prohibere furorem,
 Inuolues cæra pallentis grana cumini,
 Puniceq; indes pelli, colloq; ligabis.
 Palegij ramus lane velatus amictu
 Tempore suspecto medicos præbebit odores.
 Præterea tritus cimex potatur in ovo
 Horridus attractu, sed gustu commodus apto.

Puniceæ
 pelli, hoc
 est, malico
 rio, quæ
 resta ē ma-
 li punici.

Quotidianæ typo medicando.

At qui continuis non cessat adire diebus,
 Sed tãtū certis morb' discriminat horas,
 Triticum metuit granū (si credere dignum est)
 Quod latitans fracto fuerit sub pane repertum,
 Nec non ossa iuuant septis inuenta domorum.
 Conuenit hæc tereti pendentia subdere collo.
 Multaq; præterea verborum monstra filebo:

N 4 Nam

Nam febrem vario depelli carmine posse
Vana superstitio credit, tremulaeque parentes.

Hemitritæo depellendo.

Figes hoc
videlicet
modo, atque
ordine:

Abracadabra
abracadabr
abracadab
abracada
abracad
abrac
abrac
abra
abr
ab
a

Mortiferum magis est, quod Græcis hemitritæum
Vulgatur verbis, hoc nostra dicere lingua
Non potuere ulli, puto, nec voluere parentes.
Inscribis chartæ, quod dicitur Abracadabra,
Sæpius, et subter repetis, sed detrahe summam,
Et magis atque magis desint elementa figuris
Singula, quæ semper rapies, et cætera figes,
Donec in angustum redigatur littera conum.
His lino nexis collum redimire memento.
Nonnulli memorant adipem prodesse leonis.
Coralium atque crocum corio connectito felix,
Coralium verò si collonectere velles,
Nec dubites illis virides miscere sinaragdos.
Talia languenti conducent vincula collo,
Letalesque abigent (miranda potentia) morbos.

Fraçturis, & luxis sanandis.

Insandum dictu cunctis procul absit amicis,
Sed Fortuna potens omen convertat in hostes.
Vix indigna nouo si sparserit ossa fragore,
Conueniet cerebrum blandi canis addere fractis,
Linthea deinde superque inductasnectere lanas.
Sæpius et succos conspergere pinguis oliui,
Bis septem credunt coalescere cuncta diebus.
Aut veteri Baccho capræ fœmus inde petulcæ,
Hoc aperit clausum, trahit harenis, sanat apertum.
Si verò caput infestus colliserit ictus,
Ex oleo necti vestis debet arachnes,

Nesciet

Nesciet hæc illinc (nisi cum sanarit) abire.
 Quod si luxa suo decedant membra tenore,
 Vrere fœmineos crines, ac iungere seuum
 Congruet, ac tali medicamine mota ligare.
 Aut malum ex pingui tritū apposuisse iuuabit.
 Aut si conclusum seruauit tibia vulnus,
 Stercus ouis placidæ iunges adipēsque vetustos,
 Pandere quæ poterunt ulcus, patuloque mederi.

Neruis incisis, & dolentibus, atque
 contractis.

H Aud q̄s q̄ credet dissectos vulnere neruos
 Ad solitū rursus reuocari posse vigorem.
 Sed prodest terræ lumbricos indere tritos,
 Quis vetus & *rana sociari axungia debet. * rancens
 Si verò occultus neruos dolor vrit inertes,
 Vulturis excisos adipēs rutamque remitte,
 Aut ceram, & tali recreabis languida fotu.
 Conuenit & pelagi calidis perfundier vndis.
 Carica, vel betis lento cum melle iugatur.
 Aut Baccho madesacta Ceres cū frōde cupressi,
 Quo poteris *potu recreare rigentia membra. * fotu
 Sin autem subito replicantur corpora morbo,
 Contractos reuocat neruos caro sumpta colūbæ.

Aegris somno adfiscendo.

N On solū miseros teterrima febris adurit,
 Sed super optato pergit viuare sopore,
 Ne prosint placidi cœlestia munera somni.
 Charta igitur, varijs quam pinxit litera verbis,
 Vritur, inde cinis calido potatur in amni.
 Proderit & magnū capiti substernere fulcrum,

N S

Prodest

Prodest & mistam lymphis potare cypressum,
 Palladijs itidem succis, quos flore rosarum
 Iungi, & immisces madidū tritumq; papauer.
 Quo lita frons facilem præbebit nocte quietem.
 Necnon mandragoræ gustu sopor additur altus.
 Dilue præterea glomeramina, quæ gerit intus
 Clausa aries inter geminæ coxendicis umbras,
 Inde soporati ducentur gutture potus.

Lethargiæ expellendæ.

Diximus hæc sortē miseris mortalibus esse,
 Ut sint sæpe mala inter se cōtraria morbi,
 Deniq; nōnunquā somno sic mēbra grauantur,
 Ut coniungatur leto sopor altus acerbo.

Ergo leui flamma torrentur cornua capræ,
 Quo nidore grauem depellent lumina somnum.
 Aut veneris labrum quæ dicitur herba, bibetur,
 Quæ teritur prius, & vino confusa liquefcit.
 Conueniunt acidis euphorbia mista fluentis,
 Gramina vel rutæ gemina si nare trahantur.
 Quidam dira iubent, septeno cimice trito,
 Ut vitientur aqua, cyathusq; bibatur earum.
 Hæc potiora putant, quàm dulci morte perire.

Comitiali morbo.

Est subiti species morbi, cui nomē ab illo est,
 Quod fieri nobis suffragia iusta recusant.
 Sæpe etenim membris atro languore caducis,
 Consilium populi labes horrenda diremit.
 Ipse deus memorat dubiæ per tempora lunæ
 Conceptum, talis quem sæpe ruina profudit.

*atri Prodest cum veteri Baccho fel vulturis *ampli,
 Sed

Sed cochlear plenum gustu tibi sufficit vno.
 Aut cruor ex progne mistus cum polline thuris,
 Aut apium elixum, aut coctum melle sel agni,
 Marrubium' ve pari confusum pondere mellis,
 Cui tu terna dabis gustu cochlearia in vno.
 Aptus mustela cinis est & hirundinis vna.
 Præterea pluias hominis quas calua supina
 Excepit proiecta sinu, consumere prodest.
 Aut lapis ex nido, vaga quæ congeffit hirundo,
 Vellitur, & nexu fouet attollitq; iacentem.
 Pellitur (ut fama est) gustu quoq; languor anethi.

Regio morbo pallendo.

Regius est vero signatus nomine morbus,
 Tolliter hic quoniam celsa curat in aula.
 Huic rubia ex mulsa fertur conducere lymphæ.
 Allia trita dabis vino made facta calenti.
 Vellera cum viuo suffiri sulphure prodest.

Infantibus dentientibus, vel strige
 inquietatis.

Nidū hoīem primū *mater natura psudit, *mundi
 Insup excruciat, niueis cū dēiibus armat.
 Collo igitur molli dentes neclentur equini,
 Qui primi fuerint pullo crescente caduci.
 Aut teneris cerebrum gingiuis illine porci.
 Aut leporis niueum bibitur cum lacte caprimo.
 Præterea si forte premit strix atra puellōs *aliis:
 Virosa immulgens exertis hubera labris, tundi sen-
 Allia præcepit *Titim sententia necli, tentia Ve-
 Qui veteri claras expressit more togatas. Eli

Combu

Combusturis igne, vel frigore.

Sunt diuersa quidē mala frigoris atq; caloris,
Sed tamē amborū simili nocet vlcere virus.
Illa quoq; vsta putes, quę sunt niue laesa rigente,
Conuersa in cinerem platani pila curat vtrunq;
At verò ambus tū flammis qui candidus oui
Succus inest, penna inductus sanare valebit.
Aut tu succosę cinerem perducito lanę,
lini Aut viuam ex oleo veteri composito calcem,
Ordea vel franges atq; oui candida iunges,
Adsit adeps porcę (mira est hęc forma medelę)
Iunge chelidonijs, ac sic line vulnera, succis.
Quodq; recens vssit glacies axungia simplex
Molcet, et ex facili grata est medicamine cura.

Venenis prohibendis.

Vt tutus sis in seclę fraude nouercę,
Vel quicumq; tuo carpetur liuidus anctus,
Non expectatis eat obuia cura venenis,
Ante cibos igitur iuglandis fœtus edatur,
*variãtia Produnt electri*rorantia pocula virus.
Præterea coctę querno cum cortice lymphę
Conueniunt potu, dimersa' ve ficus oliuo.
Sape etiam raphanū prædixit numen edendum,
Antidotus verò multis mithridatica fertur
Consociata modis, sed Magnus scrimia regis
Cum raperet victor, vilem deprendit in illis
Synthesin, & vulgata satis medicamina risit.
Bis denum rutę folium, salis & breue granum,
terno Iuglandesq; duas, totidem cum corpore ficus,
Hęc oriente die parco conspersa Lyao,

Sum

Sumebat metuens, dederat quæ pocula mater,

Venenis datis.

SI nequit infandū præuerrere cautio virus,
Proximus ille gradus data pocula pellere
Lac asine placidæq; bonis pdesse loquunt. (cura,
Betoniam ex paruo sumunt pleriq; Lyxo.
Quod si hedera succos, q̄ truncos implicat altos,
Instilles pateris, poterunt haud vlla nocere
Pocula, quæ quisquam senis vitauerit herbis.
Si quis hyoscyamum gustarit, lacte capellæ
Exhausto, rabidos poterit mulcere furores.

Vulneribus ex re dubia curandis.

Vulnera tabescunt spatio vitiata dierum,
Curaq; nil prodest, nec ducit vlla cicatrix.
Sed tamen herbarum tam mira potentia pollet,
Vlceris annosi sinus vt coalescere possit,
Marrubium si *tu recoquis, illoq; liquore *thure co-
Vulnus atrox foueas, cineres vel hirundinis albae quas
Inducas, leporis' ve aspersa coagula vino,
Aut hederam Baccho decoctâ, et semen anethi,
Aut cineres alni tardo cum melle ligentur.
Lumbrici terre poterunt conducere vulnus,
Aut facilis lapathi* cumulatîo vulnera purgat, *coma la-
Et commistus adeps, sed non nullo sale tactus. tior vlce-
Pinæ præterea viuo cum sulphure cortex, ra purg.
Et pice cum spissa iam perdita membra reponit.

Verrucis tollendis.

Interdum existit turpi verruca papilla,
Hinc quondâ Fabio verū cognomen adhesit,
Qui solus patriæ cunctando restituit rem.

Id po

Id poterit vitium sanguis curare lacertæ,
 Aut vrina canis cum terra inducta madenti.
 lichen Aut herba succus, quæ fertur nomine lathyr,
 Et tithymallus item tali satis apta medela.
 Si rupta immensos fundit verruca cruores,
 Purpureo triti cineres de vellere profunt,
 Quod fuerit vero conchyli sanguine tinctum.

Hæmorrhoidibus medendis.

Excruciant turpes animum si forte papillæ,
 Agrestis predest radix superaddita porri.
 Ni violet, sanat iuglandis fragmine clausa.
 Sal niueum sumes, beticum quod nomine dicunt,
 Dulcia cumq; nigra iunges siliagine mella.
 Apponesq; super, pollet medicina dolorem.

Que sequuntur, ex Aldino codice huc trans-
 ferre libuit, ut videretur non esse Sereni.

P A R A L Y S I D E P E L-
 L E N D A E.

Prima die ita agendum.

Hinc quicq; cupis citius depellere morbum,
 Protinus antidoti studio tu perfice mirum,
 Scilicet ut valeas languenti ferre medelam:
 Castoreas siliquas bis sex perquirere cura,
 Tristis item digitis lympham metire duobus:
 Deniq; tunc capies phialam quæ iustior extat,
 Aut equidem flammæ: sed prunas subijce solers:
 Proderit interea tepidum potantibus illud:
 Ieiunis sed enim potius præbere memento.

Secunda ita medendum est.

Cumq; secunda dies orbi peruenerit omni,
 Haud

*Hauid alijs rebus prudens adiungere cures.
 Castoris atq; nomen siliquis appendito statim,
 Atq; duos semis digitos metire memento
 In calice atq; probo lympham miscere duobus:
 Qui patitur tepidū languens hinc sorbeat ipse.*

Tertia die ita curandum est.

*Gratior atq; dies ternus cum venerit imo,
 Rursus in agroto constanter fer medicamen,
 Castoreus siliquis iterum quæ pondere sint sex:
 Hinc etenim binos digitos metire memento
 De lymphā liquida: sed enim subiungere cura
 Et simili debes tepidum præbere modo tunc.*

*Ita peragendum est à quarta die vsq; ad sex-
 tam, & à septima vsq; ad nonā, à decima vsq;
 ad duodecimam, & mirifice prodest.*

Quid quarta die, & reliquis peragendum sit.

*Quartus & ille dies consentit: nec ne priori
 Quintus & est similis percellens nanq; secundo:
 Sextus itemq; simul concordat deniq; ternos:
 Septimus vsq; nonum percurritur ordine primo:
 Sic decimas currens conscenditur ad duodenum.*

F I N I S.

Q. R H E M N I I
FANNI PALAEMONIS
DE PONDERIBVS
ET MENSVRIS
LIBER.

Sunt, qui
huiusopu-
sculi Pri-
scianu au-
torem esse
putent: sed
reclamat
erudito-
rum maior
pars.



ONDERA Peonijs veterum me-
morata libellis.

Nosse iuvat: pondus rebus natura
locavit

Corporeis, elementa suum regit omnia pondus,
Pondere terra manet, vacuus quoq; poderis aether
Indefessa rapit voluentis sydera mundi.

Ordinar à minimis, post hæc maiora sequentur,
Nam maius nihil est aliud, quam multa minuta.

Semioboli dupl^s est Obolus, quæ potere dupla
Gramma vocat, Scrupulū nostri dixere priores,
Semina sex alij siliquis latitantia curvis,

Atribuunt scrupulo, lentes veraciter octo,
Aut totidē speltis numerant, tristes' re lupinos
Bis duo: sed si par generatim his pondus inesset,
Seruarent eadem diuerse pondera gentes,
Nunc variant: etenim cuncta non jactare certo
Naturæ, sed lege valent, hominumq; repertis.

In scrupulis ternis Drachmā, quo potere doctis

nummus Argenti facilis signatur pondus Athenis.

Hoicēq; à drachma non re, sed nomine differt,
Drachmā si geminos, aderit quem dicier audis,
Siciliquis: drachmæ scrupuli si adiectio fiet,

Sextula

Sextula quæ fertur, nam sex his vncia constat:
 Sextula cum dupla est, veteres dixere Duellam.
 Vncia fit drachmis his quattuor: unde putandum
 Gramata dicta, quod hæc viginti quattuor in se
 Vncia habet: tot enim formis vox Græca notatur,
 Horis quot mundus præcragit noctemq; diemq;.
 Vnciaq; in Libra pars est, quæ mensis in anno.
 Hæc maior Latio libra est, gentiq; togata.
 Attica nã minor est, ter quinq; hæc deniq; drach
 Et ter vigenis tradunt explerier vnam. (mis,
 Accipe præterea, paruo quam nomine Grai
 Minam vocitant, nostriq; Minã dixere priores,
 Centũ hæ sunt drachmæ. quod si decerpseris illis
 Quattuor, efficies hanc nostram deniq; libram.
 Attica quæ fiet, si quartã dempseris hinc, Mina.
 Cecropium superest post hæc docuisse Talentum
 Sexaginta minas, seu vis, sex millia drachmas,
 Quod summũ doctis perhibetur pòdus Athenis,
 Nam nihil his Obolo'ue minus, maius'ue Talento.
 Nunc dicam, solidæ quæ sit diuisio libræ
 Siue Assis, nam sic legum dixere periti.
 Ex quo quod soli capimus perhibemur habere,
 Dicimur aut partis domini pro partibus huius:
 Vncia nam libræ si deest, dixere Deuncem:
 At si sextantem retrahas, erit ille Decuncis:
 Sed nullum reliquo nomen Semuncia certum
 Dẽpta dabit, neq; enĩ est huius Sescuncia triplex:
 Dodrantẽ reliquũ vocitant quadrante retracto:
 Cumq; triens desit, Bessẽm dixere priores.
 Idem Septuncem dempto quincunce vocarunt.

Decuncis,
 prodecũx,
 qui & Dex
 tãsdicitur,
 positum vi
 derur.

O

Post

Post hac Semissis solidi pars maxima fertur.
 Nam quæ dimidium superat, pars esse negatur,
 Ut docuit tenui scribens in puluere Musa.
 Cetera dicta prius quibus est semuncia maior.

De ponderibus, siue mensuris humidorum, & frugum.

ET de ponderibus, superest pars altera nobis,
 Humida metiri, seu frugum semina maui,
 Cuius principio nobis pandetur origo.
 Pes longo spatio latoq; notetur in angulo,
 Angulus ut par sit, quem claudit linea triplex.
 Quattuor ex quadris medium cingatur inane.
 Amphora sit Cubus, quam ne violare liceret,
 Sacrauere Ioui Tarpeio in monte Quirites.
 Huius dimidii fert Vina, ut & ipsa Medimni
 Amphora, terq; capit modium, Sextarius istum
 Sex decies haurit, quot solentur in digitos Pes,
 At Cotylas quas, si placeat, dixisse licebit.
 Heminas recipit geminas Sextarius vnus,
 Qui quater assumptus fit Graio nomine Chænix.
 Adde duos, Chus fit vulgo, qui est Congius idē,
 A quo sextarij nomen fecisse priores
 Crediderim, quod eos capiat sex congius vnus.
 At Cotyle cyathos bis ternos vna receptat,
 Sed de abaco nobis id pondus sæpe notatur,
 Bis quinq; hūc faciūt drachmæ, si appēdere tētes:
 Oxybaphus fiet, si quinq; addantur ad illas.
 At Nystrum cyathi quarta est, ac tertia mystri,
 Quam vocitāt Cyanē, capit hæc cochlearia bina.
 Quod si mensura pondus componere fas est,
 Sextarij

Sextarij Cyathus pars est, quæ est uncia libræ,
 Nec non oxybaphi similis Sescuncia fiet.
 Sicilicquumq; tibi mystro simulare licebit.
 Cochlear extremū est, Scrupuliq; imitabit instar.
 Attica præterea dicenda est Amphora nobis,
 Seu Cadus, hanc facies, nostræ si adieceris urnā.
 Est & bis decies quem conficit amphora, nostris
 Culleus, hac nulla est maior mensura liquoris.
 Est etiam terris (quas aduena Nilus inundat)
 Artaba, cui superat modij pars tertia post tres,
 Nanq; etiam modijs explebitur Artaba triplex.

De ponderibus variorum liquorum,
 & aquarum.

Illud præterea tecum cohibere memento,
 Finitum pondus varios seruare liquores.
 Nam libræ (ut memorat) besse Sextarius addet,
 Seu puros pendis latices, seu dona Lyæi.
 Addunt semissem libræ* labentis oliui, *liuentis
 Selibramq; serunt mellis superesse bilibri.
 Hæc tamen assensu facili sunt credita nobis:
 Nanq; nec errantes vndis labentibus amnes,
 Ner merfi puteis latices, aut fonte perenni
 Manantes par pondus habent: non deniq; rina,
 Quæ campi aut colles nuper' ne aut ante tulere,
 Quod tibi mechanica præptū est depromere musa.
 Ducitur argenti, tenui' ne ex are cylindrus,
 Quantum inter nodos fragilis producit arundo,
 Cui cono interius modico pars ima grauat,ur,
 Ne totus sedeat, totus' ne supernatet vndis,
 Lineaq; à summa tenuis descendit ad ima

O 2 Ducta

Ducta superficie, tot quæq; in frusta secatur,
 Quot scrupul' grauis est argenti aris'ue cylindrus.
 Hoc cuiusq; potest pondus spectare liquoris.

Maiori, Nam si tenuis erit, maiori mergitur vnda:
 subaudi Sin grauior, plures modulos superesse notabis:
 pōdere. Aut si tantundem laticis sumatur vtrinq;
 Modulos, Pondere præstabit grauior: si pondera secum
 id est par- Cōueniunt, tunc maior erit, quæ tenuior vnda est.
 tes, in quas Cylindr' in-
 telligatur
 diuisus. Quod si ter septem numeros texisse cylindri
 Hos videas latices, illos cepisse ter octo,
 His drachma grauius fatearis pondus inesse.
 Sed refert equi tantum conferre liquoris,
 Vt grauior superet drachma, quantum expulit vn-
 Illius aut huius teretis pars mersa cylindri. (da,
 Hæc de mensuris, quarum si signa requires,
 Ex ipsis veterum poteris cognoscere chartis.

De inuentione argenti, auro in vna
 massa permisti.

Nunc aliud partū ingenio trademus eodē.
 Argentum fuluo si quis permisceat auro,
 Quantum id sit, quo'ue id possis deprendere pacto,
 Prima Syracusy mens prodidit alta magistri.
 Regē nanq; ferunt Siculam, quam vouerat olim
 Cælicolū regi, ex auro statuisse coronam,
 Compertoq; dehinc furto, nam parte retenti
 Tantundemq; argenti opifex immiscuit auro,
 Orasse ingenium ciuis, qui mente sagaci
 Quis modus argenti fuluo latitaret in auro,
 Repperit, illæsum quod dijs erat antè dicatum.
 Quod te quale fiet, paucis (aduerte) docebo.

Lancib

Lancibus æquatis quibus hæc appēdere mos est,
 Argenti atq; auri, quod edax purgauerit ignis,
 Impones libras, neutrum ut præponderet: hasq;
 Submites in aquam, quas pura ut ceperit vnda,
 Protinus inclinat pars hæc, quæ sustinet aurum.
 *Pensius hoc nanq; est, similari crassius vnda. *Densius
 At tu siste iugum, medijq; è cardine centri
 Internalla nota, quantum discerpserit illinc,
 Quotq; notis distet suspensò pondere filum.
 Fac drachmis distare tribus: cognouimus ergo
 Argenti atq; auri discrimina, deniq; libram
 Libra trib. drachmis superat cū mergitur unda.
 Sume dehinc aurum, cui pars argentea mista est,
 Argentiq; meri par pondus, itemq; sub vnda
 Lancibus impositum spectata: propensior auri
 Materies* subsistit enim, furtumq; docebit. *aliàs,
 Nam si ter senis superabitur altera drachmis, sub aquis
 Sex solis libras auri dicemus inesse, fiet
 Argenti reliquum, quia nil in pondere differt
 Argentū argento, liquidis cum mergitur vndis.
 Hæc eadem puro deprendere possumus auro,
 Si par corrupto pondus pars altera gestet.
 Nam quoties ternis pars illibata grauarit
 Correptā drachmis sub aquam, totidē esse notabis
 Argenti libras, quas fraus permiscuit auro.
 Pars etiam libræ quævis si forte supersit
 Hæc quoq; drachmarū simili tibi parte notetur:
 Nec non & sine aquis *

FINIS.

O 3

INDEX OMNIVM,

QVAE IN CELSO CONTINENTUR. Et primus numerus li-

brum, secundus caput

designat.

*

A

1. proæ.

A Bdomen lib. 4. cap. 1.	Adolescentia quibus morbis magis obnoxia sit	1.1
Abdominis ruptura quomodo curanda sit lib. 7. cap. 17	Adurentia	5.8
Abditæ causæ lib. 1. in proæ.	Adusta quomodo curari debeant	5.26
Abcessus quibus signis indicentur futuri	Aegilops	7.7
Abortus periculū quādo lib. 1. cap. 7	Aestas periculosa	2.1
Abstinentia nimia sæpe inutilis ibidem	Aestas quos pariat morbos	1.2.1
Accessiones in febribus	Aestate quæ ad victum magis conducant	1.3
Aceti natura & usus	Aestuanti in balneo, quid opus sit facere	1.3
Acopa	Aetatis differentia vi-ctui & curatione	1.3
Acrochordones lib. 2. cap. 14. & lib. 5. ca. 28	Aetatum differentia, quantum ad bonam, malamve valetudinem	2.1
Actiões naturales quæ	Aesculapius in deorum	

I N D E X.

rum numerum rela-	Andro medicus	6.18
tus 1. proæ.	Angina	4.4
Agamemnon 1. proæ.	Angina subito finita,	
Agricolam usu fieri,	quid portendat	2.5
nō disputatione ibid.	Animalium quadru-	
Ajax quo genere in-	pedum differentie	
sanie laborauerit 3.		2.17
18	Angues in Italia, &	
Alentia 5.14	in frigidis regioni-	
Alopecia 6.4	bus minus terribi-	
Alphos lib.5.ca.vlt.	les	5.26
Alui stringentia 1.5	Aniuitia quomodo cu	
Aluum soluentia ibid.	rari debeant	7.30
Aluus quæ mala 1.3	Anodina	5.25
Aluus soluta, quibus	Antidoti, & eorum	
remedijs coërceatur	compositiones	5.23
1.6	Anthere	6.11
Alui iudicatio 2.7	Antigonus rex	3.22
Ambrosia antidoti no	Apollonius medicus	
men lib.5.23	1. proæ.	
Ammonius lithotem.	Apostemata	2.1
7.20	Aphæ	ibidem
Anatomice, id est, in-	Apollonius, qui Pöys	
sectio corporum ne-	cognominatus est	5.
cessaria 1. proæ.	proæ.	
Ancyloblepharos 7.7	Aperientia	5.8
Andreas medicus 5.	Aqua frigida quibus	
proæ.	prostit	1.9
Andree collyrium 6.6	Aque differentia in	
	O 4	pot

I N D E X.

potionibus	2.17	Aristonis malagma	
Aqua bonitatis pro-		ibidem	
batio	ibidem	Articulorum curatio-	
Aqua in qua candens		nes	5.26
ferrum tinctum sit		Asclepiades	1. proæ.
4.9		Ascites	3.21
Aqua inter cutē quan-		Asthma	4.4
do minime terribi-		Asius lapis	lib.4.
lis	2.7	cap. vlt.	
Aqua quomodo hy-		Aduersus aspidis ictū	
dropicis emittatur		5.26	
7.13		Athenio	5.25
Aquilonis flatus quos		Atheroma	7.6
generet morbos, &		Attoniti qui dicantur	
quid boni sanis cor-		3.26	
poribus adferat		Atrophia	3.22
2.1		Attalicum emplastrū	
Area	6.4	5.19	
Arquatus morbus	3.	Anium differentia in	
24		cibo	2.17
Arteriaces compositio		Aurium vitium	6.7.
5.26		& lib.6.c.18	
Articulorū vitia	2.7	Aurium morbi	7.8
Arteria aspera, eiusq;		Aurium fractarum cu	
descriptio	4.1	ratio	8.6
Articulorum dolores		Autumnus periculo-	
4. vlt.		sissimus	2.1
Ad articulos malagma		Autumnus quos mor-	
5.18		bos pariat	ibidem
		Autum	

I N D E X.

Autumni tēpore quæ	Calor quid corporibus
ad viclū magis con-	adferat 2.1
ferant 1.3	Calculo quomodo suc-
Auster quos morbos	curratur 7.26
generet 2.1	Cancer in ore 6.15
Autopyron 2.17	Cancer in cole 6.18
B	aduersus Cantharidas
B Afilicon empla-	2.27
strum 5.19	Capitis dolores quibus
Bæthus ibidem	leuentur 2.7
Brachij fracti curatio	Capitis longus dolor si
8.10	sine causa est, &c.
Brachium 8.1	ibidem
Bronchocele 7.13	Capitis descriptio 4.1
Bubonoccele 7.18	Capitis morbi, & eo-
C	rum curatio 4.2
C Achexia 2.1.	Caput quibus infirmū
& 3.22	est, quid facere con-
Cacoëthes 5.28	ueniat 1.4
Calefacientia 1.3	Caput quod firmissi-
Calculosi quibus indi-	mum 8.1
cij cognoscantur	Caput luxatum 8.13
2.6	de Capillis fluentibus
Calculus quibus signis	6.1
cognoscatur 7.26	Carbunculus in oculis
Caluaria 8.1	6.6
Caligatio oculorum	Carcinodes 6.8
6.6	Carbunculi in cole cu-
Calor quibus profit 1.9	ratio 6.18
	O 5 ad

I N D E X.

ad Carcinodas mala-	8.cap.5.	
gma	5.18	Chirurgus Sosttratus
Cardiacus morbus quis	1.proæ.	
dicatur	3.19	Casarianum collyrium
Carcinoma	5.28	6.6
Casus quid inuenerit	Cercis	lib.8.c.1.
5.26	Chiragra	2.6.
Cassius medicus	1.pr.	4.24
Catapotiorum descri-	Chirurgica	lib.1.
ptio, siue varia com-	in proæ.	
positio	5.25	Chironium vlcus
Catapotium ad somnũ	5.28	
ibidem	Chirurgus qualis esse	
Catapotium Athenio-	debeat	7.proæ.
nis	ibidem	Chænicion
Catapotium Heraclidis	Cholera	8.3
ibidem	Chordapfos	4.11
Causse abditæ quæ sint	Chordion	4.13
1.proæ.	Chrite tuberculum	ibidem
Causse euidentes quæ	Chrysippus	7.6
eodem	proæ.	1.in
Causse obscuræ quæ	Chrysippi discipulus	
eodem	medicus	2.21
Cephalea	4.2	Chrysippi malagma
Cerebri vel membra-	5.18	
næ eius percussæ cu-	Cibus à quibus rebus	
ratio	5.22	melius incipiat
Chirurgus Tryphon	Ciborum potionumq;	1.2
lib.7. in pro. & lib	differentiæ	2.17
	Cibus	

I N D E X.

Cibus quomodo &	eius curatio	4.12
quando in febris	Comitialis morbus	
dandus lib.3.cap.	3.23	
4.5	Concoctio cibi in sto-	
Cibi varij eduntur fa-	macho lib.1.	
cilius quam conco-	in proæ.	
quuntur 3.6	Concoctio quibus fit,	
Cibus febricitantibus	quomodo se gerere	
dandus, qualis esse	debeant 1.2	
debeat ibidem. ad-	Concubitus qualis esse	
uersus cicutam 5.27	debeat 1.1	
Cirsocele 7.18	Concubitus in fæmi-	
Circulatores 5.26	nis, si per naturam	
Clauus 5.28	prohibitus, quomodo	
Clauus oculorum 7.7	restitui debeat 7.28	
Cleonis collyrium 6.6	Condita duab. de caus-	
Coli dolor quibus re-	sis inutilia 1.2	
medijs iunetur 1.7	Condylomata 5.28	
Coles 4.1	Condylomatum cura-	
Colicon medicamenti	tio 7.30	
genus, ex quibus	Coquentia & matu-	
rebus constet 4.14	rantia pus 5.3	
Collyriorum variae com-	Cordis descriptio, &	
positiones 6.6.	ubi situm sit	
& 4.28	4.1	
Coëuntiam aliqua cor-	Cordis percussi signa	
poris parte dissoluen-	5.22	
tia 5.11	Coryza 4.3	
Cæliacus morbus, &	Corpus integrum quod	
	nam	

INDEX.

nam habeatur	1.2	Craſſiſſimum os in ca-	
Corporum incifio	1.	pite	8.1
proæ.		Cubitus	ibid.
Corpus gracile quale		Cubitus luxatus quo-	
2.1		modo reſtitui de-	
Corpus quæ extenuent		beat, & quot in eo	
1.3		offa coeant	8.16
Corporis humani de-		Curta in auribus quo-	
ſcriptio	8.1	modo ſarciri debeât	
Corpus quodnam habi		7.9	
liſſimum	2.1	Cutem purgantia	5.16
Corporis noxæ quinq;		Cucurbitularum gene-	
5.26		ra duo	2.10
Coſtæ, & earum ſitus		Curatio morborū quot	
atque differentie		modis fiat	2.8
8.1		Curationum duo gene-	
Coſtarum fracturariū		ra	7.7
curatio	8.9	Cucurbitulis quomodo	
Coxarum dolores	4.	ſanguinis detractio	
22		fiat	2.10
Coxarum dolor, quid		Cynicus ſpasmus	4.2
portendat	2.5	D	
Coxarum os	8.1	Democritus lib.	
Crato medicus	6.7	1. proæ.	
Cruſtas vulneribus in-		Deiectio	1.3
ducentia	5.10	Deiectio quando ſine	
Cruſtas ulcerum re-		vlla noxa ſit	2.4
ſoluentia	eodem	Defruti differentia in	
Cremaſteres	7.18	potionibus	2.17
		Denarij	

I N D E X.

Denarij pondus 17	5.	Difficilime curationē admittentia	5.22
Dentium situs & ordo & numerus & nomina	8.1	Diocles	1.proæ.
Dentium dolor	6.7	Disciplina corpori inimica	ibidem
Dentium curatio	7.12	Dionysij collyrium	6.6
Dentes quomodo extrahendi sint	ibid.	Dyspnœa	4.4
Destillatio, eiusq; curatio	4.2	Dysenteria	4.15
Destillatione laborantibus quid opus sit	1.5	E Ctropium oculorum	
Desidia lib.1.in proæ.			
Detractio materie à corporibus, quot modis fiat	2.8	Elæodes	5.26
Dexij malagma	5.18	Elcodes	5.28
Diaphragma	1.proæ.	Elephantia	3.25
Diatetica medicina	ibidem	Empyricus unde dictus sit	lib.1.in proæ.
Dies critici	3.4	Empyrici qui sint	ibidem
Digitus lib.8.cap.1.		Empedocles	ibid.
19		Emplastrorum variae compositiones, & descriptiones	5.17.
Digitorum coherentium curatio	7.32	& demc.	
Digitorum ulcera	6.19	Emprosthotonos	4.3
		Enchanthis	7.7
		Enterocèle	7.18
		Enneapharmacij emplastrum	

I N D E X.

plastrum	5.19	Exercitatio quibus fiat
Ephesium emplastrum		modis 1.2
5.19		Exercitationis finis,
Epimyctis	5.28	quisnam esse debeat
Ephelis	6.5	ibidem
Epiploce	7.18	Exercitationem quæ
Epipastica	5.18. &	sequi debeant ibid.
19		Exedentia 5.7
Erasistratus	1. in	Expletus cibo potu'ue
proæ.		quid facere debeat
Errorem suum de fu-		1.2
turis in capite, inge-		F
nue cõfessus est Hip-		F acies in homine
pocrates	8.4	8.1
Erysipelas lib. 5. ca.		Fatigato quotidianum
26. & 28		cubile tutissimum
Evidentes causse	1.	1.3
proæ.		Fatigatum inter ambu-
Euocantia & educen-		landum quæ reficiat
tia	5.12	ibidem
Euticleus	5.18	Febrium differentiæ
Euelpidis collyrium		3.5
6.6		Febrem sæpe presidio
Euelpistus chirurgus		esse 2.7
7. proæ.		Fel & eius situs 4.1
Exagitatio quid fa-		Ferarum differentiæ in
ciat	4.15	cibis 2.17
Exanthemata	5.28	Femur 8.1
Experientia 1. in pro.		Fistule in homine ibid.
		Fistul

INDEX:

<i>Fistularum curatio</i>	<i>Genuum dolores, &</i>
5.28	<i>eorum curatio</i> 4.23
<i>Fluxus ventris, eiusq;</i>	<i>Gena luxatum</i> 8.21
<i>curatio</i> 4.19	<i>Gingivarum ulcera</i> 5.
<i>Fœmina</i> 8.1	13
<i>in Fœminis secunda</i>	<i>Glaucias</i> 1.proœ.
7.30	<i>Glandule</i> 4.1
<i>Foramina in capite</i>	<i>Glande coles quo pa-</i>
<i>ibidem</i>	<i>elo tegendus</i> 7.25
<i>Frigus quibus inimi-</i>	<i>Glans colis siue penis</i>
<i>cum</i> 1.9	<i>contecta, quomodo</i>
<i>Frigus quibus proficit</i>	<i>aperienda sit</i> <i>ibid.</i>
<i>ibidem</i>	<i>Glutinantia</i> 5.2
<i>Frigus quid mali cor-</i>	<i>Glutinatio vulnerum</i>
<i>poribus adferat</i>	5.26
2.1	<i>Gorgias medicus</i> 2.
<i>Frigus in febris</i>	14. & libro 7. in
<i>quid dicatur</i> 3.3	<i>proœ.</i>
<i>Fructuum arboreorum</i>	<i>Grauedines quomodo</i>
<i>differentie in cibis</i>	<i>curentur</i> 4.2
2.17	<i>Grauedine laboranti-</i>
<i>Frumētorum differen-</i>	<i>bis quid conueniat</i>
<i>tia in cibis</i> <i>ibid.</i>	1.5
<i>Furunculus</i> 5.28	<i>Gubernatorem vsu fie-</i>
G	<i>ri non disputatione</i>
G <i>Angrena cura-</i>	1.pro.
110 7.33	H
<i>Ganglion</i> 7.6	H <i>Animonius me-</i>
<i>Gargariſationes</i> 5.22	<i>dicus</i> 7.proœ.
	<i>Hapsus</i>

INDEX.

Hapsus	7.26	Homo sanus, nullis
Hecatæi emplastrum		se medicorum legi-
5.19		bus obligari debeat
Hepaticus morbus	1.1	
4.7		Hominem sanum, va-
Hæmorrhoidis	6.18	rium vitæ genus ha-
Herbarum differentia		bere oportet eod.
in cibis	2.17	Horror in febribus
Heraclides	1.proæ.	3.3
Herophilus	libr. 1.	Humectantia
in proæ. & libr. 5.		1.3
cap. 25		Humerus
Hecatæus	5.23	8.1
Hermionis collyrium		Humerorum dolores
6.6		quibus tollantur
Hernia	7.18	2.7
Heron siue Hieron me-		Humeri fracti curatio
dicus	7.proæ.	8.10
Herpes	5.28	Humerus luxatus quo
Hippocrates	1.proæ.	modo restitui debeat
Hippocrates omnis me-		8.15
dicinæ parens	7.	Humor spissescens, ace-
proæmio		to intus sumpto dis-
Hireneus	5.25	cutitur
Hieracis collyrium		5.26
6.6		Hyeme quæ magis con-
Hieræ compositio	5.	ueniant
27		1.3
Homerus	1.proæ.	Hyems salubris est
		2.1
		Hyems quos morbos
		pariat
		ibidem
		Hydrocelle
		7.18
		Hydrops, ac eius spe-
		cies
		Hydrophob. 297

I N D E X.

cies tres	3.21	ria que	2.17
Hydropis curatio	ibi-	Implentia	5.14
dem		Insanabilia que sint	
Hydrocephalon	4.2	5.26	
aduersus Hyoscyamum		Infibulatio quomodo	
5.27		fiat	7.25
Hyposarca	3.21	Inedia si cui eueniat,	
Hypochysis	6.6	quid faciendum	
I		1.2	
I Chor	5.26	Inguen quomodo inci-	
lecur, & eius si-		dendum sit	7.29
tus	4.18	Intemperantia qua in	
ad Iecur dolens ma-		re tolerabilior	1.2
lagma	5.18	Intemperantiæ exem-	
Ieiuni hominis vis ad-		plum	3.21
uersus serpentis ictum		Insania quibus signis	
5.26		denuntietur futura	
Ignauia quid faciat		2.5	
1.1		Insaniæ species	53.18
Ileos	2.1	Insanientium commu-	
Ileon	4.13	nia remedia	3.18
ad Infantem mortuum		Intestinum ieiunum,	
expellendum	5.	& cur ita dictum	
25		4.1	
Ilia, & eorum situs		Intestinum tenuius	
4.1		ibidem	
per Imbres qui morbi		Intestinum crassius	
oriantur	2.1	ibidem	
Imbecillissima mate-		Intestinatorum nomina	
		P diuer	

I N D E X.

[illegible]

I N D E X.

<i>Leuantia sine leuigan-</i>	<i>Luxuria</i>	<i>lib.1.in</i>
<i>tia</i>	<i>proœmio</i>	
<i>5.13</i>		
<i>Lienteria</i>	<i>M</i>	
<i>2.1</i>		
<i>Lien sine lienis</i>	<i>Achaon lib.1.</i>	
<i>4.1</i>	<i>in proœ.</i>	
<i>Lienes quibus magni</i>	<i>Malagmatum compo-</i>	
<i>sint</i>	<i>sitiones varie</i>	<i>5.17</i>
<i>2.5</i>	<i>Male</i>	<i>8.1</i>
<i>Lienis malum quando</i>	<i>Manus luxata quo-</i>	
<i>periculosum</i>	<i>modo restitui debe.</i>	
<i>2.7</i>	<i>8.17</i>	
<i>Lienis morbi curatio</i>	<i>Materia extrahenda</i>	
<i>4.9</i>	<i>per malagmata</i>	<i>5.18</i>
<i>ad Lienem malagma</i>	<i>Materie genere</i>	
<i>5.18</i>	<i>modo vtendum pro</i>	
<i>Lienis vulnerati signa</i>	<i>viribus cuiusq;</i>	<i>2.17</i>
<i>5.26</i>	<i>Maxilla</i>	<i>8.1</i>
<i>Liguae resolutio, eiusq;</i>	<i>Maxille fractæ cura-</i>	
<i>curatio</i>	<i>tio</i>	<i>8.7</i>
<i>4.2</i>	<i>Maxilla luxata cura-</i>	
<i>Linguarum vlceræ</i>	<i>tio</i>	<i>8.12</i>
<i>6.12</i>	<i>Medicina nusquam non</i>	
<i>Lippitudine laboran-</i>	<i>est</i>	<i>1. proœ.</i>
<i>tibus quid opus sit</i>	<i>Medicina quid pro-</i>	
<i>1.5</i>	<i>mutat</i>	<i>ibidem</i>
<i>Literarum disciplina</i>	<i>Medicina multiplex</i>	
<i>animo necessaria,</i>	<i>ibidem</i>	
<i>corpori inimica</i>	<i>Medendi scientia, sa-</i>	
<i>1. proœ.</i>	<i>piencie pars</i>	<i>ibid.</i>
<i>Lucubrandum quando</i>	<i>Med</i>	
<i>potissimum</i>		
<i>1.2</i>		
<i>Luxata membra quo-</i>		
<i>modo restitui debeant</i>		
<i>8.11</i>		

INDEX.

<i>Medicina triplex ibi-</i>	<i>Meliceria</i>	5.26
<i>dem</i>	<i>Meliceria siue melice-</i>	
<i>Medicina que victu</i>	<i>ris lib.5.cap.28. &</i>	
<i>curat in duas partes</i>	<i>lib.7.cap.6</i>	
<i>diuisa</i>	<i>ibid. Meningophylax</i>	8.3
<i>Medicine quæ pars</i>	<i>Menophilus medicus</i>	
<i>difficilima</i>	<i>ibid. 8.7</i>	
<i>Medicinâ artem con-</i>	<i>Menemachus</i>	6.9
<i>iecturalem ibidem</i>	<i>Mensa secunda</i>	1.2
<i>Medicina quid ibid.</i>	<i>Metrodorus medicus,</i>	
<i>Medicorum officium,</i>	<i>Epicuri discipulus</i>	
<i>quodnam sit in cu-</i>	<i>3.20</i>	
<i>rando ex Asclepia-</i>	<i>Mentum</i>	8.1
<i>dis sententia</i>	<i>Mithridatis antidotû</i>	
<i>3.4</i>	<i>5.23</i>	
<i>Medici periti officium</i>	<i>Modiolus</i>	8.3
<i>circa ægrum, cuius-</i>	<i>Mollientia</i>	5.15
<i>modi esse debeat</i>	<i>3.6</i>	
<i>Media materia</i>	<i>2.17</i>	
<i>Medulla percussa si-</i>	<i>Morbos in deorû iram</i>	
<i>gna</i>	<i>relatos</i>	1. in proæ-
<i>5.26</i>	<i>mio</i>	
<i>Meges chirurgus lib.</i>	<i>Morbos non eloquen-</i>	
<i>5.cap.28. & lib.7. in</i>	<i>tia, sed remedijs cu-</i>	
<i>proæmio</i>	<i>rari</i>	<i>ibid.</i>
<i>Melus lib.5.ca.vlt.</i>	<i>Morborum tria gene-</i>	
<i>Melancholia</i>	<i>2.5</i>	<i>ra</i>
<i>ibid.</i>	<i>ibid.</i>	
<i>Mellis natura in medi-</i>	<i>Morbi per singulas</i>	
<i>cina</i>	<i>tempestates</i>	2.1
<i>3.9</i>	<i>Morbus comitialis,</i>	
<i>ad Melicert. as mala-</i>	<i>qua etate agre cu-</i>	
<i>gma</i>	<i>retur</i>	
<i>5.18</i>		

INDEX.

velur	2.7	Motatio per vite cur-	
Morborum diuifio &		sum quomodo mode-	
differentie	3.1	randa	1.3
Morbus increscēs qui-		Mycon	5.18
bus fignis dinofca-		Myron	5.28
tur	3.2	Myrmecia	4.28
Morbi decedentis que		Mydriasis oculorum	
nota sint eodem	6.6		
Morbus fi acutus fue-		N	
rit quomodo ager		Narium morbi	
tractandus fit eo-		6.6	
dem		Narium fractarum cu	
Morbus fi longus fit		ratio	8.5
quomodo ager tra-		Naturales cauffe que	
ctandus fit eod.		sint	1. proæ.
Morbus comitialis	3.	Nauiganti & naufea	
23		presso, quid facere	
Morfus omnis quo-		opus fit	1.3
dam modo veneno-		Negotiofi hominis pri-	
fus	5.26	ma curatio, exerci-	
Mortis indicia que		tatio eſt	1.2
2.5		Neruorum dolore la-	
Mos magnorum viro-		borantibus, quid ob-	
rum qui fit	8.4	feruandum fit	1.9
Mulierigravida que		Neruorum diftentio,	
incommoda euenire		quibus futura depre-	
poſſint	2.5	hendatur	2.5
Mulſi differentia in		Nileus, ſiue Nilei col-	
potionibus	2.17	lyrium	6.5

I N D E X.

Notæ in singulis mor-	curari debeant	7.11.
bis obseruande	2.6	et 6.11
Notæ	8.1	Orthopnœa 4.4
Numenij malagma	5.	Ossis fracti curatio
18		8.7
Nymphodorus medi.	Os quot modis excida-	
8.20	tur	8.3
O	Ossa vitiata	8.1
O Bscœnarum par	Oscheos	7.18
tiu vitia quo-	Ὠσεία	6.8. et 7.3
modo curanda sint	Ὠσ	5.11
6.18		
Oculorum varij morbi	P	
6.6	Alma	8.1
Oculorum nature indi-	Partusemortuus	
catio	in vtero quomodo	
7.7	excuciendus	7.29
Oculorum vitia, et	ad Panum malagma-	
eorū curationes	ta	5.18
6.6		
Olerum differētiæ	Paralysis	2.1
5.17		
Omentum, eiusq; offi-	Paralysis oculorum	
cium	6.6	
4.1		
Omenti curatio	Parasynanche	4.4
7.21		
Omoplate	Periculum in tabe que	
8.1	denuntient	2.7
Opisthotonos	Parodontides	6.13
4.3		
Ὠπίσθιος	Parotides	6.16
6.4		
Orestes, quo genere	ad Parotidas mala-	
insaniæ laborauerit	gmata	5.18
3.18		
Oris vlcera, quomodo	Partium animalis dif-	
	ferent	

I N D E X.

ferētia in cibus	2.18	Phacos	6.5
Panificia	eodem	Phagedena in cole na-	
Passi differētia in po-		scentis curatio	6.18
tionibus	eodē	Philippus Epirotes me-	
Pastillorum descriptio-		dicus	3.21
nes, & variæ com-		Philocratis emplastrū	
positiones	5.20		5.19
Pastillus Polybij	ibid.	Philocrates	5.26
Pastillus Andronis		Philon	6.6
ibidem		Philothis collyriū eodē	
Parotides arteriæ	4.1	Philoxenus medicus	
Patella	8.1		6.19
Pecten	ibidem	Philotimus	8.20
Pediculi in palpebris o-		Phlegmone	1. in pro.
culorum	6.6	Phrenesis siue phrene-	
ad Pedum dolores ma-		tidis genera plura	
lagma	5.18		3.18
Peripneumonia	4.7	Phthisis	2 c.1. &
Pessi compositio	5.21	lib. 3. c. 22	
Pessi alia compositio		Pnygethlon	5.18. &
eodem			6.28
Pessi Numenij	eod.	Phymata	2.7. &
Pestilentia unde fiat			5.18. & 5.28
1.2		Piscium differentia in	
in Pestilentia que sint		cibus	2.17
observanda	1.3.	Pituita oculorum quo-	
ca. 10		modo curāda sit	7.7
Petro medicus	3.3	Planta	8.1
Pharmacentica	1. pro.	Plistonius Praxagoræ	
		P 4	discip

INDEX.

discipulus 1.in pro.	Pterygion	6.19
Podagra li.2.c.6.&	Ptolemaeus rex	5.23
4.24	Ptolemaeus chirurgus	
Podagra calidae cura-	6.7	
tio, per malagma	Pueritia quibus mor-	
5.18	bis periclitetur	2.1
Polypus	6.8	Pulmo ubi situs sit, &
Polypus in naribus	qualis sit	4.1
7.10	Pulmonis morbus, quæ	
Ponderum ratio	5.17	pericula portendat
Porrigo	6.2	2.7
Potionum differentie	Pulmonis percussi sig.	
2.17	5.26	
Potiones in febris,	Purgantia	5.5
quando & quomo-	Purgationes reiectæ ab	
do dari debeant	3.6	Asclepiade
Praxagoras lib. 1.	Purgationes interdum	1.2
in præ.	necessariæ, interdum	
Prandium quid requi-	inutiles	1.3
rat	1.3	Pustule in oculis
Protarchus	5.28	Pustularum genera
Proptosis	6.6	5.28
Prudens medicus quis	5.26	Pus, eiusq; differentia
habeatur	5.26	
Psorici descriptio	6.6	Puris significatio
Psydration	5.28	2.7
Psylli, quibus medica-	Pus coquētia siue ma-	
mentis vtuntur ad-	turantia, & mouen-	
uersus venena	5.26	tia
		5.3
	Pyloros	4.1
	Pyrites	5.18
	Pyth	

I N D E X.

Pythagoras	1.pro.	gna	5.26
Q		Resolutio stomachi	4.5
Q	Vartana memi-	Resolutio oculorū	6.6
	nem iugulat	Rhagadia	6.18
	3.15	Rhyis	7.7
in Quartana veteri,		Rhypodes emplastrum	
quid obseruare profit			5.19
	3.15	Rodentia	5.6
Quartane febris cura-		Rose natura in medi-	
tio	ibidem	cina	3.9
R		S	
R	Adius	8.1	S
	Rationalis me-		Acer ignis
	dicus quis & vnde		5.28
	dicatur		Sanguis ex nari-
	1.pro.		bus, quibus sepe fluit
aduersus Rabidi canis			2.5
morsum	5.26	Sanguinis detractio,	
Ramex	7.18	quot modis fiat	2.9
Ramicis curatio	7.22	Sanguinis natura &	
Recidua quando ti-		proprietas	4.3
menda	3.4	Sanguinem supprimen	
Refrigerantia quæ	1.3	tia	5.1
Regius morbus, et cur		ad Sanguinem suppri-	
ita dictus sit	3.24	mēdi malagma	5.18
Renes, & eorum situs		Sanguis, atq; eius disse	
4.1		rentia	5.26
Renum curatio	4.10	aduersus Sanguinis pro-	
Renum percussorum si-		fusionem in vulneri-	
ue vulneratorum si-		bus	eodem
		Aduersus Sanguisu-	
		r s	gam

INDEX.

gam	ibidem	cap.1	
Sanies, & eius diffe-		Septi trāsuerſi percuffi	
rentia	ibidem	ſigna	5.26
de Sanitate tuenda li-		Septicum	7.21
brum ſcripſit Aſcle-		Serapion	1.in proæ.
piades	1.3	Siccitas quid mali in-	
Satietas nimia nunquā		ferat corporibus	2.1
vtilis	1.2	Signa in egrotantibus	
Sarcophagus	4.c.vlt.	bona quæ ſint	2.2
Sarcocele	7.18	Signa in egrotantibus	
Saſagoris	5.8	mala quæ ſint	2.3
Scapule	8.1	Signa longæ valetudi-	
Scoptula	eodem	nis quæ ſint	2.4
Scorpio ſibi ipſe me-		Signa membrorū per-	
detur	5.26	cufforum	5.26
aduerſus Scorpionis i-		Silanus	3.18
ctum	ibidem	Siligo	2.7
Scrotum, quod et ſcor-		Singultus frequēs quid	
tum quidam dicere		indicet	2.5
malunt	7.18	Singultus ſternutamē-	
Secundæ quæ ſint	7.29	to finitur	2.7
Secunda menſa	1.2	Spagitites venæ	4.1
Seminis profuſio, & e-		Spasmos	2.1
ius curatio	4.21	Spina luxata quomo-	
Senectus, quibus mor-		do reſtitui debeat	
bis magis obnoxia ſit	7.14		
2.1		Sputum quid ſignificet	
Septū tranſuerſum li.1.	2.7		
in proæ. & lib.4.		Staphyloma	7.7
		Statu	

INDEX.

<i>Statura longa</i>	2.1	<i>periculosissima est</i>	
<i>Steatomata</i>	7.6	1.3	
<i>Sternutamenta quomo</i>		<i>Suffusio oculorum</i>	6.6
<i>do excitanda</i>	5.22	<i>Sumpturis cibum post</i>	
<i>Stercus animalium</i>	5.	<i>fatigationē, quæ ob-</i>	
	5. & 8.12	<i>seruanda</i>	1.3
<i>Stomachum infirmum</i>		<i>Suppurationes</i>	3.27
<i>indicantia</i>	1.8	<i>Supprimentia sangui-</i>	
<i>Stomacho laborantibus</i>		<i>nem</i>	5.1
<i>quæ agēda sint eod.</i>		<i>Suturæ in capite quot</i>	
<i>Stomachi infirmitas</i>		<i>sint</i>	8.1
<i>quibus signis cogno-</i>		<i>Sycosis</i>	6.3
<i>scatur ibidem</i>		<i>Synanche</i>	4 4
<i>Stomachus nonnunquā</i>		T	
<i>pro gula accipitur</i>		<i>Abes</i>	2.1. &
4.1		4.7	
<i>Stomachi duplex signi</i>		<i>Tabes, eiusque species</i>	
<i>ficatio ibidem</i>		3.22	
<i>Stomachi curatio</i>	4.5	<i>Tali</i>	8.1
<i>Stomachi percussi sig.</i>		<i>Talus luxatus, quomo-</i>	
5.26		<i>do restitui debeat</i>	
<i>Stomachus studiosorū</i>		8.22	
<i>qualis plerūq; sit</i>	1.2	<i>Telum latum, quomodo</i>	
<i>Stomioma</i>	6.6	<i>educendum</i>	7.5
<i>Stranguria</i>	2.1	<i>Telis extrahēdis reme-</i>	
<i>Struma</i>	5.28	<i>dium eodem</i>	
<i>Strophos</i>	2.6	<i>Tempora anni confi-</i>	
<i>Sudanti ex labore &</i>		<i>deranda</i>	1.3
<i>itinere frigida potio</i>		<i>Tempestates quæ opti-</i>	
		<i>mæ,</i>	

I N D E X.

ma, quæq; pessima	Tormina quando periculosa non sint	2.7
2.1		
Terebra	8.3	Tormina quibus bona sint
Tetanus	2.1. &	eodem
4.3		Tormina, id est dysenteria
Tetherapeumena	5.19	4.15
Tetrapharmacum emplastrum	5.19. &	Tristitia longa quid indicet
6.18		2.5
Testiculorum natura, et eorum morbi	7.18	Tussis
de Testiculorum morbis	6.18	4.4
Testiculorum incisio	7.19	Tympanites
Tharrius medicus	3.20	3.21
Themison	1. in pro.	V
Theodoti collyrium	6.6	Valetudinis instans quæ signa lib. 1. pro.
Therioma	5.28	Valentissimum quid
Theosenus	5.18	2.17
Thymium	5.28	Vari
Tibie	8.1	6.5
Tinai compositio	5.22	Varices quomodo curandi sint
Titio extinctus	3.12	7.17
Tonsillarum vitium	6.10	Varicum curatio
Tonsillis laborantibus, quid conveniat	1.5	7.31
		Veclius toto die quid facere debeat
		1.3
		Ventrem solutum quid comprimatur eodem
		Ventrem compressum quid soluat eodem
		Ventriculus ex quibus constet, & eius situs
		4.1
		Ventri


I N D E X.


<i>Ventriculus ex quibus constet, & eius si- tus</i>	4.1	<i>Vesicæ vulneratæ signa</i>	5.26
<i>Ventriculi vulnerati si- gna</i>	5.26	<i>Vivere elatum Ascle- piades funeri obuius intellexit</i>	2.5
<i>Venarum ora subito sup- pressa, alioqui san- guinem fundere con- suetæ, quid indicent</i>	2.5	<i>Viuorum corpora inci- dere, crudele & su- peruacuum esse</i>	1.
<i>Venere abstinendum quando, & quando non sit</i>	1.3	<i>Umbilici prominentis curatio</i>	6.17
<i>Venti qui nã salubres, & qui non sint</i>	1.1	<i>Umbilici vitia quomo- do curari debeant</i>	7.18
<i>Venenis omnibus con- trarium quid</i>	5.26	<i>Ungues</i>	8.1
<i>aduersus Venenosorum animalium ictus eodem</i>		<i>Uñctio</i>	1.3
<i>Ver saluberrimum</i>	2.1	<i>Vomitus quando, & quibus utilis aut inu- tilis</i>	eodem
<i>Vere quæ ad victum magis conueniant</i>	1.3	<i>Vomitus si post cibum fieri debeat, quomo- do prouocandus eod.</i>	
<i>Vere qui morbi fiant</i>	2.1	<i>Vrina sana quæ</i>	1.2
<i>Vertebrae</i>	8.1	<i>Vrinæ reddendæ diffi- cultati, quomodo suc- curratur lib.7.ca.26. & lib.1.ca.25</i>	
<i>Vesica, & eius situs</i>	4.1	<i>Vrina parum liquida, in sano homine quid signi</i>	


INDEX.


significet	2.5	Vulsella	7.30
Urina que mala	2.3	Vulua & eius situs	
Ureteres	4.1	4.1	
Uti synanche	4.4	Vulue percussæ signa	
Uua morbus intra fau-		3.26	
ces	6.14. & 7.12	Vulue natura mirabi-	
Vulnera quomodo glu-		lis	7.21
tinanda	5.26		
Vulnerum signa eodẽ		Z	
Vulnerum differentie			
ex ipso morsu eodẽ		Z Eron	lib.5.
Vulnus glutinantia	5.2	Z in proœ.	
Vulnera aperientia	5.4	Zopyrus	li.5.ca.25

FINIS.









...Quia...
...potest. Denique laborare & ...
...obsequi tibi: pene illud...

¶ Ca. XLij.

...fide... pulcherrime posui.

...presepe dicimus. desidero amorem
...iam prudentiam quasi sis insipiens.
...liberare est rem quam non habemus & qua
...aducum tuum cum. nundum aduenerit
...balitum... m tibi opto & esse cupio. De
...nsequente... ut captus sum ingre
...desiderio tui. Vnde ergo hic absens dicitur
...in... non habemus: ut sentas at...

¶ Ca. XLiii. Complector

...ile... diffusam est atq; orna
...etis hac ratione: ut te amore atq; uer
...ione complector quod est cogito. Et id
...est rei ipsius.

...plet... significationem... loatam qu
...um... medium completus est
...dece... Quo patet... hile genio comple
...m... obit orationem que replicand
...fescend... per aliquod verbum synonymum
...id est amo. Doorem meum litter... complecti
...s... Quis ludibria... ouem ag
...um... sagittarum nunc vnum
...at... virtutes cogitatione
...com... comprehendere
...vide...